

Le top 10 de nos observations en 2008

(Lep. Zygaenidae, Nymphalidae, Geometridae, Lymantriidae, Arctiidae, Noctuidae)

PHILIPPE BACHELARD, YANN BAILLET, DANIEL MOREL ET LIONEL TAURAND

L'été 2008 fut, d'un point de vue météorologique, véritablement « pourri », le mauvais temps ne nous permit de prospecter ni la moitié nord des Alpes ni les cols d'altitude. Nous nous sommes donc adaptés et tournés vers l'extrême sud du pays et de la bordure méditerranéenne. Notre top 10 ne reflète donc que l'intérêt que nous portons depuis des années à la recherche de la biologie de telle ou telle espèce de papillon.

Légende des cartes (avec l'autorisation du site lepinet que nous remercions)

■ Données postérieures à 1980
■ Données antérieures à 1980



Adscita albanica Naufock (Zygaenidae). Le 4 juillet, alors que nous étions à la recherche d'un futur biotope pour prospecter sur la commune de Lucéram (Alpes-Maritimes), sans même sortir de la voiture, dans un chemin forestier, nous aperçûmes un *Adscita* posé sous une fleur de géranium sanguin. Une prospection plus poussée nous permit l'observation de 9 autres exemplaires de cette espèce connue uniquement des Alpes-Maritimes.

Adscita albanica Naufock. Photo © D. MOREL.



Polygonia egea Cr.
Photo © D. MOREL.

Polygonia egea Cramer (Nymphalidae). Encore une espèce qui se sera fait désirer. Après plusieurs années de recherches infructueuses, le premier exemplaire fut observé en fin de journée le 3 juin 2008 sur un mur de la petite commune de Saorge dans les Alpes-Maritimes. Une recherche minutieuse dans les touffes de pariétaires nous permit la capture d'une unique chenille, malheureusement parasitée. Une dizaine d'autres individus furent observés le lendemain dans la matinée. Une deuxième visite à Saorge le 2 août permit l'observation d'une dizaine d'autres exemplaires. Nous estimons que cette espèce est en forte régression dans notre pays où on ne la rencontre plus que dans l'extrême Sud-Est.





Idaea rhodogrammaria Püngeler (Geometriidae). Quatre exemplaires furent observés sur la commune d'Arles, dans la réserve naturelle de la Crau (Bouches-du-Rhône) les 29 juin et 11 juillet 2008.

Idaea rhodogrammaria Püngeler.
Photo © D. MOREL.



Parocneria detrita Esp. Photo © D. MOREL.

Parocneria detrita Esp. (Lymantriidae). Cette espèce, restreinte au quart sud-est en France, n'est quasiment jamais citée. En fait, sa rareté serait moindre qu'il n'y paraît, le problème étant plutôt l'heure à laquelle elle est attirée par les sources lumineuses. Les quatre exemplaires observés à nos lampes furent trouvés au moment d'éteindre et de plier notre matériel, de la dernière demi-heure de la nuit à l'aurore. Pour 2008, une seule observation le 1^{er} juillet à Plan-d'Aups dans le Var.



Ocnogyna zoraida Graslin (Arctiidae). C'est l'espèce la plus attendue. Recherchée assidûment depuis quatre ans, ce n'est que le 14 août 2007 que l'un d'entre nous trouva la première chenille. Un mâle a émergé le 26 avril 2008. De nouvelles recherches les 2 et 5 août 2008 dans les environs de Jujols (Pyrénées-Orientales) nous permirent d'en retrouver une quarantaine. La moitié était parasitée mais les autres se sont chrysalidées à partir de la fin-août.

O. zoraida Graslin. Photo © L. TAURAND.
Chenille. Photo © D. MOREL.



Grammodes stolidus F.
Photo © D. MOREL.



Grammodes stolidus F. (Noctuidae). C'est un vrai plaisir de voir pour la première fois ce magnifique nocturne. Un exemplaire est venu à notre source lumineuse le 8 septembre 2008 à Salce-le-Château (Pyrénées-Orientales), au milieu des marais.



Odice blandula Rbr. Photo © Y. BAILLET.

Odice blandula Rbr (Noctuidae). Espèce connue des Pyrénées-Orientales et que nous avons observée sur la commune de Barcarès le 14 août 2008 où elle est rare. Notre surprise fut d'en trouver 7 exemplaires de jour le 7 septembre 2008 dans les environs de Leucate, dans le département de l'Aude. Une prospection de nuit à cette même date nous permit d'en comptabiliser une quarantaine.



Lithophane consocia Bkh. Photos © Y. BAILLET.



Lithophane consocia Bkh. (Noctuidae). Extrêmement localisée, c'est l'expérience de l'un d'entre nous qui permet son observation les 20 avril, 2 mai et 18 mai 2008 en Isère. À l'aide de lampes portatives, nous avons observé 7 exemplaires butinant les chatons de saules. Cette espèce, inféodée aux aulnes, est à rechercher près des rives de ruisseaux ou rivières. Une femelle a été récoltée pour tenter un élevage à partir de l'œuf.



Eremodrina oberthuri Rothschild (Noctuidae). Nous n'aurons même pas eu le temps de rechercher cette espèce. Elle s'est présentée à notre piège lumineux le 8 mai 2008 à Serdinya (Pyrénées-Orientales).

Eremodrina oberthuri Rothschild.
Photo © Y. BAILLET.



Heliothis ononis D. & S. Photo © D. MOREL.



Heliothis ononis D. & S. (Noctuidae). C'est sur la commune de Cervières (Hautes-Alpes), le 9 juillet 2008 à 1790 m d'altitude que nous vîmes 3 exemplaires de cette espèce butinant les fleurs de thym. Ils seraient passés inaperçus si une belle population de *Maculinea alcon rebeli* n'avait retenu notre attention. ■



BIBLIOGRAPHIE

COLLECTIF, 2007. – Guide des Papillons nocturnes de France. *Les guides du Naturaliste*, 288 p. Ed. Delachaux & Niestlé
MOTHIRON (P.) & HODDÉ (CL.), 2005. – Les Carnets du Lépidoptériste Français. Disponible sur : <http://www/lepinet.fr>

Ph. B. : Le Monteillet 63210 Olby
Y. B. : 2, rue des Cadets de la France Libre 69003 Lyon
D. M. : 12, rue des Jonquilles, Saint-Pantaléon 71400 Autun
L. T. : 21, chemin de Gahète 31700 Mondonville