



— Présence de *Charaxes jasius* (Lep. Nymphalidae) en Ardèche.

Le Dr H. CLEU, dans son étude « Biogéographie et peuplement entomologique du bassin de l'Ardèche » (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 122, 1953, p. 1-74), n'en fait pas mention, et sa collection n'en contient pas. A notre connaissance, aucun auteur n'a signalé *C. jasius* LINNÉ dans la région.

M. J. PERRIER a observé le cycle de développement de ce Papillon à Villeneuve-de-Berg. Cette localité, éloignée de la côte méditerranéenne de plus de 120 kilomètres, est l'une des plus septentrionales que nous connaissions. Nous avons pris une femelle de première génération au Bois de Païolive, le 14 juillet 1978.

Les limites de répartition de ce Lépidoptère coïncident sans doute avec celles de la plante-hôte : l'Arbousier, abondant en Ardèche méridionale, ne doit guère se rencontrer à l'état naturel au Nord du Coiron.

Henri P. ABERLENC,
(125, rue Castagnary, 75015 Paris)

— Redécouverte d'*Oligota pilicornis* (Col. Staphylinidae) en Ardèche.

Oligota (*O.*) *pilicornis* FAUVEL est un Staphylin noir et minuscule (1,5 mm). Il vit dans les bourses de soie abandonnées des chenilles processionnaires du Pin (*Thaumetopoea pityocampa* SCHIFFERMILLER), parmi leurs excréments et leurs exuvies. Il n'est pas rare, mais méconnu. *Dermestes aurichalceus* KÜSTER (Col. Dermestidae) et *Micrambe perrisi* Ch. BRISOUT (Col. Cryptophagidae) vivent en sa compagnie.

Nous incitons vivement nos collègues à le rechercher, afin de préciser sa répartition. Les types de FAUVEL proviennent l'un du Teil (Ardèche), l'autre de Bordeaux (*Rev. Ent.*, 19, 1900, pp. 236-237). M. J. JARRIGE et le Dr J. BALAZUC l'ont pris entre Saint-Étienne-de-Tinée et Isola (Alpes-Maritimes). Un exemplaire de la collection J. JARRIGE est étiqueté : « Forêt de Montech (Tarn-et-Garonne), Rabil ». Un autre porte la mention « Nîmes, Thérond ». Curieusement, M. J. THIÉROND n'en parle pas dans son excellent « Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard » : (*Soc. Et. Sci. nat. Nîmes ; Mémoire n° 10*) dans le Tome I (1975), page 193, il cite 8 espèces d'*Oligota*, mais pas celle qui nous préoccupe.

Depuis sa description, *O. pilicornis* n'avait plus été signalé du Vivarais. Nous l'avons récolté en abondance en septembre 1976 et en août 1977, entre les Vans et Saint-Jean-de-Pourcharesse, non loin de Thines. Cette pinède a souffert d'un important incendie en septembre 1978.

NOTA : Attention ! les poils urticants des exuvies provoquent des érythèmes prurigineux très pénibles ! Un local où l'on a examiné quelques bourses devient tout à fait inhabitable pendant plusieurs mois, malgré de nombreux nettoiyages. Il faut donc opérer sur place, en plein air.

Henri P. ABERLENC
125, rue Castagnary, 75015 Paris).