

Il nous est agréable de remercier Lionel TAURANT et Daniel MOREL pour leurs informations sur la localisation de *J. budensis* en Dordogne et sur certains aspects originaux du comportement de vol des mâles de cette espèce dans le Lot. Nous sommes aussi redevable à Franck LE DRIANT pour la détermination de la fleur de *C. triumfetti*. ■

E.D. :
86 bis, route de la Luye F-05000 Gap
edrouet.zyg@wanadoo.fr
Y.B. :
6, impasse du Puits de Reu
F-38460 Soleymieu
quenseli@hotmail.fr



◀ Fig. 4, *Cyanus triumfetti*.
Saint-Véran (05), 12-VII-2013.
© E. DROUET.
Fr. LE DRIANT det.

Appel à une nouvelle prospection (Lep. Heterocera)

JEAN-PAUL DELVALÉE

En réorganisant des cartons surchargés, je suis "tombé" sur une petite série d'*Idaea* que j'avais déterminée comme des *Idaea flaveolaria*. Afin d'éviter toute confusion avec *Idaea aureolaria*, j'ai fait appel à l'expertise de Philippe Mothiron qui m'a confirmé très gentiment mes identifications.

Or, un de ces *I. flaveolaria* provient d'Eure-et-Loir, pris le 19 août 1973, d'un petit bois au-dessus du village de Mévoisins, dans les environs de Saint-Piat, où mes parents avaient une résidence secondaire.

Au regard de la carte de répartition du site Lépi'Net, cette localisation semble plutôt surprenante ? L'étiquette de l'époque correspond bien aux périodes où je prospectais dans ces bois.

Pour enlever toute ambiguïté à cette "découverte", il serait bon qu'une nouvelle observation puisse être réalisée, d'où l'objet de cet article... à moins qu'un collègue possède déjà dans ses boîtes un autre exemplaire provenant d'Eure-et-Loir ?...

Merci de vos informations sur ce petit papillon discret.

Par ailleurs, toujours en classant mes papillons, j'ai retrouvé 2 exemplaires de *Paidia rica* provenant de ce même village de Mévoisins, le 5 août 1978. Redécouverte pour l'Eure-et-Loir, si l'on se base sur la cartographie du site de Lépi'Net dont l'observation prise en compte remonte « avant 1867 » ! « Origine : Guenée, 1875 - Lépidoptères (Catalogue raisonné des Lépidoptères du département d'Eure-et-Loir (1867). In : Statistique scientifique d'Eure-et-Loir (1867-1874). 302 pp. Société archéologique d'Eure-et-Loir et Librairie Piétrot-Gamier édit., Chartres ».

Pour changer de région, nous partons pour les Pyrénées Atlantique où je capturai une femelle de *Pharmacia pyrenaicus* le 30 juillet 1981 au col de Lurdé (1948 m), au-dessus de Laruns. Première observation avérée de ce papillon, selon Lépi'Net.

Enfin, pour continuer notre virée, nous retournons en Bretagne dans un lieu où je séjourne régulièrement fin août. Il s'agit de Pénestin en Morbihan, en limite sud avec la Loire-Atlantique. Mes nombreuses observations m'ont permis de découvrir de nouveaux lépidoptères pour le Morbihan. Le 26 août 2014, ce fut la nouvelle découverte (selon Lépi'Net) de la très belle géomètre *Apeira syringaria* sur la plage de Men-Armor, le long de la Vilaine en retrait de la Pointe de Halguen.

Cette petite note prouve qu'en revisitant quelquefois ses boîtes, on peut retrouver des observations intéressantes ! Donc, à vos cartons ! ■



◀ Imago d'*Idaea flaveolaria*.
© D. MOREL.

18, rue Max Ernst
F-91440 Bures-sur-Yvette
jpdel3@free.fr