

W Observation surprenante sur le littoral picard
(Lepidoptera Pieridae)

par J.M. Devérité

En septembre 1973, à Mers les Bains (Somme), lors d'une partie de pêche en mer il m'a été donné de voir une chose assez surprenante : nous étions partis dans l'après-midi, dans un petit bateau, par mer calme, en allant vers le lieu de pêche (environ 2km. de la côte) je remarquais quelques taches blanches sur l'eau ; voulant voir ce que c'était je me rapprochai et je reconnus des papillons du genre Pieris. Croyant qu'ils se noyaient, je m'approchai de l'un d'eux et à environ deux mètres j'eus la surprise de le voir se remettre sur ses pattes et s'envoler ! Cette même scène s'est reproduite plusieurs fois ; étant rassuré sur leur sort je repartis pour la pêche. J'en ai conclu que ces papillons fatigués se posaient sur la mer pour se reposer, et que le vent étant de Nord-Ouest ils venaient d'Angleterre. C'est également ce même jour que j'ai vu passer de nombreux Vulcains (cf RUTILUS n° 2 Novembre 1974) S'agissait-il pour ces deux espèces d'un retour de migrations.

Cette observation, qui est à rapprocher de celle faite dans le bassin d'Arcachon (signalée dans l'Amateur de Papillons), permet donc de croire que la mer n'est pas un milieu si hostile pour un lépidoptère et permet d'expliquer comment de nombreux papillons traversent la Manche, la Méditerranée, voire l'Atlantique (les Monarques). Il n'est nul besoin d'inventer des navires transporteurs, ou simplement lieux d'escale, puisqu'il est prouvé que les lépidoptères peuvent se poser impunément sur la surface de la mer. Il est possible de penser que c'est une pratique courante rarement observée certes, mais peut-être tout simplement parce que les entomologistes chassent rarement les papillons en mer !

W Une nouvelle localité pour *Brenthis ino* L.

dans la vallée de la Somme
(Lepidoptera Nymphalidae)

par J.M. Devérité

Espèce commune dans certaines régions de Picardie (le laonnois par exemple) *Brenthis ino* L. est très localisé dans le département de la Somme. Si ces stations jalonnent toute la vallée de l'Avre, par contre mes collègues amiénois n'en connaissaient que deux dans la vallée de la Somme : Estouilly et Etinehem. En juin 1974 allant chasser *Lycaena dispar* Haw, comme tous les ans en juin et août dans une pâture humide le long de la Somme (où je ne l'ai jamais vu bien que M. Duquef l'y ai rencontré plusieurs fois), j'y ai capturé deux *Brenthis ino* L. Une dizaine d'exemplaires pouvaient y être aperçus. Cette localité : La Motte-Brebière est donc la troisième dans la vallée de la Somme (tout au moins pour la partie dans le département du même nom) où pourtant les biotopes favorables ne manquent pas.