


Aporia crataegi L. en voie de
disparition dans le nord de la France
(Lepidoptera Pieridae)

par M. Duquet



Il y a peu de temps encore *Aporia crataegi* L. était une espèce commune en Picardie, et même en Flandres. Apparaissant dans la dernière semaine de mai, cette pieride se rencontrait couramment dans les friches de la région d'Amiens (Creuse, Saint Fuscien, Rumaissnil, etc...) jusqu'en juillet.

Après avoir disparu totalement d'Angleterre, cette espèce subit le même sort dans nos régions du Nord : plus aucun exemplaire rencontré depuis dix ans dans le département de la Somme ; dans l'Aisne, seul un papillon a été vu en Juillet 1974, par notre ami G. Orhant, en forêt d'Hirson, région qui appartient déjà à l'Ardenne, où *A. crataegi* est encore heureusement commun. Dans la région parisienne cette piéride est considérée maintenant comme une grande rareté : G. Luquet rapporte la capture à Nanterre (11 juin 1970) d'un mâle de "gazé", espèce qu'il considérait comme définitivement disparue de la proche banlieue parisienne, ne l'ayant plus jamais revue depuis 1965 (Alexandor, VII 1971, page 115).

Comment expliquer la disparition de cette piéride dont les chenilles se nourrissent surtout d'aubépine ?

Le remembrement et la disparition des haies ? ce n'est encore heureusement, peu appliquée dans nos régions ; les insecticides ? ou tout simplement la destruction des friches au profit de cultures chimiques et d'un univers de béton et de goudron où la nature sauvage a de moins en moins le droit d'exister.

Il nous suffit de constater l'abondance du "gazé" dans les Ardennes, où l'activité humaine est réduite, pour penser que l'Homme, d'une façon peu visible, mais redoutablement efficace, est seul responsable de la radiation d'*Aporia crataegi* de la faune nordique. Si la disparition d'espèces très localisées et rares peut s'expliquer facilement par la modification du biotope ou par des captures trop importantes, celle d'une espèce commune partout, est autrement inquiétante. Pauvre Nature !

Nous profitons de cette petite note pour demander à nos collègues de nous rapporter leurs observations ultérieures à 1965 dans les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, ainsi que la Normandie et la région parisienne, concernant notre malheureuse piéride de l'Aubépine.

--- La photo ci-dessus nous montre un rassemblement de *A. crataegi*, au nord de Treviso, Dolomites, Italie, posé sur de la terre humide. La même scène se rencontre aussi dans les Alpes françaises.

(Photo: Claudette ESTEVE)