

Remerciements

Je tiens à remercier ici les lecteurs d'*oreina* qui m'ont communiqué leurs données : Philippe Bachelard, Frédéric Billi, Jean-Paul Descombes, Jean Haxaire, Terence Hollingworth, Jean-Pierre Favretto, Daniel Morel, ainsi que ceux qui n'en avaient pas et ont pris la peine de me le dire ! Un grand merci aussi au Muséum d'Histoire naturelle Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand, où sont déposées les collections Barthélémy, Brun et Charnay. ■

Bibliographie

ANONYME, 1937. – Capture de trois espèces nouvelles pour la faune française. *L'Amateur de Papillons*, 8 (19/20) : 310-311.

ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ENTOMOLOGIE, 1997. – Étude préliminaire de l'entomofaune de la Réserve naturelle volontaire de Nyer (Pyrénées-Orientales). *Revue de l'Association roussillonnaise d'entomologie*, 6 (3), 1997 : 89-102.

BATOR (D.), DROUET (E.), FAVRETTO (J.-P.) & OGER (B.), 2007. – Quelques Lépidoptères remarquables observés dans l'Ouest de la France de 2004 à 2005 (Lepidoptera). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France*, N. S. 29 : 180-191.

BECK (H.), 2000. – Die Larven der Europäischen Noctuidae. Revision der Systematik der Noctuidae (Lepidoptera : Noctuidae). in : *Herbipoliana*, Band 5/3. Vol III-Farbbildband. 336 p.

BRUSSEUX (G.) & NEL (J.), 2004. – Révision de la liste-inventaire de C.E.E. Rungs (1988) des Lépidoptères de Corse. *Revue de l'Association roussillonnaise d'entomologie*, XIII, supplément. 145 p.

COLLECTIF, 2007. – Guide des Papillons nocturnes de France. *Les Guides du Naturaliste*, Delachaux et Niestlé. 288 p.

DUFAY (CL.), 1962. – Les Noctuidae de la faune française ne figurant pas dans le catalogue L. L'homme (suite). *Alexanor*, II : 207 – 223.

GRELIER (Y.), 1989. – Contribution à la liste des Macrolépidoptères de Gironde (Lep.). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 17 (2) : 51-135.

HENRIOT (PH.), 1938. – Captures intéressantes. *Revue française de lépidoptérologie*, 9 : 180-183.

JEANNIN (A.), 1990. – Notes de chasse dans le département de l'Hérault (Lep. Sphingidae et Noctuoidea). *Alexanor*, 16 (6), 1990 : 353-360.

RONKAY (L.), YELA (J. L.), HREBLAY (M.), 2001. – Noctuidae europeae, vol. 5 : Hadeninae II. Entomological Press.

TROKAY (F.), 1979. – Les Lépidoptères du lieu-dit Coussenas, Saint-André-de-Sangonis (F-34150), Hérault. *Bulletin du Cercle des lépidoptéristes belges*, VIII (1979), 3 : 50 - 63.


VIGNEAU (P.), 1949. – Intéressantes captures en Gironde et dans les Pyrénées. *Revue française de lépidoptérologie*, 12 (7/8) : 147 - 149.

Site Internet

Lépi'net, les Carnets du Lépidoptériste français (www.lepinet.fr). Page *Agrochola blidaensis* et carte de répartition consultées au 1^{er} janvier 2010.

Deux formes de *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

(Lep. Nymphalidae Satyrinae)



FRANÇOIS FOURNIER

Résumé : L'auteur cite l'observation de deux formes de *Melanargia galathea* : l'une noire et l'autre beige.

Summary : The autor relates the observation of two forms of *Melanargia galathea*: one black and one beige.

Mots-clés : rhopalocère, *Melanargia galathea*, formes.

Le 9 juillet 2009 au col de Braus (Alpes-Maritimes), j'ai pu observer cette forme noire de *Melanargia galathea*. Si les formes sombres sont assez courantes dans le sud-est de la France, les exemplaires totalement noirs sont plus rares. Roland ESSAYAN (1993), dans un supplément de la revue *Entomologica gallica* (Galerie entomologique) avait présenté des dessins de plusieurs formes de *Melanargia*, dont une forme *lugens* Oberthür, 1896, très proche de celle observée cette année. Dans son ouvrage, RUSSWURM (1978) note qu'un exemplaire totalement mélanique a été capturé en juillet 1871 près de Rochester (M.F.W. FROHAWK, 1938).

L'exemplaire découvert près de Sospel est totalement noir sauf quelques petits traits blancs (photos 1 et 2).

En comparaison, une autre forme présentant cette fois-ci une couleur beige de l'ensemble des taches habituellement noires avait été observée à Thorame-Basse (Alpes-de-Haute-Provence), le 9 juillet 2005. Cette

forme est à rapprocher de la forme *grisescens* Varin, figurée aussi dans l'ouvrage de Russwurm (photos 3). R. ESSAYAN que j'ai contacté confirme aussi la capture d'une femelle le 20 juillet 1991 (Bulgarie, SE, Boljarovo), présentant une couleur gris brun pâle, qu'il rapproche aussi de la forme *grisescens* Varin. Il pense que ce phénomène est plutôt d'origine génétique, dû à un défaut de fixation de pigment sur les écailles, peut-être lié à un enzyme ?

Remerciements

Je remercie R. ESSAYAN, qui a bien étudié cette espèce, pour les renseignements fournis. ■



1 et 2. *Melanargia galathea* f. *lugens*. 3 et 4. *M. galathea* f. *grisescens*. © Fr. FOURNIER.



Bibliographie

ESSAYAN (R.), 1993. – Supplément à *Entomologica gallica*, 4, 4.

FROHAWK (F.W.), 1938. – Varieties of British Butterflies.

RUSSWURM (A.D.A.), 1978. – Aberrations of British butterflies. E.W. Classey Ltd. London, 151 p.