

# Observation de fourmis et chenille de *Scolitantides orion* (Pallas, 1771)

(Lepidoptera, Rhopalocera)

François Fournier

25, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand



Le 26 juin 2008 à Léotoing (Haute-Loire) sur les versants chauds à proximité du château, j'ai pu observer la présence de plusieurs chenilles de *Scolitantides orion* P. vivant sur le *Sedum maximum*. La chenille n'est pas toujours facile à observer, se confondant avec la couleur des tiges et se tenant soit sous les feuilles soit même creusant dans les tiges ce qui peut entraîner d'ailleurs la cassure de la tige.

Chez un certain nombre de Lycènes les chenilles entretiennent une relation plus ou moins importante avec les fourmis allant jusqu'à se laisser emporter dans

la fourmilière pour s'y nourrir, comme pour les *Phengaris* (*Maculinea*).

Il semble que l'observation de fourmis en relation avec la chenille de *Scolitantides orion* P. n'ai pas encore été citée dans la région, même si ce phénomène est connu. La présence de fourmis n'apparaît pas absolument nécessaire pour le développement de la chenille, contrairement aux espèces de *Phengaris*, mais elles semblent apprécier le miellat sécrété par les chenilles.

On pouvait noter la présence de plusieurs fourmis sur les chenilles ce jour là.