


## Dans le département de la Lozère

FRANÇOIS FOURNIER



### LYCIA ZONARIA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) DANS L'AUBRAC LOZÉRIEN (LEP. GEOMETRIDAE)

L'article paru récemment dans *oreina* sur *Lycia zonaria* D. & S. dans les Vosges (F. SPILL, 2011) m'a incité à publier cette observation. Le 11 juin 2011, dans l'Aubrac, sur la commune du Malbouzon, à 1200 m d'altitude dans le département de la Lozère, j'ai récolté une chenille de *L. zonaria* fixée à une tige d'ail sauvage. La chenille, non identifiée sur le terrain, fut gardée mais malheureusement mourut à mon retour. La photo était restée un peu dans les oubliettes jusqu'à la lecture de l'article qui m'incita à vérifier l'identification de la chenille. L'espèce est connue en petit nombre des départements auvergnats voisins.

Six citations du Puy-de-Dôme :

Données récentes (après 1980) : Vallée de Chaudéfour, 1300 m (Ph. BACHELARD *leg.*) ; la Godivelle, 1200 m (B. CALMONT *leg.*) (FOURNIER & BACHELARD, 2006).

Données anciennes (avant 1980) : Ceyrat, 500 m (A. ANGLARD, comm. pers.) ; Mozac, 400 m (M. BRUN, coll. Muséum d'Histoire naturelle Henri Lecoq, Clermont-Ferrand) ; Saint-Germain-l'Herm, 1000 m (A. DESHOMMAIS) ; Chanonat, 400 m (J. BEAULATON).

Trois citations du Cantal : Vallée de Dienne, 1300 m (L. TAURAND), 2010 ; Landeyrat, 1100 m (Ph. BACHELARD), 2010 (comm. pers.) ; Chastel-sur-Murat, la Pinatelle, 1000 m (2010) plusieurs accouplements (D. DEMERGÉS, comm. pers.).

Trois observations de la Haute-Loire : Le Chambon-sur-Lignon, 960 m (SAGNES *leg.*) et avril 1963 (R. BÉRARD *leg.*) ; Chenereilles, 800 m (MANEVAL *leg.*) (Cl. TAUTEL, comm. pers.).

Il faut noter que toutes les données récentes ne concernent que des habitats d'altitude. Les autres données, dont certaines de plaine, ont toutes plus de quarante ans.

L'espèce ne semblait pas avoir été observée dans l'Aubrac ni en Lozère jusqu'à présent.

L'habitat des prairies de fauche ou de pâturage ne souffre pas d'une surexploitation humaine et devrait donc être préservé.

Remerciements à Ph. BACHELARD, D. DEMERGÉS, Cl. TAUTEL, le Muséum d'Histoire naturelle Henri Lecoq de Clermont-Ferrand pour la communication des données auvergnates. ■

### Bibliographie

BEAULATON (J.), 1971-1972. – Contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme (Massif central). 1. Inventaire faunistique. *Annales de la Station biologique de Besse-en-Chandesse*, n° 6-7 : 77-240.

FOURNIER (FR.) & BACHELARD (PH.), 2006. – Observations en 2005 d'espèces nouvelles ou peu connues en Auvergne. *Arvernensis*, 35-36, 21-24.

SPILL (FR.), 2011. – 15 années d'observations de *Lycia*



*Lycia zonaria* © Fr. SPILL.

*zonaria* D. & S. dans le Parc naturel des Vosges du nord (Lep. Geometridae). *Oreina*, 16 : 6-7.

### Site internet

Les Carnets du Lépidoptériste Français, <http://www.lepinet.fr>

25, rue de la Treille F-63000 Clermont-Ferrand  
ffournier63@sfr.fr

## Dans celui de la Savoie

PHILIPPE FRANCOZ



### UN CRAMBIDÉ DISCRET

Pour le département de la Savoie, *Sclerocona acutellus* (Eversmann, 1842), inféodé principalement au roseau commun (*Phragmites australis*), n'était connu jusqu'à cette année que des marais de Chautagne, au nord du lac du Bourget (73). Le 25 mai, lors d'une animation nocturne organisée par la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection de la Nature), 3 individus de cette espèce ont été observés, mais cette fois-ci, dans un marais au sud de Chambéry, à plus de 30 km des localités connues. Comme pour la Chautagne, les observations ont été faites en début de soirée.

C'est une espèce assez tranquille qui, une fois posée, reste sur le drap.

Comme pour *Polypogon gryphalis* (Herrich-Schäffer, 1851), trouvée sur les mêmes sites, il serait intéressant



de la rechercher dans les zones humides du Grésivaudan (Isère et Savoie), entre Chambéry et Grenoble. ■

3065, route du Revard F-73100 Trévignin  
ph.francoz.lepidos@orange.fr

## Dans l'Essonne

JEAN-PAUL DELVALÉE



### NOUVEAUX POUR LE DÉPARTEMENT

Lors d'une sortie nocturne organisée par Jean BRÉARD le 23 mai 2009 non loin d'Étampes, à Valpuseaux dans l'Essonne, j'ai eu la chance de découvrir deux nouveaux papillons pour le département, attirés par mon « fidèle » tube actinique.

Tout d'abord, *Eublemma purpurina*, observation déjà publiée en 2010 dans le bulletin de l'Association des lépidoptéristes de France (ALF) par un collègue (*Lépidoptères* n° 45). Relisant l'article sur les premières mentions de ce papillon dans le Loiret (*Alexanor*, tome 24, fasc. 8), il faut constater que l'expansion vers le nord de cette belle noctuelle ne semble pas devoir s'arrêter.

L'autre espèce est *Eupithecia satyrata*, validée par la préparation des genitalia réalisée par Lionel TAURAND que je remercie ici vivement pour son aide précieuse. Cette localité du sud de l'Essonne, bien connue des lépidoptéristes, continue de prodiguer des surprises au fil du temps ! ■

18, rue Max Ernst F-91440 Bures-sur-Yvette  
jpdel3@free.fr