

Nouvelle observation d'*Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) dans le massif des monts Dore (Lepidoptera Nymphalidae)

FRANÇOIS FOURNIER



Résumé : l'auteur présente une nouvelle observation d'*Erebia neoridas* dans les monts Dore (Puy-de-Dôme).

Mots clés : *Erebia neoridas*, Auvergne, Puy-de-Dôme, monts Dore.

Le 29 août 2017, en lisière de la forêt de Fraux, sur la commune de Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) à 1248 m d'altitude en compagnie de mes petits enfants qui couraient après les *Aglais io* et *Gonepteryx rhamni* très nombreux, j'observai un *Erebia* que je prenais pour *Erebia aethiops* étant donné la date et le lieu. Celui-ci se posant sur une fleur, je fus surpris par sa taille et l'absence d'ocelles sur les ailes postérieures et je décidai donc de donner un coup de filet pour l'examiner : la forme de ses ailes et le revers m'intrigua, me faisant penser à *Erebia neoridas*. Mais étant donné le lieu, cela semblait improbable. Dans le doute, il finit dans le bocal pour être examiné plus attentivement.

Le lieu est un chemin forestier avec une petite clairière présentant une tourbière où vole en particulier *Maculinea alcon alcon* et *Stenoptilia faillei* inféodés à la gentiane pneumonanthe assez abondante (à noter la présence d'œufs de *M. alcon* ce jour-là).

Le site ne ressemble en rien à l'habitat classique d'*Erebia neoridas* dans la région où il fréquente des coteaux thermophiles (la dernière donnée des monts Dore date du 13 août 2013 où il fut trouvé sur un talus thermophile

de Saint-Pierre-Colamine mais n'avait jamais été retrouvé malgré les recherches.

Il existe aussi une donnée de Testout (1947) : Puy Pallet, 3 août 1943, Couillet (ég., Coll. Testout).

De retour à la maison, j'examinai l'exemplaire qui présentait tous les critères d'un *Erebia neoridas* en dehors de l'absence des ocelles des ailes postérieures. Je réalisai par principe l'étude des genitalia qui ne laissait aucun doute sur l'identification. La présence de cet exemplaire a priori unique laisse perplexe et demande de nouvelles prospections dans les années prochaines.

L'espèce était connue du Puy-de-Dôme depuis le XIX^e siècle. Guillemot le cite à Royat sur le Puy de Gravenoire, le 12 août 1854, où il était en compagnie de Bellier de la Chavignerie, de Lajolais et J.A. Bayle. *E. neoridas* volait avec *Pamassius apollo* et *Hyponerthe lycaon*, disparus eux aussi du site (Guillemot, 1854 ; Fournier, 2016). Il existe aussi plusieurs données d'anciennes collections conservées par le Muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand jusque vers la fin des années 1930.

Il fut retrouvé par Cl. Tautel en juillet 1979 à Anzat-le-Luguet où il fut de nouveau observé au lieu-dit le Prassinet, 1030 m, le 5 septembre 2004 et sur la commune d'Apchat, à la côte de Bave, 890 m, le 4 septembre 2004 par l'auteur.

Dans le Cantal, il fut redécouvert par D. Tourlan le 14 août 1994 à Brujaleine sur la commune de Chastel-sur-Murat (Tourlan, 1998). Il avait été signalé du département par le Docteur Glais (1929) qui écrivait : « assez commun dans le Cantal vers 1000 à 1200 mètres, paraît assez tard : août ». Il a été retrouvé à Chastel-sur-Murat en 1999 sur 2 sites et à Tali-

zat le 8 septembre 2014 par l'auteur. En Haute-Loire, il est assez abondant le long de l'Allier en amont de Vieille-Brioude jusque vers Langeac ; il

s'observe aussi à la limite de l'Ardèche vers le col de la Chavade. A priori l'espèce est à rapprocher de la sous-espèce *Erebia neoridas lozerica* Warren, 1932. ■

Bibliographie

BEAULATON (J.), 1971-1972. – Contribution à l'étude du peuplement en lépidoptères du département du Puy-



Fig. 2 : exemplaire d'*Erebia neoridas* du 29 août 2017 (coll. Fr. Fournier).

de-Dôme (Massif central). I - Inventaire faunistique. *Ann. Stat. Biol. Besse-en-Chandesse*, 6-7 : 77-240.

BEAULATON (J.), 1974-1975. – Complément à l'étude du peuplement en lépidoptères du département du Puy-de-Dôme (Massif central). II - Inventaire faunistique. *Ann. Stat. Biol. Besse-en-Chandesse*, 343 : 355.

FOURNIER (FR.), 2013. – Redécouverte d'*Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) dans le massif du Sancy (Lepidoptera). *Arvensis*, 66 : 1-3.

FOURNIER (FR.), 2015. – Antoine Guillemot, entomologiste thiernois. Edition Revoir. 174 p.

GLAIS DR. (H.), 1929. – Quelques considérations sur les *Érèbes* du Plateau central. *L'Amateur de Papillons*, Paris, 4 (15) : 236 – 240.

GUILLEMOT (A.), 1854. – Catalogue des Lépidoptères du département du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand, Thibaud Landriot éd., 144 p.

TESTOUT (H.), 1947. – Révision du Catalogue des espèces françaises du genre *Erebia* (Lépid. Satyridae), 5^e partie. (2). *Bulletin société linnéenne de Lyon*, vol XVI, 10 : 202 – 206.

TOURLAN (D.), 1998. – *Erebia neoridas* (Boisduval, 1832) dans le Cantal. *Arvensis*, 8 : 2.



Fig. 1 : site de l'observation d'*Erebia neoridas* en bordure de la forêt de Fraux (Besse, Puy-de-Dôme).

exposé au sud sur la commune de Saint-Victor-la-Rivière, à 1025 m d'altitude (Fournier, 2013). Il avait été cité par Beaulaton (1972-1974) des environs