



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





MOLOGY



L. 52

257-




Guené (1845)

This booklet is a reprint of pp. 128-192 and  
pp 297-344. Annals Soc. Ent. France (2) 3 (1845)

EUROPÆORUM

**MICROLEPIDOPTERORUM**

**INDEX METHODICUS.**



---

**Imprimerie de AUG<sup>e</sup> LECESNE, à Châteaudun.**

---

EUROPÆORUM

# MICROLEPIDOPTERORUM

## INDEX METHODICUS,

Sive **Pyrales, Tortrices, Tineæ et Alucitæ** Linnæi,

secundūm novum naturalemque ordinem dispositæ,  
nominibus genuinis restitutis, synomimia accuratè elucidata, locis indicatis,  
novisque speciebus aut larvis brevī descriptis.

AUCTORE A. GUENÉE.



Genera naturalia metamorphosi demonstranda  
vitam scientiam largiuntur.

(LIN. Syst. Nat.)

Une espèce dont la dénomination est juste et  
caractéristique, dont la place dans la méthode  
est bien accusée, dont l'habitat est bien  
indiqué, est déjà à moitié reconnue.

(Des Noms en Entomologie.)

### PARS PRIMA;

Sistens TORTRICES, PHYCIDAS, CRAMBIDAS, TINEARUMQUE initium.




Parisii,

APUD RORET, BIBLIOPOLAM,

VIA HAUTEFEUILLE, 40.

1845.



**ENTOMOLOGY**

QL555  
A1G8  
Entomol.

## AVERTISSEMENT. <sup>(1)</sup>

..... Il ne me reste plus maintenant , avant de finir cette longue préface , qu'à donner l'explication des signes et abréviations employés dans le catalogue qui va suivre , et à dire quel sens j'attache à certaines expressions latines qui , dans les anciens auteurs , sont susceptibles de plusieurs interprétations.

Je donne d'abord la liste des auteurs que j'ai cités et , en regard , les abréviations qui les désignent.

Bdv. — BoISDUVAL. *Genera et Index*. Paris , 1840.

Cl. — CLERCK. *Icones Insectorum rariorum*. Holmiae , 1759. (Les 12 premières planches).

Cram. — CRAMER. *Papillons exotiques* , tomes I et IV. Amsterdam , 1779 et 1782.

Curt. — CURTIS. *A Guide of the Arrangement of British Insects*. London , 1829.

D. — DUPONCHEL. *Histoire-naturelle des Lépidoptères* , tomes IX , X et XI. Paris , 1834 à 1838 ; — et supplément , tome IV. Paris , 1842.

(1) Dans les *Annales de la Société entomologique de France* , où cet opuscule a été inséré , il est précédé d'une longue introduction , mais comme cette dernière était particulièrement destinée à ce recueil , j'ai cru bien faire en la supprimant ici. J'en ai seulement conservé les parties utiles à l'intelligence du catalogue.

La seconde partie du présent *Index* comprendra la fin des Tineites et toutes les Pyralites , et comme , pour les personnes qui voudront l'annexer à l'*Index* de M. Boisduval , c'est par ces dernières qu'il devra commencer , j'ai fait donner à chacune des trois grandes divisions une pagination séparée.

II

- Esp. — **ESPER.** *Die Schmetterlinge*, etc., tomes III, IV et V. Erlangen, 1782 et suiv.
- Ev. — **EVERSMANN.** *Quædam Lepidopterorum species novæ.* Bulletin soc. Imp. Mosc., 1842 et suiv.  
*Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis.* Casani, 1844, in-8°.
- F. — **FABRICIUS.** *Entomologia systematica*, tome III, pars II. Hafniæ, 1794.
- FR. — **FISCHER VON ROESLERSTAMM.** *Abbildungens*, etc. Leipzig, 1834 et suiv.
- Frey. — **FREYER.** *Neuere Beitraege*, etc.
- Fr. — **FROBLICH.** *Enumeratio Tortricum*, etc. Tubingæ, 1828.
- Geer. — **DE GEER.** *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes.* Stockholm, 1752.
- Geof. — **GEOFFROY.** *Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris*, tome II. Paris, 1762.
- H. — **HUBNER.** *Sammlung Europäischer Schmetterlinge*, et texte des Teignes. Augsbourg, 1796.
- Lin. — **LINNÉ.** *Systema Naturæ*, 12<sup>e</sup> édit. Holmiæ, 1766.
- Ratz. — **RATZEBURG.** — *Forst-Insecten*, 2<sup>e</sup> partie. Berlin, 1840.
- Réaum.— **RÉAUMUR.** *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes.* 1734 à 1742.
- Ross. — **ROSSI.** *Fauna Etrusca.* Liburni, 1790.
- Sc. — **SCOPOLI.** *Entomologia Carniolica.* Vindobonæ, 1763.
- St. — **STEPHENS.** *Catalog a British Insects.* London, 1829.

### III

Thbg. — THUNBERG. Divers mémoires.

Tr. — TREITSCHKE. *Schmetterlinge von Europa*, tomes VIII et IX. Leipzig, 1830 et 1833; — et supplément, tome X, 3<sup>e</sup> partie. Leipzig, 1835.

Vill. — DE VILLERS. *Caroli Linnæi Entomologia*, tome II. Lugduni, 1789.

W. — *Systematisches Verzeichniss von den Schmetterlingen der Wiener Gegend*, édition commentée par Illiger. Brunswick, 1801.

Z. — ZELLER. *Verzuch einer Eintheilung der Schaben. Isis 1839*, 3<sup>e</sup> cahier.

*Vorläufer einer naturgeschichte der Pterophoridaen. Isis 1841*, 10<sup>e</sup> à 12<sup>e</sup> cahiers (1).

Ces auteurs sont cités par les numéros de leurs descriptions, quand ils en ont mis; sinon par la page de leur texte. Le chiffre, dans ce dernier cas, est précédé de la lettre p. Esper et Cramer sont cités par les numéros de leurs planches; Hubner, par ceux de ses figures. Dans les citations du *Wienergegend Verzeichniss*, la lettre qui précède le numéro est celle de la famille.

Les citations de Linné qui ne sont point suivies des lettres F. S. (*Fauna Suecica*) renvoient toutes au *Systema Naturæ*.

(4) Je regrette de ne pouvoir ajouter à cette liste, ni les commentaires de Charpentier sur le *Wien. Verz.*, ni les divers mémoires publiés par M. Zincken dans le *Magasin Entomologique* de Germar. Je n'ai pu me procurer ces ouvrages isolément, et la distance de Paris à laquelle j'habite s'est opposée à ce que je puisse traduire ces travaux et les consulter aussi longuement que cela m'aurait été nécessaire pour les citer d'une manière précise.

Toutes celles de Fabricius renvoient à son *Entomologia Systematica*, seul ouvrage de cet auteur qui soit employé ici.

Le signe \*, placé en tête d'une espèce, indique que je n'ai pas vu l'insecte en nature, ou que je n'ai pu l'étudier suffisamment.

Outre les espèces décrites par les auteurs, il en existe un nombre assez considérable d'inédites et qui ne sont connues que sous des noms de collection, principalement en Allemagne. Je dois la connaissance de plusieurs d'entr'elles à divers correspondans, et surtout à M. Fischer V. R.; mais il en est d'autres que je n'ai pu me procurer. Toutefois, afin de rendre ce catalogue aussi complet que possible, je les ai placées sous cette rubrique : *Species incertæ sedis*, à la fin des genres ou des tribus auxquels j'ai pensé qu'elles se rapportaient, mais on conçoit que je ne puis rien affirmer à cet égard : il est même probable que quelques-unes d'entr'elles font double emploi avec celles que j'ai décrites comme nouvelles. Rien ne sera plus facile que de les effacer à mesure qu'on s'apercevra de cette surabondance qu'il n'a pas dépendu de moi d'éviter. J'ai ajouté, sous la même rubrique, les noms des espèces que je n'ai pu reconnaître dans les auteurs, quand elles m'ont paru appartenir à un genre; afin que les personnes qui seront plus heureuses que moi, puissent les rétablir à leur véritable place, soit comme synonymes, soit comme espèces séparées.

Par le mot *descriptio*, je désigne le corps de la description d'un auteur. Par celui de *diagnosis*, j'entends la phrase caractéristique latine que plusieurs mettent en tête de cette description. J'avertis ici, en passant, qu'il faut se défier de ces phrases diagnostiques dans plusieurs d'entr'eux qui les ont souvent copiées dans Linné, Fabricius ou Frœlich, de

sorte qu'il arrive quelquefois qu'elles ne s'appliquent pas à la même espèce que le corps de la description.

Le mot *statura* n'est point employé par moi dans le même sens que chez Fabricius, où il désigne tantôt la *taille*, tantôt le *port*, le *facies* d'une espèce. Pour éviter toute confusion, *statura* sera toujours employé ici dans la première acception, comme synonyme en un mot de *magnitudo*. Pour exprimer la ressemblance de port, je me servirai du mot *habitus*.

J'aurais voulu pouvoir donner aux expressions dont je me sers pour désigner les couleurs, une signification précise et invariable; mais, tous les dictionnaires eux-mêmes n'étant pas d'accord sur leur traduction, j'ai du suivre en cela l'habitude des anciens auteurs. Ainsi, il serait inutile de chercher ici une différence toujours constante entre les mots : *luteus* et *flavus*, *niger* et *ater* ou *ruber*, *rubens*, *rubidus*, etc.; mais il n'en est pas de même des couleurs exprimées par comparaison avec un corps naturel bien connu. Ainsi, on pourra être sûr que je n'ai jamais employé comme synonymes : *albus* et *niveus*, *flavus* et *croceus* ou *paleaceus*, *ruber* et *ferrugineus*, *fuscus* et *corticinus*, etc., et que les derniers désignent toujours la nuance, aussi positive que possible, de l'objet de comparaison.

Forcé, par la nature même de cet ouvrage, de me resserrer, pour les nombreuses notes qui l'accompagnent, dans le plus petit espace possible, j'ai dû chercher à renfermer beaucoup de choses en peu de mots et enchérir encore sur la concision de la langue latine, en sorte qu'il est beaucoup d'expressions qui sont souvent sous-entendues (*esse*, *est*, *sunt*, *hanc*, *eam*, etc.). J'ai tâché que le style y perdit le moins possible de sa clarté, mais je n'ose me flatter d'y être toujours parvenu. Quant à l'élégance et à la

## VI

correction , on sent que ce n'est point dans un pareil ouvrage qu'il faut les chercher. Je ne réponds même point de n'avoir pas laissé échapper quelque grosse faute que j'aurais vertement relevée quand j'étais élève de sixième , mais j'ai affaire à un public peu exigeant sous ce rapport , et qui préfère les choses aux mots ; et, quant au public exclusivement littéraire , comme il ne me lira point , je ne pense pas qu'il soit besoin de réclamer de lui une indulgence que Linné lui-même n'en a pas obtenue.

Enfin , je ne puis me dispenser de répéter encore que ce catalogue , malgré le long temps qu'il m'a coûté , n'est que le prodrome d'un ouvrage de plus longue haleine que je prépare sur les microlépidoptères , mais que je regarderais comme une témérité de publier aujourd'hui , quand je songe à l'état imparfait de la science , et au nombre prodigieux des espèces qui restent à découvrir sur tous les points de l'Europe.

Ce qu'il faut obtenir avant tout , c'est de s'entendre dans cette Babel qu'on nomme Microlépidoptérologie , et , si l'*Index* qui va suivre peut amener quelque fixité dans les dénominations et faciliter l'étude des petites espèces aux entomologistes qu'a rebutés jusqu'ici la confusion des langues , je croirai qu'il a atteint son but , malgré les nombreuses imperfections qui doivent nécessairement s'y rencontrer.

Châteaudun , 1<sup>er</sup> juin 1844.

A. GUENÉE.

## LEPIDOPTERORUM NOCTURNORUM

## **Divis. VIII.**

## TORTICES

LINNÆI.

Tribus I.

## CYMBIDI Gn.

GEN. 4. HALIAS Tr.

**Curt. D. — *Chlæophora* St.**

†

— { PRASINANA Lin. 285, W., H. 458, Tr., D. . . . . Europ.  
Fagana F. (non W.)

11

— CLORANA Lin. 287, W., F., H. 160, Tr., D. (4) . . . . . Europ.

VERNANA F. 9, H. 464, Tr., D. . . . . . . . . . Germ.

(1) Ad hanc speciem Lin. et Vill. referunt, comparandi causa, *Tort. Viridanam* et *Lept. Literanam* quas simillimas dicunt; at colore tantum illud est accipendum.

## Tribus II.

## TORTRICIDI Gn.

**GEN. I. SARROTHRIPA. Curr.**

D. St. — *Penthina* Tr.

Europ.

<b>REWAYANA</b> W. e-17, Tr., D. <b>Rivagana</b> F.  <b>Var. a.</b> { <i>Illicana</i> F. 100, St. Punctana H. 9.  <b>Var. b.</b> <i>Dilutana</i> H. 6.  <b>Var. c.</b> <i>Ramosana</i> H. 10. (non D.)  <b>Var. d.</b> <i>Ramosana</i> D. Sup. 314.  <b>Var. e.</b> <i>Undulana</i> H. 7, Curt., St.  <b>Var. f.</b> <i>Degenerana</i> H. 8, Curt., St.
---

**GEN. 2, TORTRIX Lin.**

et omn. auct.

2

(1) Omnes hic usque auctores Amerianam Linnæi facilime agnoscere videntur. Quod verò ad me attinet, certitudinem omnino abesse fateor. Descriptiones enim Syst. nat. Faunæque Suecicæ obscuræ admodum et incompletæ apparent, picturaque Reaumurii tab. 18, à Linnæo allegata, omnino inagnoscenda videtur. Si verò accurate omnia interrogantur, forsitan Amerianam Lin. ut marem, Rosanamque ejusdem auctoris ut feminam Tort. *Lavigana* accipere non prorsus inconsultum videbitur. — Fabricius et Theresiani quoque Linnæum referunt, nihilque amplius addunt. — D. Frölich, sub nomine *Rosana* hanc descripsisse videtur, quippecum *Pyrastranum* II. allegat, posterius verò (in text. Hubn., p. 2) sub eodem nomine varietatem *Lavigana* assert (II. 302). — Idcirco, nomen *Ameriana* prorsus delendum, nomenque certum hujus speciei antiquius, scilicet Hubneri, adhibendum censeo.

- 3 -

* TESTACEANA Ev. p. 486.	Russ. mer.
{ ♂ PICEANA Lin. 299, Cl., Fr. . . . .	Germ.
Xylosteana H. 264, Fr.	
{ ♀ Oporana Lin. 292, F., H. 412, Tr., Fr., D., Frey.	
Hermanniana F., W.	
{ XYLOSTEANA Cl. t. 2. f. 6, Lin.? , F., W., Fr. ?, D. (4) .	Europ.
{ Var. ♀ Characterana H. 425.	
{ ♀ CRATEGANA H. 407, Fr. ?, Tr., D. . . . .	P.
♂ Roborana H. 426, D.	
{ Xylosteana Var. Tr., FR.	
Piceana Fr. (non Lin.)	
{ SORBIANA H. 413, Fr., Tr., D., Frey., Ev. . . . .	P.
{ Avellana St., Lin. f. s. 4316? (2)	
DECRETANA FR. p. 412, Tr., D. Sup. . . . .	Germ.
{ LÆVIGANA W. d-12, F., Tr., FR., D. Sup. . . . .	P.
♂ Acerana H. 418, D., Fr.	
Ameriana Lin. ?, F.?, W.?	
♀ Oxyacanthana H. 417, St., D.	
Variana F., Fr.	
Rosana Lin. ?, Fab. ?, W. ? H. 302, Fr. (text. H.)	
{ RETICULANA H. 271. (non F. nec Fr.) . . . . .	Germ.
Orana FR., Tr., D. Sup.	Hungar.

(1) Picturam Ilubneri 264. D. Frölich indicat. Nonne *Xylosteana* illius non esse genuinam inferendum est?

(2) S. N. descriptio non hic pertinet. F. S. verò proprius convenire videtur; at nullo modo primita. Ideo Linnaei nomen applicare non audeo, etsi species hæc vulgatissima ab eo verisimiliter nota fuerit. — Ceterum, hoc *Arellana* nomen jam tribus speciebus, et semper inconcinniter, imposuerunt commentatores, scilicet: huic, Tortrici *Cerasana*, et, in museo Schiff., varietati *Are. Baumanniana*.

{	DUMETANA Tr. Sup., FR. . . . .	Hungar., Bavar., Gall. centr.
{	Cratægana Frey. tab. 48, fig. 4. (1)	
TRANSITANA Gu. (2) . . . . .		Gall. occid.
{	CINNAMOMEANA Tr. VII. p. 64, FR. . .	Germ., Austr., Alp. Delphin.
{	Croceana Fr.	
—	{ HEPARANA W. d-3, Tr., D., Ev. (3) . . . . .	P.
{	Carpiniana H. 416.	
{	Pasquayana Fr.	
{	Var. Rubrana B <sup>n</sup> . Mosc.	
{	Var. immac. ? Pasquayana F.	
—	{ RIBEANA H. 414, Fr., Tr., St., D., Ev. . . . .	P.
{	Var. Cerasana H. 419, Tr., D. (4)	
{	Avellanæ Fr.	
—	{ CORYLANA F. 76, Fr., Tr., St., D., Ev. (non H.) . . .	P.
{	Textana H. 445.	
—	{ CROCEANA H. 420, St. . . . .	Gall. mer.
{	Ochreana Var. D. tab. 265.	
{	PRONUBANA H. 421, Tr.	
{	Var? Ambustana H. 332, Fr., D. . . . .	Italia.

\*

(1) D. Freyer invenit, at nomen jam impensum imposuit. Vid. suprà. — Hanc ego circa Castordanum quoque inveni.

(2) Statura *Dumetana*, illique ac *Lavigana* affinis at colore griseo anticearum, cinereo que posticarum absque fulvo, alisque minime retuis, etc., ab utraque distincta. — Ale antice griseo-pulverem, sericeem, vix reticulatam, margine rotundatam, striga basali arcuata, media obliqua, irregulari, late, propè costam strangulata, extùs valde flexuosa, linea que costali arcuata ante apicem griseo-fusca. Fimbria lucida, sub-albicans. — Ale posticæ ex toto cinereæ, subtùs albicanter, apice paulòm reticulatae, absque rufo. — In Gallia, Germania, etc. dumetis, Augusti.

(3) Fabricii *Fascianam* e. s. 78, omnes fere auctores hic referunt, et ipse *Heparanam* W. allegat; descriptio tamen ejus nullo modo convenit.

(4) *Cerasanam* H. omnes auctores speciem separatam declarant. Multas ego vidi aut accepi; sed has semper varietates *Ribeana* plus-minus vel disco adumbratas esse certior factus sum. Ex eadem larva quoque obtinui. *Ribeana* preterea validè variat, sive fascia media strangulata vel recta, sive strigulis rufis alarum anticarum, ferè ut in *Corylana*.

(1) Primus sub nomine *Flavana* D. Duponchel hanc speciem edidit: posterius verò eamdem in supplemento secundo nomine, scilicet *Unifasciana*, donavit. Illoc tamen eligo, nam quoties jam nomen *Flavana* impensum fuit! — Huic potiù speciei, multas varietates præbenti, quam *Semi-albana* pictura 239 Hubneri applicari posse videtur.

(2) An varietas foret praecedentis?

(3) Nullo modo *Consimilana* H. esse potest quia neque lineam basalem, neque terminalem dentatam, neque colorem aurantiacum, etc. præbet. Hæc verò alas posteriores semi-albidas, semi-nigricantes præcipù offert; quod in *Consimilana* H. minimè observatur. Præcedenti potius pictura Hubneri convenit. — *Semi-albata* diagnosis sequitur: Statura *Strigata*. Ale antice, stramineæ, sericeæ, basi latè infuscato at absque linea; fascia media obliqua, lata, maculaque costali versù apicem, lineolam usque ad angulum internum emittente, fusco-rufis. Postica albicans, apice strigulata, margine interno latè cinereo; subtus ex toto albida. — Junii, in sepiibus.

{	VIBURNANA W. c-15, F., Tr., Fr., St., D. . . . .	Germ.
{	Unitana H. 423.	
{	♀ Rhombana W., Tr., H. 173? (4) D.	
—	{ ICTERANA Fr. 454 (2). . . . . . . . . . .	Alpes.
{	Flavana H. 258.	
{	* PALLEANA Tr. (3)	
{	Flavana H. 457. (non Fr.)	
{	Viridana var. Fr.	
—	VIRIDANA Lin. 286, W., F., H., 456, T., D. . . . .	P.
—	{ MINISTRANA Lin. 300, Cl., W., F., Fr., T., D. . . . .	P.
{	Ferrugana H. 56.	
—	{ Var. Ferrugana D. 4309.	
	ROGANA Gn. (4). . . . . . . . . . . . . . . . .	Alpes.
—	UNICOLORANA D. 4442 (5). . . . . . . . . . . . .	Gall. mer.
—	{ DONZELANA Gn. (6) . . . . . . . . . . . . .	Gall. bor., Pyr. or.
{	Viduana D. 4316. (non Fr., H.)	
*	VIDUANA Fr. 48, H. 303, an huj. sect? . . . . .	Germ.
—	{ ADJUNCTANA Tr. p. 54, FR., D. Sup. . . . . . .	Europ.
{	Sineana Frey.	
{	Reticulana Fr. (7) (non H.)	
	Var. Laviceana D.	

(1) An hæc vel *Contaminana* varietas? — Imago tetterima.

(2) In Alpibus Galliæ à Dr. Brund et Estreyer capta.

(3) Non vidi. — Huic-næ vel præcedenti *Palleana* Eversm. (faun. p. 494) pertinet?

(4) Statura *Viridana*, alis verò omnibus angustioribus. — Antice fusco-æneæ, atomis numerosissimis flavidis. Postice supra fuscæ, subtùs albidae, simbris omnium albidis. Caput flavicans abdomen anusque albida. — In Gallia meridionali à D. Donzel inventa.

(5) Distincta à præcedente et ab omnibus aliis longiusculis, posticisque lucidioribus, nervis fuscis.

(6) Pulchra species, at minimè *Viduana* Fr. descriptioni neque Hub. picturæ convenit.

(7) Omnipotens descriptio concordat; sed quomodo *Reticulanam* H. Frölich refert! — *Forsteranam* F. c. s. 37, varietatem bimaculatam hujus speciei forte credas; vide autem gen. *Leptogramma*.

†† (Gen. *Pacilochroma* St.)

— MAURANA H. 422, Tr., D. . . . . . . . . . . P.

SPE. INCD. SCD.

VULPISANA Fry.

ROESLERSTAMMANA Lefv.

STRAMINEANA FR.

TUSSILAGANA Khl.

CHRYSATANA H. 317, Fr.

PSEBEJANA Fr. 47.

CENTRANA F. 433.

MODEERIANA Lin. 321, F.

PALLIDANA F. 27.

AURANA F. 21. (non 454.)

GRISEANA H. 435. (non F.)

---

— GEN. 3. DICHELIA Gn. (1)

*Tortrix et Sciaphila* Tr., D.

{ HISTRIONANA Fr. 425, H. 340-41, Tr., D. . . . . Germ., Alpes.  
{ Hybnerana F. ?

DIVERSANA H. 251, Tr., D., Ev. . . . . . . Austr.

— { GROTIANA F. 427, Fr., Tr., D. . . . . . . P.  
{ Flavana H. 433.  
{ Var.? *Grotiana* Ev. faun. p. 499. . . . . . Casan.

---

— GEN. 4. AMPHYSA Curt.

St. *Tortrix* omn.

— { GERNINGANA W., b. 44-45, F., Fr., T., D. . . . . Austr., Germ.  
{ Pectinana H. 408.

---

(1) Hocce genus. *Sciaphila* ferè revocat.

**GEN. 5. GENECTRA. Gn. (1)**

**Tortrix omn.**

- PILLERIANA W. b-2, F., H. 172, Tr., D., Ev. . . . Gall. mer.  
 Vitana F., Lat., Audouin., Bosc.  
 Luteolana H. 136.

### GEN. 6. LEPTOGRAMMA. St.

**Curt. *Glyphiptera* et *Teras* D., *Teras* Tr.**



(1) *Affini minimum certè Tortricibus genus; at sat distinctum palpis antennisque insecti perfecti, moribus Larvæ, pupa mutica, etc., etc.* — *Œnectra Pilleriana* in quibusdam regionibus vinetarum pestis, adèo fortunatim apud nos rara est, ut ad instruenda musea ab eis petenda sit. — Cave ne permiscas, ad instar D<sup>r</sup> Frélich (p. 15, 16), cum hac specie, alium prorsus uavarum hostem scilicet: *Botrana W.* (*V. Vitisana* Jacq.). Hæc mox in genere *Lobesia*, *Cochylidarum* tribu, apparebit.

(2) Species circa Parisios in ulmis vulgatissima; at nomen *Ulmana* alias impensum. In museis Germanis sub nomine *Irrorana* H. designatur, si immeritò. *Forsterana* Fab. nimis inconcinnata descriptio pluribus sàe speciebus applicari potest, *Adjunctana* qua varietatem bimaculatam sub hoc nomine accepi; sed istam potius credam, nam *Costanam* (E. S. 40) statura omnino illius, aliquo magis planis gaudere dicit. *Forsterana* idèo generibus *Teras* aut *Leptogramma* pertinere videtur. Sed quid certi de hac affirmandum?

LORQUINIANA D. 4175. An var. præced.?	Gall. bor.
{ BOSCANA F. 416., D. . . . .	P.
Var. Cerusana H. 63, Tr. (4)	
{ TRERVERIANA W. e-40, H. 100, Tr., D., FR. . . .	P.
Niveana F., Fr.	
Var Cerusana D. 4336. (non H.)	
Var? Spectrana D. 4156. (non Tr.) (2)	
SPEC. INC. SED.	
PSORANA Fr. 44.	Germ.

SPEC. INC. SEP.

**PSORANA** Fr. 44. . . . . Germ.

GEN. 6. TERAS. Tr.

*Glyphiptera, Peronea, Teras D. St.*

1

LIPSIANA W. d-9, F., H. 180, T., D. . . . .	Germ.
- { FAVILLACRANA H. 62, Fr., Tr., D. . . . .	P.
{ Var. <i>Lividana</i> Tr. (absque macula costali.)	
* SUDORIANA H. 283, Fr. . . . . . . . . . .	Germ.
* MACCANA Tr. . . . . . . . . . . . . . .	Sax., Bohem.
MIXTANA H. 215, Tr., D. (non F.) (3) . . . . .	Gall.
{ RUFANA W. d-8, F., H. 178. (non Fr.) . . .	Gall. bor., Germ.
{ Lucidana Tr.	
{ Densana Frey.	
{ Crassana D. Sup.	

(1) *Boscana nostra*, circa Parisios vulgarissima, alas posticas semper griseo-fuscas premit. *Cerurana* verò Hubner posticas albas marginoque tenuiùm infuscatae depingit. Ideo, aut varietatem, aut pravam picturam edidit.

(2) *Spectrana* hec, nullo modo genuina (vid. gen. *Tortrix*), costam excavatiorem pilisque magis inductam, maculas claram anticearum, fimbriamque posticarum saturiores prebel. An diversa species?

(3) *Mistana* Fab. adhuc ignoratur.

DIVISANA H. 198. (4) . . . . .	Gall. mer.
APICIANA H. 87, Tr.	
— SCHALLERIANA Lin. f. s. 4339, F., H. 288, Tr., D. .	Europ. bor.
— COMPARANA H. 284, Tr., D. (2) . . . . .	Europ. bor.
LACORDAIRIANA D. 4352. . . . .	Russia.
	††
ARCTICANA Gn. (3) . . . . .	Lapp., Groenl.
* HASTIANA Lin. 344, Cl., W., F. (non H.) (4) . .	Suecia.
PERMUTANA D. 4349. (5) . . . . .	Hungar.
— { ABILDGAARDANA F. 438, Fr., Tr., D. . . . .	Europ.
{ Cristana H. 55. (non 176.)	
{ Variegana W., F.	
— { NYCTEMERANA H. 240 (6) . . . . .	P.
{ Asperana F., D. (non W.)	
{ Variegana Fr.	

---

(1) Species eximia. Statura Schalleriana. Ale nitide, primores linea longitudinali à basi ad apicem ducta, fusco-ferruginea, colorem suprà albo-griseum, infrà griseo-fuscescentem separante. Posticæ cinereæ fusco tenuiter strigatae. Insul. Hyeres et circè Monspelium.

(2) An semper à precedente distincta?

(3) Statura Abildgaardana. Ale antice obscure, sericeæ, fusco, violaceo ferrugineoque coloratæ, fascia media lata, irregulari, infernæ dilatata, dilutioni, in medio ferrugineo tincta: interdum macula simili in angulo interno, fimbria concolore; posticæ omnesque subtus cincereonitidulæ. — D. Lefebvre e Lapponia et Groenlandia accepit. In femina macula anguli interni dilutior, magna, rotunda, strigis duabus oppositis, fuscis, interrupta.

(4) Quænam sit genuina Linnei Hastiana à Clerck, tab. 2. f. 7, depicta adhuc ignoro; at speciem esse propriam valde dubito. Forsan varietas alicuius Penthina (in Salice) vel ad aliquam Scabranæ varietatem referenda. — Hastana H. minime ad hanc accedit.

(5) à D. Fischer v. R. detecta et nominata, sed D. Duponchel primus edidit. In genere vero Glyphiptera prorsus immerito eam collocavit.

(6) Distincta à precedente primo intuitu videtur, eamque nunquam ex eadem larva obtivui

+++

—	{	CRISTANA W. d-10, H. 476., Tr., D., Fr. . . . .	Gall.
		Var. <i>Sericana</i> , H. 83, D.	
		{ <i>Ephippana</i> F. Sup. 122-3.	
		Var. { <i>Cristana</i> F.	
		{ <i>Lefebvriana</i> D.	
		Var. <i>Combustana</i> D. 4170. (non H.)	
		Var. <i>Desfontainana</i> F. 410.	
		Var.? <i>Rossiana</i> F. 68.	
		Var.? <i>Autumnana</i> H. 247, St.	
		Var.? <i>Profanana</i> F. 411.	
—	{	SCABRANA W. e-12, H. 58, 169, Tr., D. (non F.) . Austr., Germ.	
		<i>Elevana</i> F.	
		Var. <i>Radiana</i> H. 177, St. (non D.)	
		Var. <i>Aquilana</i> H. 235, Fr.	
		Var. <i>Byringerana</i> H. 64, St.	
		{ <i>Buringerana</i> H. 246.	
		Var. { <i>Hastiana</i> Fr.	
		Var.? { <i>Sparsana</i> W. e-4, Fr., Tr.	
		{ <i>Sponsana</i> Fab.	
		Var.? { <i>Combustana</i> H. 234, St.	
—	{	{ <i>Cristana</i> Fr.	
		Var. <i>Mayrana</i> H. 335.	
		ABIETANA H. 275, Tr., FR. . . . . . . . . . .	Germ.
		Var. <i>Opacana</i> H. 334.	
—	{	Var. <i>Confixana</i> H. 277, Fr.	
		Var.? <i>Leprosana</i> Fr.	

licet apud nos frequentius inveniatur; attamen in copulatione cum *Abildgaardana* inventa est. Nova igitur experimenta agantur. — Nomen *Asperana* Fab. Dup. jam aliam speciem designabat. *Variegana* Penthinam indicat, licet in museo Schifferm. (teste D. Fischer v. R. in litteris) Teras *Abildgaardana* sub hoc nomine inveniatur, diagnosisque Wien. Verz. huic applicari potius possit. At Penthina *Variegana* quoquā sub hoc nomine (teste eodem) versatur! Imò, D. Frölich *Variegana* W. et F. ad *Nyctemeranam* Hubneri applicat. Ut igitur deleatur omnis confusio, *Variegana* Penthina sit; hancque speciem nomine Hubneriano designemus.

(1) Statura vix *Abildgaardiana*. — Alae antice vix elongatae, costa convexa, vultus obscurus, nitidus, fusco-ustulatus, apice paululum striatus, lineis tribus inferrupitis è squamulis elevatis, exterius nigris, interius ad lucem flavicantibus; fimbria concolore. Postice fusco-nigra, subtus vix tessellata. Corpus antennaeque fusco-nigra. Capta in agro Pictonico à M<sup>me</sup> Lesage cuius non nullis Entomologiis gaudet investigationibus.

(2) Hanc ego speciem nondum vidi, varietatemque sequentis timerem, nisi D. Fischer v. R., entomologus ille praeclarus, speciem distinctam omninoque cum exemplaribus musei Schissler mulleri congruentem affirmaret. — Nunc, Theresiani *Fucanam* Lin. allegant: quia vero sit ista *Fucana* difficilis est detectu. Clerck, tab. 2. f. 1, hanc depingit, sed ita ut omnino sit in agnoscenda, Pyralidamque generis Botys, ut ita dicam, revocet. Hæc omnia meditanda.

(3) *Ferrugana* appellatione à precedente usurpata, *Rufana* ab altera, *Tripunctata* *Spilonotana* designante, *Logiana* non sat certa, *Tristana* rarissimam varietatem indicante, nomen novum adhibere necesse fuit. *Ochreana* Frcl. certè huic pertinet, minimè vero ad *Tort.* *Ochreanam* Hubneri cuius picturam haud bonam D. Frölich inconsultè declarat. — Nulla huc usque species noscitur quæ tantas et tam discrepantes varietates gignat, adeò ut tredecim *Fischeri* picturæ

{ BRACHIANA Frey. (4) . . . . .	P.
	Approximana F.?
{ ASPERSANA H. 259, Fr., FR., D. (2) . . . . .	P.
	Ferrugana var. Tr., D. Sup.

**SPEC. INC. SEP.**

STEINERIANA W., H. c-14-15, H. 170.

PODANA Scop. 583.

GILVANA Fr. 23.

ad exprimendos typos omnes non sufficient. Scèpè enim alarum color omnino mutatur, maculaque triplex coste alarum superiorum vel puncta effornat, vel fasciant usque ad marginem internum descendenter lingit, vel prorsus abest. Cave igitur ne iuvenias animal omnino novum characteribus insignibus innixum quod tamen serius ad hanc *Proteanam* fortè redeat.

(4) Alae breviores, rotundatae, carneæ, atonit strigisque rufis conspersæ, absque macula costali. Postice albidae, subtus reticulatae.

(5) Ales elongatissimæ, fusco-violaceæ, nitidissimæ, maculis vix distinctis, ferè ut fig. 1, a, tab. 25 Fischeri. — Ad sequentes transit: vix vero camdem dicas.

(6) *Logiana Liunae* adhuc est in tenebris. Pictura Clerckii fabulosum animal effugit. Ideo nec Theresiana, nec D. Treitschke, nec Hubner genuinam *Logianam* tetigerunt. Nomen igitur delendum.

(7) Ales albo-margaritaceæ, nitidæ, macula magna subtriangulari costali, finabriaque fusco-ferrugineis. Varietatum omnium fallacissima.

(1) Distincta videtur; sed, si *Proteana* inspicio, nihil neque de hac specie, nec de *Aspersana*, nec de *Ferrugana*, nec de *Arcticana* affirmare audeam. — Statura vix *Aspersana*, ~~est~~ antica obtusiores, cervino pallidissimae, maculis tribus costalibus sepe obsoletis, saturationibus. Squama scabre lineolam mediani fingunt. Punctum nigrum propè basim observatur. Alia postice ex toto cinerea, limbria cervino-alba. — Inter corylos volitat mensibus Junio et Julio, *Proteana* semper absente, quarē olim *Estivanam* appellaveram. D. Fischer non hanc pinxit. — *Approximanam* Fab. sup. 116-117 ad hanc retuli; verba enim « pallide flavescutia » convenient; sed fortè ad *Proteanam* tamen accedit.

(2) In aliis quoque locis et temporibus quam Prutana volunt. Ideo distinctam quoque censem. D. Frölich alias posticas niveas dicit! — Hubner *Aspergemanam* scriptis; Frölich et Dupouchel *Adspersanam*.

QUERCINANA Mann.

BORANA F. 420.

LATERANA F. 90.

UMBRAEULANA Ev. faun. p. 519.

OBTUSANA Ev. faun. p. 524.

LONGULANA Ev. faun. p. 525.

HASTANA H. 186, Tr., Ev. (non Lin.)

---

GEN. 7. PERONEA. St.

Curt. *Teras* Dup.

† *Peronea* St.

—	{	CONTAMINANA H. 442, Tr. Fr., D., St. . . . .	P.
—		Reticulana? F. Sup.	
—		Var. <i>Ciliiana</i> H. 471, St., D.	
—		Var. <i>Rhombana</i> D. 4479. (4)	
		Var.? <i>Dimidiana</i> H. 299, Fr. (non Tr.)	

†† (*Glyphisia* St.)

{	EFFRACTANA Fr. 30, Tr., FR. (2) . . . . .	Austr., Germ.
{	Caudana H. 282.	

---

(1) Non *Rhombana* aliorum auctorum. — Non ipsius D<sup>r</sup> Duponchel *Rhombana* (*Suppl. tome IV, page 130*). Utrisque vidi, neutraque speciem validam constituit.

(2) Super hanc et sequentem D. Fischer v. R. ubertim dissertavit: at ego, sedulo collatis Hubneri picturis, Frölichii sententiam amplexus sum.

GEN. 8. DICTYOPTERYX St.

*Tortrix* D., Tr.

1

- { LÖFLINGIANA Lin. 305, Cl., F., Fr., D., St. . . . P.  
 Var. *Plumbana* H. 54, Fr., D. (non F.)  
 Var. *Ectypana* H. 490.

**BOLANDRIANA** Lin. 340. W., E., H. 474. Tr., D., Germ.

十一

FESTIVANA H. 52; Tr., D. (1) Hungar., Gall., mer.

HOLMIANA Lip., 308. W., Cl., F., H., 39. Fr., Tr., D., P.

TREITSCHKEANA Tr. p. 74; FB. Hungar., Odessa.



FORSKALEANA Lin. 304, Cl., W., F., H. 443, Fr., Tr., D.      Europ.

(1) Nescio cur D. Treitschke, hanc speciem ubique male congruam contendens, inter *Sriphilas* eam tandem collocat. Placè mili huic generi pertinere videtur. — D. Donzel circa *Digna* eam quoque reperit.

— GEN. 9. ARGYROTOZA St.

*Cochylis* Tr. *Tortrix* et *Argyrolepis* D.

{	CONWAYANA F. 149. Fr.?, Vill. (1) . . . . .	Europ.
	Hoffmanseggiana H. 150, Tr., D.	
	Spixiana Fr.	

— GEN. 10. PTYCHOLOMA St.

*Tortrix* Tr., D.

LECHEANA Lin. 304, Cl., W., F., H. 67, Tr., D. (2)	P.
--	----

* GRAPHITANA Ev. faun. p. 496. . . . .	Casan.
--	--------

(1) Illece species, nica quidem sententia, Fabricii genuina est *Conwayana*, eti ipsa *Montanam* Wien. Verz. alleget. Ubi enim in *Montana* puncta argentea sparsa in disco? Ubi maculae duo costales? etc. Descriptio, contrà, eximiè huic convenit. — Potius de Frelichio dubitarem precipuè dūm *Spixianam*, cuius descriptio omnino convenit, hanc rursus esse video. Omnia hæc ponderentur.

(2) Frölich alarum superiorum maris plicaturam costalem animadversisse videtur; dicit enim: mas costa basi *plumbea* distinguitur. Quenam sit hujuscem plicaturæ utilitas nemini adhuc occurrit. Non nulla verò Lepidoptera, sive Europæa, sive exoticæ, in tribubus inter se remotissimis hæc appendice muniuuntur, et semper illa mari tribuitur. Nature ne inania hominum ornamenta imitandi jocus placuit, quo modò sinus in aliis posticis villoso, modo succulos inter nervos, modo maculas orbiculares pulvreas Lepidopteris donavit? Vel potius oculi nobis desunt, aut sagacitas detegendi?

### Tribus III.

#### PENTHINIDI Gn.

---

---

##### — GEN. 1. DITULA St.

*Tortrix* Tr. — *Penthina* D.

---

{ HARTMANNIANA Lin. 306, F., Tr., D. (1) (non Clerck.)	P.
Lineana W.	
Scriptana H. 410, Fr., St.	
{ ACUTANA Tr. Sup. p. 68, Frey., D. Sup. . . . .	P.
{ Elutana D. 4335. (2)	

---

---

##### — GEN. 2. PENTHINA Tr. D.

† *Larvæ foliis vescentes.*

---

{ PICANA Fr. 101 (3) . . . . .	Gall.
Corticana H. 43.	
Hartmanniana var. Tr. Sup. in not.	
Capraeana D. pl. 245, fig. 4. b.	

---

(1) *Bergmannianam* describendo, Linneus dicit hanc simillimam esse *Hartmanniana*. Inde dubitandi ratio. — Clerck nec-nou Hubner siam prorsus sub isto nomine Tortricem pinxerunt. Vide infrā.

(2) Sub nomine *Elutana* D. Duponchel primus hanc speciem creaverat; et ipse postea, in supplemento, eamdem sub nomine Treitschkiano rursus edidit.

(3) Prorsus distincta ab aliis. Nigro-cærulea: alis anticus oblongis, nigro-cæruleis, striatis, maculis 2 basalibus longit. albis, altera media integra, altera costali interrupta; apice alee latè albo, strigis undatis griseis punctulisque nigris notato, fimbria subtus intersecta; posticis suprà fuscis, subtus cinereo-albidis, griseo tessellatis. Capite thoraceque nigris.

<ul style="list-style-type: none"> <li>— { LEUCOMELANA Gn. (4) . . . . . Gall. centr.</li> <li>  { Pagana? H. Larv.</li> <li>  { Capræana D. pl. 245, fig. 4. a.</li>   <li>— CAPRÆANA H. 250, Tr. (an verè dist.?) . . . . . P.</li>   <li>— { VARIEGANA W. e-6, H. 14, Tr., D. . . . . P.</li> <li>  { Fasciana? H. Larv.</li> <li>  { Pæcilana Fr.</li>   <li>— PRÆLONGANA Gn. (2) . . . . . , . . . . . P.?</li>   <li>— { PRUNIANA H. 45, Fr., Tr., D. (3) . . . . . P.</li> <li>  { Fasciana? Lin., W., Scop., Geoff. (non F.)</li>   <li>— { OCHROLEUCANA H. 304, Fr., Tr., Sup. (4). . . . . P.</li> <li>  { Gentianæana D. (Exclud. larvæ descript.)</li> </ul>	
OCHROMELANA Gn. (5) . . . . .	Gall. mer.

(1) Pulcherrima Penthinarum ; statura *Variegata* at alis rotundioribus. — Antice nigra, fusco ceruleo que marmorata, vitta basali longitudinali albo carnea, nigro punctata; tertia alarum parte nivea, nitida, trianguli, strigis cinereo-plumbis undata, vix strigulis 1 vel. 2, nigris, macula carnea in medio basis: subtus fuscis, albo cinctis. Postice rotundata, supra cinerea, subtus albida, cinereo vix ad costam tessellata; thorace carneo nigroque marmorato. — In Betuletis, Junii. Larva similima pict. *Paganæ* Hub., vitam degit, mensis Maio, intra folium betule ad instar siliquæ complicatum.

(2) Distincta ab omnibus aliis oblongis. — *Prunianæ* affinis, at major. Ale antice oblongæ, apice acutæ, nigro-fuscae, macula quadrata costali alba in fasciam griseam desinente, tercia ala parte alba, apice fusco, strigis fuscis quarum una latior, incurva, apice quadrata, in simbriam decurrit. Postica cinereo-albidæ, suprà in mare albida. Tres ego in museis Parisiensibus vidi, sed ubi captas?

(3) Forsan vera veterum auctorum *Fasciana*, sed quid certi inferendum ex brevissimis descriptionibus que omnes *Penthiarum* species revocant? Larva, secundum W., in Pyro cydonia viveret! Apud nos *Prunus spinosa* diruit. Scopoli larvam ponis vescentem dicit et sic *Varieganan* potius descripsisse videtur. — Ideo, nomen recentius adoptandum.

(4) *Species vulgatissima*; *Larva rostellarum pestis*.

(5) *Afennis Ochroleucana*: sed multò minor, et certe diversa thorace unicolor, signaturis alarum etc. — *Statura Prunianæ*. Thorax ex toto nigrum. Caput antennaeque nigra. Alæ antice nigrae, cœruleo variegatae, fascia ochroleuca maculam quadratam costalem perspicue

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| { * DOMESTICANA Kuhl. . . . .                | Russia.                 |
| { Dinnidiana Tr., (4) Ev.                    |                         |
| INCARNATANA H. 491, Fr., D. . . . .          | Germ., Hungar., Helvet. |
| SAUCIANA Fr. 413, H. 305. (non D.) . . . . . | Germ.                   |

†† *Larvæ endophytæ.*



SPEC. INC. SEE.

LAPIDEANA FR.

### **GEN. 3. ANTITHESIA St.**

Penthina Tr. D.

- \* **LUGUBRANA** Tr. An huj. gen? .

essingente, tunc nigro-ceruleo usque ad marginem internum conspersa; tertia alae parte carneo-ochroleuca, puncto majori nigro ad basim, apice extremo infuscata, maculaque grisea pyriformi, ut in Sericordibus, fimbriam attingeat; subtus fusca, marginibus late carneo-ochroleucis. Alae posteriores supra fuso-nigrae, subtus albidae, medio infuscatae. Hujus speciei ego unicum exemplar in Gallia meridionali, nisi immemor sim, cepi.

(1) Nomen *Dimidiana* jam bis impensum. Vide supra et infrà.

(2) Nomen à traditione præsertim inditum; descriptio enim Frélichii picturæ Hubneri non optimè hanc speciem exhibent. — Simillima est *Gentianana* àt minor, et omnium Pentlinarum minima. Differt præterea corpore graciliori, alisque posticis in mare disco albidis. — Illius larva parvula, vermisformis, albido-rufa, capite, scutello collari, pedibusque antica nigris, medulla *Dipsacorum*, uti Larva *Gentianana*, vescitur: àt sepius intra séminales alveolos operculo sericeo tecta vitam degit, ibique frequenter metamorphoses subit. Imago mense Maio prodit.

Cum hac *Penthina* et *præcedente*, moribus larvarum valde, habituque insecti perfecti paulum ab aliis discrepantibus, in posterum proprium genus constituere haud impossible erit.

## Tribus IV. (1)

## SPILONOTIDI Gn.

**GEN. 4. SPIILONOTA** Curt.

*Pentning Tr.* — *Aspidia* D.

PAUPERANA FR., D. Sup 353. . . . . Austria.

{ ACERIANA FR., D. Sup. 349. (3) . . . . . Austria, Gall. centr.  
 { Prodromana H? (Larv.)

— ALNETANA GO. (4) . . . . . Gall. centr.

(1) Distincta à precedente forma larvarum, habitu insecti perfecti, thorace non cristato, etc. Haec tribus modo ad *Cochylidas*, modo ad *Grapholithidas* accedere videtur.

(2) Colore griseo tantum ab *Ocettana* differt et ex eadem larva prodit. Illece larva *Cynosbana* similis, brunnea, capite scutello-que collari nigris, in foliis Alni summo vertice contoris, sepius partim exsiccatis, vitam degit, mense Maio.

(3) Rectius *Acerana*; at sic in Germania creatum. *Acerana* speciem non gen. *Tortrix* in *Hubnero* designat.

(4) *Media inter Acerianam et Dealbanam*, fortè alicuius varietás, at obscurior et semper eadem. — *Statura* habitusque *Acerianæ*. Alix antica albido-cinereæ, lincis plumbis atomisque fuscis valde consperse, macula basali fusca, ut in *Dealbana*; at multò minus perspicua; reliquo ale obscuriore, macula discoidali subgeminata, nigra, super hanc adumbratione rufa, angulo apicali rufa, angulo interno linea plumbæ magna, V-formi, quasi speculari, notata. Postice cinereæ. — Junio in altheis.

—	{ DEALBANA Fr. 107., FR. . . . . , . . . . . Germ., Gall.
	Minorana Tr., D.
	Var? Neglectana D. Sup. 598. (4)
—	AMOENANA D. Sup. 552, H. ?, Tr. ? (2) . . . . . Austria.
—	{ SUFFUSANA Kuhl., D. Sup. 547. (3) . . . . . Europ.
	Cynosbana D. (Ins. perf.)
	Marmorana H. 25?
	Communana Gn. oīm. (non F.)
—	{ CYNOSBANA Lin. ( <i>atella</i> ) f. s. 1379., F. Fr. D. (Larv.) (4). Europ.
	Roborana W., Tr., Ev.
	Aquana H. 47, St.

— GEN. 2. PARDIA Gn.

*Penthina* Tr. — *Aspidia* D. — *Spinolota* St.

—	{ TRIPUNCTANA W. e-35, F., Fr. . . . . Gall.
	Cynosbana Tr., St., Ev.
	Ocellana H. 48, D.

(1) Difficilè distincta à *Dealbana* statura majuscula, signaturis nigroribus, ocello apicali rufo nigrò inducto, macula trigona marginis interni saturatiù expressa.

(2) Ille species nova mihi videtur : nec verò *Amenana* Hub. quo eadem est ac *Penth. Incornatana* ; nec *Amenana* Tr. quam difficiliù agnosco.

(3) Ab omnibus ferè cum *Cynosbana* confusa. Distincta verò certè, et moribus Larvæ quo in *Oxyacanthis* vivit, et habitu insecti perfecti. Ille minor est *Cynosbana*, obscurior et marmoratior, aliis anticis minus retinis, macula baseos semper valde versus costam angulata ; posticis angustioribus et utrinquè minus albidis, etc. — D. Duponchel ambas miscuit larvamque unius descriptis cum imagine alterius. — Vix dicam autem pictura 25 Hubneri hanc vel Sider. *Achatanam* effingat !

(4) *Cynosbana* nomen alii ad *Triplutanam*, alii ad *Roboranam* W.-V. applicaverunt. Et quidem *Cynosbetella* Linnei descripsio ambas revocat, at palpos lutes neque in Syst. nat., neque in Fauna suecica ille dicit. Ideò *Triplutanam* minimè designavit.

Tribus V.

SERICORIDI (In.)

#### GEN. 4. ASPIS Tt.

Curt. *Aspidia* D. — *Spitonota* St.



**GEN. 2. SIDERIA Gn.**

*Sciaphila*, dein *Phoxopteryx* Tr. — *Pædisca* D.

- { ACHATANA W. c-27, F., Tr. D. Sup., Ev. ? . . . . Gall.  
{ Marmgorana? H. 25, Fr.

**GEN. 3. SERICORIS Tr. (t)**

D. *Orthotænia* St.



(1) Genus numerosum, synonymiaque difficilis. Hoc, nedum dilucidarent auctores recentissimi, pravis picturis, pravioribusque descriptionibus intricaverunt. — Larve aliquot mihi nolle moribus, habituque A. *Udmani*nam vel Tortricae revocant.

(2) Vix hujus generis; fortè *Aterpia*. — Primo intuitu Grapholithas revocat. Statura *Minutana*. Ale antice basi medioque fusca, luteo mixta, fascia lata, flava, lineolis dorsalibus nigris divisa, apice flave, fusco-inquinata, litora obliqua fusco-lutescens in limbriam flavam, ibi fusco tessellatam, descendente; costa albo nigroque interrupta. Ale postice cinereæ. Corpus fuscum, flavo variegatum, fronte flava, palpis albis. — In Alpibus inventa à D. Bruand.

(4) Hic saltem species sub nomine *Conchana* in museo Dup. versatur: sed ne fidas picture t. 246, f. 1., neque descriptioni pag. 208, quae in errorem te certè inducent. — Illic speciei et *Urticanar* nomina antiquiora restituere voluisse; nil verò prorsus certi obtinere potui. Synonymiam tamen extricare tentavi, istamque, ut probabiliorem, tradō. Scopoli *Riculanam* hanc esse credo. — Theresiani verò, et si hunc auctorem allegant, tamen non eandem speciem designavisse videntur. Potius *Undulana* diagnosis hic conveniret verbis: « *Weißlich geschlangelter Riculana* contrà ad *Urticanam* pertineret. — Fabricium quoque verbis: « *fascia introrsum bifida* » hanc descripsisse puto sub nomine *Riculana*, jureque *Undulanam* W. allegavisse et ad *Undananum* sum *Riculanam* W. retulisse. — Sic demūnū Zincken et Frolich sentiunt. — At D. Fischer v. R., musei Schiff. sedulus contemplator, *Undulanam* W. ad *Urticanam* accedere mili scripsit! — Tam diversis igitur sententiis ego perplexus, nomina Hubneriana nisi genuina, certa saltem, ad exemplar auctorum recentiorum amplexus sum.

(2) Affinis primo intuitu varietati *Cespitana*; at planè alia. Affinior certè *Lacunaria*; at colore subtus pallido alarum posticarum præcipue distincta. — Statura *Lacunaria*. Ale antice albido-olivaceæ, argenteo strigose, macula basali extùs dilacerata, fascia media subinterrupta, macula obliqua super limbriam desinente, anguloque apicali fusco-olivaceis. Postice subtus albe, virga apice fusco cuspisperse. Capita, Augusti, in littoribus herbaceis Armoracie, propè *Sarzeau*.

(3) Species *vulgatissima*, etsi ab omnibus ferè ignorata. Sub hoc nomine in Coll. Schifferm. versatur; ideo Theresianorum *Lacunana* dicenda est, etsi breviori eorum descriptione non agnoscenda sit.

(4) Haec speciem jampridem inveneram et sub nomine : *Lucana designuaram*. Sic misi D<sup>o</sup> Fischer qui invicem huic *Rurestrana* nomen imposuerat. Nonnullas autem inter exemplaria Gallica et Austrica differentes percipere arbitratus est. Ego verò non sat firmas ad specierum separationem existimo. *Oliviana* Dup. text. [e] in collectione quoque ista est; at non in pictura. — *Lucanam* Fr., eminente aliari, non agnovi.

{	STIBIANA (1) . . . . .	Austr.
	Micana Tr., W. ?	
—	{ METALLICANA H. 68, Tr. ?, D. text. ? . . . .	Germ.
	Var.? Schœnerrhana Gn. (2)	
	Var.? Scoriaña Gn. (3).	
	Metallana Fr. ? 156, D. ? text.	
—	{ URTICANA H. 65, Tr., D. (4). . . . .	Gall.
	Rivulana W. ?	
	Undana F. 160. Fr.	
	Var. A. ferrugineo-violacea.	
	Var. Monetana Tr. Sup.	
	Var. ? Murinana H. 105.	
	UMBROSANA Frey IV. 318, D. Sup.. . . . .	Austr., Gall. mer.
*	MYGINDIANA W. e-28. F., H. 481. . . . .	Austr.
—	{ MICANA H. 28, W. ? Fr., D. (5) . . . . .	Germ.
	Olivana Tr.	
	Var. ? Trochilana Fr. 418, H. 313-14.	

(1) *Micana* W.-V. incerta est. Ille nomen igitur ad Hubneri speciem servare decet. — Eximia illa species super montes Austriæ volitat. Quoniam gallicis entomologia parum nota est, diagno-  
smi scribo: Statura *Metallicana*, et inter eam et *Rurestranam* media. Alis antice, olivaceo-  
ochraceæ, striis nigris, presertim ad basim, lineatæ, fasciæ 2 ochraceæ, prima indistincta,  
secunda ad marginem internum bifurcata, lineolis plumbeo-ceruleis micantibus, costa ad apicem  
punctis tribus, majoribus, non geminatis, albis, notata; fimbria intersecta. Posticæ suprà  
fuscæ, fimbria albida, subtùs albido tessellata; abdominis segmentis anoque albo-luteis.

(2) Dilutior, antennis paulò magis ciliatis, alis anticis ad costam striis tribus albis, gemi-  
natis, distinctissimis in apice utrinque notatis: subtùs margine albido, fusco-striatis. Posticis  
subtùs fuscis margine albido. Forsan species diversa. A D. Schœnner D<sup>o</sup> Boisduval missa.

(3) Minor, crassior, pilosior, alis anticis rotundioribus, fasciis ochraceis angustioribus, rectis,  
secunda nunquam bifida. Ale posticæ fuscæ, subtùs punctulis albis marginatae: fimbriae omnes  
fuscæ, concolores. Pedes palpique fuscæ, villosiores. — An tamen *Metallicana* varietas?

(4) Vid. *Conchana*.

(5) *Micana* W. V. diagnosis ad omnes ferè Sericordum species accedit, et sic incertissima,  
ideò nomen Hubnerianum anteponendum. — Ille *Trochilana* retuli, teste D<sup>o</sup> Treitschke, at  
non vidi.

{ FULCIDANA Gn. (1) . . . . .	Burgundia., Helvet.
{ Textana D. 4197. (non H.)	
{ BIPUNCTANA F. 32, Fr. Tr. . . . .	Austr.
{ Charpentierana H. 284?	
{ INTERRUPTANA Fr. 161. (2) . . . . .	Austr.
{ Charpentierana Tr., D.?	
PENTHINANA Gn. (3) . . . . . , . . . . .	Anglia.
{ ASTRANA Gn. (4) . . . . .	Alp. Jura.
{ Siderana D. Sup. 507. (non Tr.)	
SIDERANA Tr. Sup. p. 81. . . . .	Hungar., Turcia.

SPEC. INC. SED.

METALLIFERANA FR.

DÉCREPITANA FR.

---

(1) Pulchræ huic specie nihil cum *Textana* H. commune est (vide infrà). Maxima Sericoridum, colore graphidibusque *Micanam* inter et *Urticanam* collocanda; *Klugianam* quoque quasi revocat.

(2) Charpentierana Ilbñ. 281 adhuc est ambigua, adeò ut vix Sericoridem effingai. Potius, tali in re, ad precedentem pertineret. *Charpentierana* Fr. nulla est ambarum, hancque non nosco. In Dº Duponchel indistinguende sunt. Ut igitur deleatur omnis ambiguitas, hoc nomen nullæ speciei applicandum est donec genuina *Charpentierana* inveniatur.

(3) Conspectus fero Penthinæ. Statura precedentium at alis anticis minus acutis. — Aliae anticæ nigrae, obscurè plumbeo rivuloso atomisque flavidis irroratae, fasciis duabus alboflavidis, fusco striatis, alia propè basim medio interrupta maculasque 2 quadratas oppositas singente, alia ponè medium angulo ani albo in fimbria terminata; costa albo geminatum strigosa, fimbria versus apicem punctis 2 albis intersecta. Aliae postice nigro-saturatae, fimbria alba, angulo apicali infuscata; palpis albia. — A Dº Becker uti anglica sine nomine missa. Forsan ad genus seq. pertinet; at de uno tantum exemplare antennis carente nil prorsù statuere possum.

(4) Splendidissima species, media inter *Sideranam* et *Penthinanam* eademque statura; sed omnino diversa. — Aliae anticæ rufo-aureantiacæ, atomis nigris sparsis, præsertim in disco et ad costam; punctaque linearibus ceruleo-chalybeis, metallicis, ornatae. Preterea macula ad costam semilunaris, alteraque ad marginem internum? formis, opposite, flavo argenteæ, nigrantes. Puncta 4 costalia, flavo-argenteæ, minimè geminata. Fimbria crocea, vix lineolis nigris interrupta. Aliae postice nigrae, fimbria crocea. — Subtus omnes nigrae, fimbriis costaque interrupta, croceis. In Alpibus propè Helvetie fines invenit D. Bruand.

TURFOSANA Z.

BIFASCIANA H. Beytr.

DIVELLANA H. 339.

PULLANA Ev. faun. 502.

---

GEN. 4. SELENODES Gn.

\* TEXTANA Fr. 415, H. 307 (non D.) . . . . . Germ., Gall. mer.

{ DALEGARLIANA Gn. (1) . . . . . . . . . Dalecarlk.  
Exterana? Ev. faun. p. 508.

---

— GEN. 5. MIXODIA Gn.

Sericoris Tr., D.

— { SCHULZIANA F. 456. (2) . . . . . . . . . Germ.  
Pinetana H. 57, St.  
Zinckenana Fr., Tr., D.  
Var. Ahrensiiana H. 337.

{ ERRANA Gn. (3) . . . . . . . . . . . . . . . Russia:  
Tenerana D. 1355. (non alior. auct.)

---

(1) Statura vix precedentis. Primo intuitu Penthinas revocat. — Ale anticæ nigrae, in mare ferrugineo-marmorose, fascia sub-basali griseo-cærulea vix distincta; macula costali versus apicem albo-rosea, punctis 2 nigris notata, strigulis posticis plumbeis, punctisque albo-roseis ad angulum internum et versus fimbriam ornatae. Fimbria nigro-plumbea, lineola albida, Postica ex toto nigra, fimbria albida, apice infuscata. — Femina nigrior, absque ferrugineo. — D<sup>o</sup> Boisduval à D<sup>r</sup> Schönnherr ex Dalecarlia missa.

(2) Nemo in Fabricio agnovit: indè nomina plurima.

(3) An hujus, au sequentis generis? in specimine unico difficile est judicatu. — Tenerana H. et W. V. quam istam esse D. Duponchel credidit, non alia est quam varietas Penkleriana.

## GEN. 6. ATERPIA Gu.



## GEN. 7. MELODES Gp.

*Carpocapsa* Tr., D., St.






### GEN. 8. PELATEA Gn.

Tortrix Tr.

- KLUGIANA** Frey, p. 83, Tr., FR. . . . . Austr. merid.

**GEN. 9. STICTEA Gn.**

*Coccyx et Tortrix* Tr., D.



- \* SENEACIONANA H. 263, Fr. . . . . . . . . . Germ.

(1) Species et genus ambiguë sedis. *Grapholitham* vel *Pædiscam* primo conspectu dicas, sed, si accuratè inspicies, cum nonnullis hujus tribus animalculis affinitates forsè invenies. Unicum tamen vidi exemplar, et erravisse licuit. Sequitur diagnosis. — Statura *Cepitana*, ale antice elongata, margine rotundata, griseo-olivacea, basi fasciata media obliqua, ad costam tenui, medio in quadratum dilatata, fuscis; apice fusco-olivacea, strigis costalibus albis lineisque 2 plumbeis micantibus, parallelis, à strigis costæ usque ad marginem internum vix flexuose descendentibus; ala inter eas usque ad strigas costales saturata, angulo apicis puncto fuscō. Fimbria fusco-olivacea, apice alba. Ale postice cinereo-fusca, fimbria lineolaque ante eam dilatioribus. Subtūs ad coste apicem, albida, puncto medio fuscō. — Ad Dm Boisduval à D<sup>m</sup> Anderreg missa.

* <b>HELVOLANA</b> Fr. 36, H. 304. . . . .	Alpes Algoviae.
<b>BUGNIONANA</b> D. Sup. 548. . . . .	Austr.
* <b>KOLLARANA</b> Fr. 187, H. 323-24. . . . .	Germ.
{ <b>FLAMMEANA</b> Fr. 168, H. 324, D. . . . .	Europ. bor.
{ Var. <i>Turionana</i> D. 4204. (non alior. auct.)	
<b>ROSETANA</b> H. 430 222, Fr., Tr., D. (1). . . . .	Germ.

SPEC. INC. SED.

**PUDORANA** Fr. 52.

**PULVERANA** Ev. faun. p. 494.

---

— GEN. 10. ORTHOTÆNIA St.

*Sciaphila* Tr., D.

{ <b>ANTIQUANA</b> H. 213-14. (non Fr.) . . . . .	Gall. bor., Anglia.
{ <b>Quadrimaculana</b> St.	
{ <b>STRIANA</b> W. d-14, Tr., Fr., D. . . . .	P.
{ <b>Rusticana</b> H. 66. (non 102.)	
{ <b>Fasciana</b> St.	
<b>FASCIOLANA</b> H. 260, Fr., Tr. . . . .	Germ.

---

(1) Forsan homogeneitate peccat hocce genus. Forsan et *Bugnionana* (que ferè Eupaciliae revocat) et aliae species mihi invisse cum *Flammeana*, typo generis *Sticta*, non congruant. Larvarum quoque maximum partem ignoro. Tempus docebit.

Tribus VI.

SCIAPHILIDI Gn.

— GEN. 1. ERIOPSELA Gn.

*Sciaphila* Tr., D.

CARICANA Gn. (1). . . . .	Gall. centr.
CUPHANA FR., D. Sup. 338. . . . .	Austr.
{ QUADRANA H. 223, Fr., Tr. . . . .	Gall.
Var. <i>Hubneriana</i> Lien. in litt. . . . .	Norwèg.
Var.? <i>Flexulana</i> D. 1359. (2)	
{ * RIVULANA H. 184. an huj. gen.? . . . .	Germ.
<i>Flexulana</i> Fr.	
* MENDICULANA Tr. Sup. . . . .	Hungar.

— GEN. 2. PHTEOCHROA St.

*Sciaphila* Tr., D.

RUGOSANA H. 82, Fr., St., D. . . . .	Gall. centr.
* GLORIOSANA FR. Cat. Mann.	

(1) Statura *Quadrana*, illique effinissima; sed distincta alis anticeis acutioribus, saturatioribus, posticis subtus non strigatis, palpis incumbentibus, etc. — à *Cuphana* quoquè distincta mihi apparuit; sed hauc coram oculis non habeo. Sequitur diagnosis: Aitc antice ad apicem paululum falcatae, cinereo-fuscae, plumbeo obsoletè lineatae, sericeæ, fasciis vix distinctis fusco-ochraceis, media extus angulata, ante-terminali margines haud attingente, incurva, minuta, infrà punctis 4 nigra notata, absque lineola marginali alba. Costa strigis albis geminatis notata. Postice utrinque cinereo-saturata, minimè tessellatae, Corpus cinereo-nigrum, abdomine albicante. Palpi incidentes, subsecundiformes, minus extensi quam in *Quadrana*. — Volitat, Julio. tinctiente, inter Carices qui in pratis uliginosis crescunt. Mares tantum cepi.

(2) Fortè species distincta. Major, dilutior, fasciis saturatiis scriptis, macula terminali Sericordium ad instar, posticis valde subtus tessellatis, etc. — Unam tantum vidi in collect. Dup.

— GEN. 3. TRACHYSMIA Gn.

*Teras* Tr. — *Sericoris* et *Sciaphila* D.

---

—	{ <i>RIGANA</i> B <sup>in</sup> Mosc., Tr. Sup., Ev. . . . .	Russia., Gall. mer.
	<i>Modestana</i> Tr. (non D.)	
	<i>Horridana</i> H. 327, Fr., D,	

*DUPONCHELIANA* Costa., D. Sup. . . . . . . . . Italia.

---

— GEN. 4. CNEPHASIA St.

*Sciaphila* et *Tortrix* Tr., D.

†

---

—	{ <i>CINCTANA</i> W. e-3, Fr., Tr., D. . . . . . . . .	Gall. centr.
	<i>Cretana</i> F.	
	<i>Albidana</i> H. 432.	

*SYLVANA* Tr. p. 109, FR., D. Sup. (non F. nec H.) (1). . . Gall. occid.

††

*MUSCULANA* H. 98, Fr., Tr., D. . . . . . . . . P.

\* *ASINANA* Cl. t. 2, f. 4, H. 101, St. . . . . . . . . Anglia.

\* *INUNDANA* W. f-6, F., H. 60, Fr., Tr. (2). . . . . Austr. germ.

---

(1) Nomen inconsultè electum quod jam apud Fabricium Tortricem generis *Italias* et apud Ilubnerum varietatem *Solandriana* designabat.

(2) An hujus generis? Sub hoc nomine varietatem *Corticana* accepi; at nondum genuinam *Inundanam*.

— GEN. 5. SCIAPHILA Tr.

D. *Cnephasia* St.

{	NUBILANA H. ? 411, D. Sup. (1) . . . . .	Gall.
Sociana Gn. olim.		
{ Glareana ? Fr.		
Hybridana ? D.		
ABRASANA D. Sup. 539. . . . . . . . . . .	Austria.	
SUBJECTANA Gn. (2). . . . . . . . . . .	Gall. centr.	
{ VIRGAUREANA Tr. Sup., D. Sup. . . . . . . . .	Gall. centr.	
{ Asseclana W. ? mus. Schiff. (non H.)		
PASIVANA H. 99, D. Sup. . . . . . . . . . .	Austr.	
{ ALTERNANA W. b-33, ( <i>ella</i> ) mus. Schiff. (3) . .	Austr. Normann.	
{ Chrysanthearana Gold., D. Sup. 542.		
WAHLBOMIANA Lin. 312, W. ? H. 203, Tr., D. (4). . .	Europ.	

(1) Apud nos frequentissima. Gregatim circa Pruni spinosa dumetos volitat, sole pleno; ideò *Glareanam* Fr. esse existimo, licet descriptio mediocriter conveniat. — Imò, pictura *Nubilana* Hub. vix quoque convenit; at Germani omnes eam sic appellando consentiunt. — Pictura D<sup>i</sup> Dup. tetrica; at in ejus museo species hæc appetat. — *Hybridana* ejus typus periit, nihilque de ea affirmare valeo. Larva *Nubilana*, *Ypsolophis* ferè similis, letè viridis, linea flavis, mense Maio in Pruno spinosa et Cr. oxyacanthæ vivit. Pupa tela alba inclusa, pupas generis *Tortrix* revocat; rufa, abdomine longulo, ano obtuso spinisque duabus robustioribus non longitudinalibus sed supernè erectis. Imago prodit circè 15 junii.

(2) Statura *Virgaureana* et quasi inter hanc et *Wahlbomianam* media. Alæ anticæ cinereæ, atomis aliquot fuscis, fasciis tribus obscurioribus, tertia interrupta. Alæ postice suprà cinereæ, disco simbriaque dilutioribus; subtùs albide, maculis 1-3 cinereis in apice; ano in utroque sexu lutescente. Femina similis, sed obscurior. — Apud nos vulgata, et semper eadem. Junio et Julio circè arbores volitat. Differt à *Virgaureana* colore pallidiore, atomis rarioribus, aliis dilutioribus, ano luteo, etc. — Differt à *Wahlbomiana* statura, graphidibus distinctioribus in mare, omnino aliis in femina, tempore et loco volatibus, etc.

(3) Affinis certe *Wahlbomiana*, præsertim femine, at distincta. Larva quoque differt. Hæc species genuina est *Alternella* musci Schiff. et verisimiliter W. V. Quamobrem nomen restitu. Hanc ego circa St.-Valery in Normaniæ vulgo inveni.

(4) Sub hoc nomine, *Virgaureana*, *Subjectana*, *Pasivana*, *Alternana* et fortè *Incertana* in plurisque museis promiscuntur. Distinctæ sunt tamè moribus, tempore volandi, signaturis

constantibus, etc., pluresque earum larvæ cognitæ sunt specierumque separationem stabilium. Inò et nonnullæ sine dubio adhuc inequivicè propè eas *Scaphiæ* detegende supersunt, novamque probabilitù ego à D. Bruand in Alpibus captam accepi; sed in unica tantùm femina speciem novam creare nolui. Feminæ enim valdè à maribus discrepant, multæque varietates, presertim in *Wahlbomiana*, tum statura, tum graphidibus reperiuntur. Caveant igitur tirones ne quid nimium vel parvum in hoc genere inveniant.

(1) Statura et ferè colore *Riganæ*, habitus verò *Wahlbomianæ*. Aliæ anticæ angustæ, albae, tenuissimæ cinereo strigatae, fasciis 3 dilutis, cinereis, incertis, albo tessellatis; secunda ad costam quasi bifida, versus cellulam interrupta, strigisque apicis cinereis. Aliæ posticis utrinque albidi, lucidulis; abdome albido. — È Germania accepi sub nomine *Penziana*.

(2) Cum *Penziana confusa*, Synonymiaque ferè inextricabilis, at planè distincta species. Diurnæ habitum præbet, et, quia Fabricius et Frölich propè *Strigulanam* et *Steinkellneranam Conspersanam* collocaverunt, fortè hanc esse credam. — Ut ambe species facilè secernantur Diagnoses sequuntur:

PENZIANA mas. — Statura habitusque *Wahlbomiane*. Alæ antice albae, costa arcuata, apice obtuse, atomis griseis sparsis, fasciis duabus griseis, basali marginem internum non attingente, subrecta, medio flavicante, lineolisque 2 nigris inclusa; media margines attingente, vix interrupta, colore nigro serè absente. Costa maculis 4 griseis versus apicem notata. Lineola nigra tenuissima ad extremum alæ. Fimbria griseo subinterrupta. Alæ postice suprà albido fimbriis concolore; subtus unicolores absque strigis. Anus flavicans.

**DICRNEANA** mas. — *Maxima Sciaphilidarum*. Major Aph. *Gouana* Alæ antica albæ, costa sericea recta, apice acute, atomis nigris sparsis, fasciis tribus similibus, fusco, nigro, flaveoloquo inductis, basali angulata, integra, media bis interrupta, apicali lineolis nigris notata. Costa maculis 4 nigris versus apicem intersecta. Fimbria albida. Alæ posticæ suprà cinereo-albide, fimbriæ alba : subtus albide, costa apiceque strigulis fuscis sparsis. Palpi longiores. Anus flavicans. — Alæ *Helvetica* D. Anderegg mili misit.

STRAMENTANA Gn. (4)	· · · · ·	Gaſſia;
Marcidana Fr.	44.?	

---

GEN. 6. SPHALEROPTERA Gn. (2)

ALPICOLANA H.	328-9,	Fr., Tr., D.	· · · · ·	Alpes.
---------------	--------	--------------	-----------	--------

DINIANA Gn. (3).	· · · · ·	Alp., Gall. mer.	
------------------	-----------	------------------	--

CAPILLANA Gn. (4).	· · · · ·	Anglia.	
--------------------	-----------	---------	--

---

(1) Primo conspectu Ter. *Vulgaræ* affinissima videtur, at non ejusdem generis. — Statura habitusque *Hybridæ*. Alæ anticæ stramineo-albidæ, strigulis griseo-luteis undique consperse, his, ad costam, initium fasciæ mediæ, et versùs apicem maculam trigonam basi apice oppositant (quandù sunt distinctæ), efformantibus. Fimbria concolor. Alæ postice suprà cinereæ, fimbria dilutiore; subtùs albidae, cinereo ad apicem pùlo tessellatae. — Hanc égo accepi ex Burgundia, Gallie meridionali, orientali, etc. Multas quoque alias regiones verisimiliter habitat. — *Helvolana* Fr. 36 descriptio hic convenit, minimè verò pictura Hubneri quam ipse D. Frölich edidit. — *Mericidana* quoque diagnosis convenit; sed in descriptione antennas variegatas, pilosas, palpos magnos, albos, alas cinereas, etc. dicit; indè dubitandi ratio.

(2) An hocce genus *Sciophiliidæ* plànè pertineat affirmare non audeo. Affinitatem quamdam præbet cum *Aphelidæ*, larvarumque illius cognitio accurata ante decretam collocationem necessaria videtur.

(3) Valdè variat. — Statura majoris *Wahlbomianæ*; at alæ obtusiores, minimè rugosæ, abdomen villosum, palpique valdè incumbentes, articulo ultimo distinctissimo. — Alæ anticæ cinereæ, sèpè obscuriores, strigulisque tunc consperse; area basali in angulum medio producta; fascia media irregulari, dilacerata, ad marginem internum valdè latiori, umbraque subapicali sub-olivaceo-fuscis; costa maculis 4 alternis, fuscis, punctiformibus, strigulisque albidis geminatis variegata. Alæ postice fusco-cinereæ. Subtùs dilutiore, minimè tessellatae. — In Alpibus, propè Digne, invenit D. Donzel, mense Julio.

(4) Species ambiguæ sedis. Cum *Wahlbomiana* fem. signaturis alarum paulùm concordat; at habitu, colore, nitoreque alarum non ejusdem generis esse videtur. — Statura *Wahlbomiana* fem. Alæ sericeæ; primores albo-flavidae, costa latè, fascia basali valdè in angulum medio procurrente, fascia media subinterrupta, sinuata, duosque intùs dentes coloris albidi excipiente; umbraque terminali, quam strigulæ antecedunt, flavorum capillorum colore tinctis. Alæ postice supra albidæ, lucidulæ, margine paulùm infuscatae, fimbria albida; subtùs albae, immaculatae. — Ex Anglia sub nomine *Longana* accepi; at jam *Elongana* (vide infrà) Tortrix existit.

GEN. 7. TERATODES Gn.

- { VULGANA Fr. 440. (4) . . . . . . . . . . . Germ. Gall.  
Terreana D. Sup., Tr.?  
Favillaceana H. 255.

**GEN. 8. CLEPSIS Gn.**

**Tortrix Tr., D.**

RUSTICANA Tr. V. 95 FR., D., H. 402? (non F.) (2). Austr., Pyren.

**SPEC. INC. SED.**

AGRESTANA Tr.

NEMORANA Fr. 126. (non H.)

LUCANA Fr. 134.

VEPRETANA Fr. 136.

LIENANA H. 468.

(1) *Conspicuit gen. Teras revocat.* — D. Treits. collare fuscum dicit: minimè autem in nostris exemplaribus id evenit. — *Rusticana* II. 102 ferè hic convenit, hancque Frölichum allegavisse intelligo.

(2) Genus vix *Sciophilidis* adnumerandum; sed ubi melius? — *Rusticana* F. 49 Ephippiphorana vel Stigmonotam inagnoscendam designat. — *Rusticana* H. 102 (non 66) huicne specie vel *Ter. Vulgaræ* referenda? difficile est dictu. (Minimè verò *Strianæ*, ut D. Duponchel contendit.)  
Xusquam adhuc optimè picta.

Tribus VII.

GRAPHOLITHIDI Gn.

---

— GEN. 4. LEPTIA. Gn.

*Phoxopteryx* Tr., D.

---

{	LANCEOLANA H. 80, Tr., D. (1) . . . . .	Gall.
	Lanceana Fr. var B.	
	Var. <i>Dibeliana</i> H. 272.	

---

— GEN. 2. PHOXOPTERYX Tr.

D. *Anchylopera* St.

†

---

SICULANA H. 79, Fr., Tr., D. . . . . . . . . . .	Gall. centr.
--	--------------

---

††

---

{	UNGUICANA Lin. ( <i>ella</i> ) 365, F. Fr., Tr., D. . . . .	Europ.
	Var. <i>Falcana</i> H. 78.	

---

{	UNCANA H. 76, Fr., Tr., D. (2) . . . . .	Germ., Gall.
	Var. <i>Crenana</i> D. 4245. (non H.)	

---

---

TINEANA H. 84, Tr. . . . . . . . . . .	Austr., Gall. centr.
--	----------------------

---

(1) Statura, colore, graphidibus, in infinitum variat. Modò pallida et unicolor; modò macula media V-formi apicalique lineari distinctissimis notata; modò tota ferruginea, lineolis subplumbeis vermiculata; modò omnino bicolor, pallidoque et fusco distinctim in longitudinem bipartita, etc.

(2) Minimè verò *Uncana* Lin. Cl. Fab., que ad *Noctuas* pertinet.

††† (2)

— *MYRTILLANA* Tr. p. 245, D. . . . . . . . . . Germ.

— { *LUNDANA* F. 166, Fr., St. (3). . . . . . . . . P.  
 Badiana Tr., D., W.p., Ev.  
 { *Corylana* H. 53.

*DERASANA* H. 206, Fr., Tr., D. 4327. (non Sup.) Ev. Germ., Gall.

*CUSPIDANA* Tr. p. 236, D. Sup. . . . . Hungar., Helvet.

— { *MITTERBACHERIANA* W. d-17, F., H. 192, Fr. . . . . Europ.  
 Penkleriana Tr., D., Ev.

{ *UPUPANA* Tr. Sup. . . . . . . . . . . Germ. bor.  
 { *Ustulana* Tr. (non H.)

— { *RAMANA* Lin. (*ella*) f. s. 4376, Fr., Tr., D., Ev. . . . Gall.  
 Lætana F.  
 { *Harpana* H. 77.

SPEC. INC. SEP.

SIGNANA Pody.

GURVANA Pody.

ERICETANA Zell.

ADUNCANA Fr. 249.

(1) Species eximia. Vix major *Comptana*. Alæ antice suprà rufò-ferrugineæ, apice valde incurvæ; lunula in angulo interiore magna, albo-carnea, strigula nigra notata; fimbria hic carnea, lineola rufa versus hamulum separata. Subtùs cinereo-fusce, absque lunula. Posticæ cinereo-fusce. — Capta à M<sup>me</sup> Lesage in agro Pictonico.

(2) Vix differt haec sectio à genere sequenti alis uncinatis, abdomineque interdùm longiori.

(3) *Badiana* W. (B. 28.) diagnosis hic minime convenit, ut Illiger ipse sentiit. Omnes ferè tamen Entomologi istam denominationem sequuntur. Nomen verò Fabricii, quod nullam admittit dubitationem, potissimum accepi. — *Badiana* II. et Fr. omnino alia.

— GEN. 3. GRAPHOLITHA Tr.

D. *Steganopticha* Curt. — Nov. gen. St.

COSTANA D. 4325. (non W. nec F.) (4)	.....	Gall. bor.
— PAYKULLIANA F. 428 (2)	.....	P.
Triquetra H. 280, Fr., Tr., D.		
— NISANA Lin. ( <i>ella</i> ) 374, Cl., Scop., Vill. (3)	.....	P.
Bœberana F.?		
— Var. <i>Siliceana</i> H. 196, Tr., D., Ev.		
— Var. <i>Petrana</i> H. 240, Fr., D.		
— Var. <i>Decorana</i> H. 265, Fr. D. Sup.		
FREYERIANA FR. p. 435. (4)	.....	Alpes Delphin., Austr.
CAMPOLILIANA W. e-6-7. Tr., D.	.....	Germ.
MINUTANA Hb. 73, Tr., D.	.....	Germ.
— ULMARIANA Zell. D. Sup. 538. (5)	.....	Europ.
Lithoxylana D. 4226, Fr.?		
Var. <i>Stannana</i> Gn. olim. (6).		

(1) Nomen sanè non optimè selectum, quod jam à duobus auctoribus occupatum erat; sed, *Costana* W. et Fab. ambiguam Tortricis speciem designante, summo jure expedita est hæc appellatio.

(2) Sine dubio; novumque nomen planè immeritè datum est. Fab. *Ramellam* Lin. inconsultè hic allegat; descriptio enim *Fauna Sueciae* omnem dubitationem tollit.

(3) Veteres auctores hanc in Linnaeo agnoverunt, recentiores verò cognitio ejus effugit. Descriptione tamen Linnaei præsentimque pictura Clerkii planè agnoscenda est. Hæc varietas verò haud communior: Varietates *Siliceana* vel *Petrana* sèpè inveniuntur. — An sit *Baberana* Fab. dubitari potest: quamvis enim *Nisellam* Lin. ipse alleget, descriptioque ejus summatis huic conveniat, hujus tamen collocatione inter *Applanam*, *Heracleanam* aliasque *Hæmylidias* dubitatio oriri potest. — *Decorana* II. D. varietas certa hujus speciei, nequaquam verò *Lithoxylana*, ut D. Duponchel dicit.

(4) Illa est genuina musei Schiff. *Campolitiana*; at diagnosti W. ambæ vindicant. Ideò, ne confusio sequatur, nomina hucusque impensa remanebunt.

(5) *Lithoxylana* certè D<sup>r</sup> Duponchel, nomenque antiquius; at D<sup>r</sup> Frölich descriptio vix convenit. Ideò, et cur D. Dup. ipse in supplemento *Ulmariana* recentiorem denominationem publicavit, et ego accipio.

(6) Vix eamdem speciem dicas: at ego ex eadem larva obtinui. Differt ab *Ulmariana* alis anticis

VERMICULANA D. 1324 (1). . . . . . . . . . . ?

— { PENKLERIANA W. b.-42. . . . . . . . . . . P.  
Mitterbacheriana Tr., D.  
Var Tenerana W. d-48, H. 483, Fr. (non D.)  
Var. Oblitana D. Sup. 342.

{ DISTORTANA G. (2). . . . . . . . . . . P.  
Derasana D. Sup. 512.

— NEVANA H. 261-2, Fr., Tr., D. . . . . . . . . . P.

SPEC. INC. SED.

DORSIVITTANA Zell.

NIMBANA FR.

NUBIOSANA FR.

— GEN. 4. PHLÆODES Gn.

Pœdisca Tr., D.

— FRUTETANA H. 293-14, Tr., FR., D., Ev. ? (3) . . . . . Europ.

ferè unicoloribus, rufo-cervinis, absque strigis albis nigrisque; fascia media vix dilutiori, lineis duabus plumbeo-cæruleis speculum analem efformantibus. Illius larva, apud nos vulgatissimè in Ulmis, inter folia gregatim contorta, in extremis ramusculis vivit. Lucidula, elongatula, ossa, passimque, cibo transviso, viridula; capite, scutulo cervicali, pedibusque veris nigro-micantibus. Domò utrinque aperto agilissimè egreditur, si minimam affers perturbationem, si quoque procul suspensa, tranquillitatem expectat. Pupa testacea, dorso spinosula, ano obtuso, in folliculo terreo quiescit,

(1) In collectione Dr. Duponchel periit. An eadem ac Sem. *Amygdalana*?

(2) *Derasana* reverà subsimilis, at alia antice minimè falcatae, prorsusque alia species, *Penkleriana* affinis. Hanc ego ipse cepi propè Parisios, hoc anno, mense Maio ineunte.

(3) In Gallia meridionali major, obscurior: aliam speciem dicas; at signaturis omnino eadens.

ESTREYERANA Gn. (1).	Alpes.
— { IMMUNDANA FR. p. 138. (2). . . . .	P.
{ Succedana mus. Schiff.	
{ CRENANA H. 242, D., Ev., Fr.? . . . . .	Russ. mer.
{ Var. maculis ferrugineo tinctis.	
MONACHANA FR. p. 139. An var. præced.? . . . .	Bohem.
— { DEMARNIANA FR. p. 186. . . . .	Germ., Gall. centr.
{ Pflugiana F.?	
{ Strœmiana Fr.? (3).	

SPEC. INC. SED.

\* RUBIGINOSANA FR. Cat. Mann.

— GEN. 5. HYPERMECTIA Gn.

*Grapholitha* Tr. — *Tortrix*, dein *Grapholitha* D.

VIMINANA Gn. (4).	Gall. centr.
AUGUSTANA H. 205. (non 204.) Tr., D.	Austr.

(1) Valde affinis *Feutetana* at minor, brevior, rugosior, marmoratior : basi obliqua, auro concolore, maculaque nigra apicis distincta. — Alæ antice rufo-griseæ, fusco strigatae, apiceque punctis plumbeis vix distinctis speculi loco signatae, basi fusciore lineaque obliqua nigricante terminata, puncto versus speculum nigro, maculaque super hoc majori, nigra. Costa vix albo punctulata. Abdomine anoque griseis. — à D. Estreyer Parisiensi, sedulo Geometrarum observatore, in Alpibus Delphinatus capta.

(2) Hinc est, teste Dr Fischer v. R. genuina musei Schiff. *Succedana*; minimè verò W. — Fortè ad *Crenanam* Fr. referri debet; ille tamen simbriam unicolorē dicit. — Larva viridi-grisea, vermiformis, capite testaceo, in folio Betule albæ in cylindrum convoluto et utrinque filis strictè consuto vitam degit. Pupa super terram in folliculo molli quiescit, dorso rufo, ventre luteo, segmentis spinosulis, anoque in quadrum secto ut *Diloba Cœruleocephala*.

(3) Descriptio Frælichii optimè convenit. At, infrà, *Crenanam* plusquam dimidio minorem dicit. Indè dubitandi ratio. Stature quoque indicatione *Pflugiana* Fab. peccat. — Hinc eximia species Phædoes inter et *Ephippiphoras media*, apud nos circè *Betulas* mensc Junio volitat.

(4) Habitus *Augustana*. Alæ antice albidae, basi cinereæ, postrema parte rufo-ferruginea,

**GEN. 6. BATODES Gu.**

Pædisca D.

DUMERILIANA D. 4353. (1). . . . . Gall. mer. et occid., Anglia.

**GEN. 7. POEDISCA Tr., D.**

**† Cartella Gn. olim.**

*Sciaphila* D. Teras Ev.

CRETACEANA Fr. 82, H. 348, D., Ev. (2). . . . . P.

11

POLICOLANA Gn. (3). . . . . Norweg.

OPPRESSANA Tr. Sup., D. Sup. . . . . P.

macula costali albida notata. Fimbria rufa, apice albida. Alæ posticæ plumbeo-nigrae. Fimbriae albida, rufo subtincta. Caput et thorax albida.

Larva, ferè incolor, in *Salicis viminalis* foliis plicatis vitam degit. Pupa folliculo terreo inclusa, elongata, mellea, abdomine longo, moniliformi, denticulis munita, è folliculo ferè tota egreditur. imaginemque finiente Junio. emittit.

<sup>•</sup> Knockianæ Fr. descriptio ferè conveniret, nisi puncta argentea abessent.

(1) Cave ne hanc in D<sup>i</sup> Dup. opere nou agnoscas. — Mas statura *Cretaceana*. Ala antice ochracea, plus minus infuscata; fascia media fusca, ramum ad simbriam emittente, macula olivaceo-rufa (ut in Sericibus) internè ad hanc fasciam adjuncta, striga basali obliqua, marginè fimbriaque, olivaceo-rufis. Postica fusco nigra. Femina rufo-ferruginea, alis anticis angustioribus: vix eamdem speciem credas. Illoc genus *Tortricidas* quasi per feminam revocat. Metamorphoses desiderantur.

(2) *Paykullianæ* primo conspectu affinis, at graphidibus tantum. Forsan, larva cognita, genus separatum efformare valebit.

(3) Vix hujus generis. Statura *Remyanæ*. Fusca; alæ anticæ fusco-fumosæ, nitidulæ, squamis nigris passim irregulariter, presertim in disco, adspersæ; costa vix albo ad extimum punctata; fimbria concolore. Alæ posticæ civeræ, margine fumoso. — Hanc speciem nulli generi congruens. Norwegia accedit D. Boisdruval.

{ CORTICANA W. e-29, H. 209, 270, Tr., Fr., D. (4). . . . .	P.
Var.? <i>Isertana</i> F. 163.	
Var.? <i>Communana</i> F. 69.	
* ADUSTANA H. 218, Fr. an mera præced. var.? . . . .	Germ.
{ PROFUNDANA W. f-4, F., Fr., Tr. . . . .	P.
Wellensiana H. 237, D.	
Var. <i>Alphonsiana</i> D. 1436. (2)	
Var. { <i>Porphyvana</i> H. 26, St.	
Var. { <i>Profundana</i> Tr., D.	
Var. <i>Porphyvana</i> D. 1344,	
Var. <i>Nubilana</i> D. 1256. (non H.)	
†††	
{ OPHTHALMICANA H. 51, Fr., Tr., D. . . . .	Germ.
Maculana F.?	
{ SCHREBERIANA Lin. 316, F., H. 45, Tr., D. . . . .	Germ.
Dimidiana Clerck.	
{ SOLANDRIANA Lin. f. s. 1327, F., Scop., Vill. (3) Corm., Gall. bor.	
Semilunana Fr.	
Var. <i>Parmatana</i> H. 253-4, Tr., D.	
Var. <i>Sylvana</i> H. 128. (non F.)	
Var. { <i>Trapezana</i> F. 54.	
Var. { <i>Ratana</i> H. 236, Fr.	
Var. <i>Semi-maculana</i> H. 48.	
Var.? <i>Sordidana</i> H. 292.	
Var.? <i>Sinuana</i> H. 212, Fr., St., D.	
Var.? <i>Melaleucana</i> D. 1263. (4) . . . . .	Helvet.

(1) Valde variat, et sic in museis sepè adulterinis nominibus designatur. Varietatem maculae interna ferè destitutam sub nomine *Inundana* accepi.

(2) Mera varietas *Profundana*. etsi in genus prorsus aliud à D<sup>o</sup> Dup. collocetur.

(3) Hinc certè est genuina *Solandriana* Linnei qui in faun. Succ. alias *Albido-cinerascentes* (*Udmanniana* verò cinerea) maculamque *majusculem* dicit; qui Degeerium allegat (maculam in femina *albam* referentem). Fabricius quoque larvam *Udmanniana* evidenter non designavit. — Hinc species multo modo variat; cave tamen ne species fortè distinctas prout varietates habent.

(4) Illa *Dissimilana* inter et *Solandriana* versatur. Plurima specimina visenda sunt.

— GEN. 8. EPHIPPIPHORA Dup.

Pædisca Tr., D.

1

(1) Maxima hujus generis. Afinis *Scutulae*; at apex alae superioris multò acutior. Alae antice fusce, cinereo-plumbeo variegatae, maculis maximi duabus intermis albis, rotundatis, extima in medio punctulis 3 vel 4 notata; costa strigis 4 geminatis albis notata. Alae postice supra fusce, subtus albæ, lineola terminali fusca, costa strigis fuscis valde notata. — Haec ego in Gallia meridionali inveni.

(2) Super hoc et affines vide egregium opus Dr Fischer v. R. qui sedulo Synonymiam elucidavit.

{ REMYANA Koll. (1) . . . . .	Austr., P.
Squalidana Tr. in litt.	
{ Var. Fuligana FR., D. Sup. (non H. nec Tr.)	

+++

{ HEPATICANA Tr. Sup, FR., D. . . . .	Germ. Gall.
Var. { Peccilana Gn. (2) (non Fr.)	
Chalybeana FR. in litt.	
Sticticana? F. (non Fr.)	
Var. Confusana FR. cat. Mann.	
Var.? Fuliginana Fr.	

{ GRAPHANA Tr. Sup. . . . .	Austr., P.
Pierettana D.	

++++

LUCTUOSANA D. 4242. Gn. (3)	Gall. centr.
-----------------------------	--------------

{ EPHIPPANA H. 246, Tr.?, D. (4) Ev.?	Russia.
Populana F.?	

(1) Quæ genuina sit *Fuligana* H. et præsertim W., me cogitante, prorsus incertum est. Ea vero species quo à Germanis Entomologis sub hoc nomine designatur mera varietas *Remyana* mihi appareat. Macula lutea marginis interni modò magna et evidens, modò subnulla. Hanc ego quoque Ephippiphoram circa Parisios, propè Engkien, in cuncte Maio, inveni.

(2) Minor, quandoque *Graphana* vix major, colore utrinque cinereo, minime ochraceo, alis posticis in utroque sexu saturatè cinereis : ceterum omnino similis *Hepaticana*. An species distincta?

(3) Species egregia. Statura *Hepaticana*. Aliæ anticæ saturatè nigro-fuscae, marmoratæ; apice chalybeo strigatae, macula alba rotundata in margine interno, costa strigulis 3 geminatis vix conspicua in apice notata, strigulis chalybeis speculum simulantibus; simbris fusca, linea albida versus apicem separata. Subtus dilutiores, margine interno albicante, maculae albae dimidia parte conspicua: posticis in utroque sexu fuscis, simbris dilutioribus. Circè dumetos volitat, mense Junio: sepissime detrita. — In mus. Duponchel cum *Argyrana* et *Brunnichiana* mixta est; attamen descripicio picturæ hic convenient.

(4) *Ephippana* Dup. genuina est. Super hanc speciem plurimi in errore versantur. Alii *Argyranam*, alii *Spinianam*, alii alias adhuc species sub nomine *Ephippana* designant. — *Populana* descriptio in Fabricio omnibus ferè speciebus albo-maculatis convenit; indè dubium.

**INSULANA** Gn. (2) . . . . . Gall. austr.

SPEC. INC. SEP.

OBSCURANA FB.

RATZEBURGIANA Saks.

HEPATARIANA FR.

SOUALIDANA FR.

INCISANA FR.

### SCHARFENSTEINIANA Fr. 80, H. 330.

**RUSTICANA F. 49. (non alior.)**

CERVANA Ev. faun. p. 507.

**GEN. 9. OLINDIA Gn. (3)**

*Sciaphila* Tr. — *Penthina* D.

(1) *Argyrana genuina* ad genus *Coccyz* mihi pertinere videtur. Hæc verò species cuius specimen unicum in mus. D<sup>r</sup> Boisduval invenitur, rectè in opere D<sup>r</sup> Duponchel (tab. 263, fig. 6) depicta est.

(2) Precedenti affinisima; at distincta macule habitu, speculo areaque basali absentibus, colore subtus saturatiore, etc. — Nigerrima. Alae antice atro, cæruleo-metallico marmoratae, macula dorsali elongata alba, suprà dentata, infrâ strigis 3 nigris notata, costa versus apicem albo geminatum strigata; subtus nigra, margine interno albidente; posticis utrinque nigris, fimbria concolore. — Capta à D<sup>o</sup> Donzel in insula Hyeres, mense Maio.

(3) Genus difficile collocatum. D. Duponchel inter *Pentinas* adnumeravit; sed, crista dorsali absente, corpore graciliori, palpis, habituque non convenit: D. Treitschke inter *Scaphilas*, ubi sanè meliori jure militaret; at, cum nonnullis speciebus generis *Padisca* et præsertim G<sup>ia</sup> *Ephippiphora* affinitatem prebet. Larva judicabit.

GEN. 40. SEMASIA SI.

*Carpocapsa* Tr. *Ephippiphora*, *Coccyx*, *Grapholitha* et *Carpocapsa* D.

+

SPINIANA FR., D. Sup. 370. . . . . . . . . . . Germ., P.

**AMYGDALANA** Schm., D. Sup. 343. An var seq.? . . . Germ., P.

2

{ WOEGERIANA W. b-9, F., Fr., Tr., D. . . . . P.  
Ornatana H. 82.

**GEN. 44. COCCYX Tr.**

**COSMOPHORANA** Tr. Sup.. Ratz., D. Sup. . . . . Germ., Alp.

\* CONIFERANA Ratz. tab. 42. fig. 4. . . . . Germ.

\* STROBILANA Lin. (*ella*) 402, Cl., F., W., Tr., Ratz. (non D.) Germ.

NANANA Tr. Sup., Raiz., D. Sup. . . . . Germ. bor.

**SPLENDIDULANA** Gn. (4). . . . . . . . . . Gall., *Helvetica*.

(1) Statura habitusque *Pygmaea*. Alis anticæ elongatulæ, squamosulæ, cinereæ, macula dorsali è punctulis albo-griseis obsoletè notatae, lineis transversis quinque, fimbriaque plumbeo-violaceis micantibus; linea quarta punto nigro in medio notata, costa versùs apicem albo tristrigata; alis posticis cinereis, fimbria albicante. Thorax caputque ciuereo-nigra, atomis albidis conspersa. — D. Boisduval ab Helvetia accepit. D. Bruand in alpibus, et ego quoque prope Castrodunum invenimus.

{ *ARGYRANA* H. 46. (non Tr., nec D.) (4). . . . . P.  
  *Lathyrana* D. (non H.).

— { *HERCYNIANA* Bechst., II. 2, Fr., Ratz. (non Tr.). . . . . Germ.  
  *Comitana* W. e-24?, Tr., D.  
  *Piceana* H. 72. (non Lin.).

\* *CLAUSTHALIANA* Ratz. 223. . . . . . . . . . . Germ.

SPEC. INC. SED.

*PINIANA* Mann.

*VACCINIANA* Tisch.

*IMPLICANA* Kuhl.

*MERCURIANA* Fr. 170, H. 322.

*PROXIMANA* Metz.

---

GEN 12. *PAMPLUSIA* Gn.

*Coccyx* D.

*MONTICOLANA* Mann., D. Sup. 540. . . . . . . . . . . Austr.

---

— GEN. 13. *RETINIA* Gn.

*Coccyx* Tr., D.

— { *BUOLIANA* W., c-16, Fr., F. Tr. . . . . Germ., Gall.  
  *Gemmiana* H. 269, D.  
  *Turionella* Vill.  
  Var. *Xylosteana* H. 154. (non al. auct.)  
  Var.? *Bouolianiana* Ev., Faun. p. 500. (2). . . . . Casen.

---

(1) Hubnero soli fide ad hanc speciem determinandam. Tr. et D. prorsus alias describunt; Frelich quoque hanc verisimiliter non agnovit.

(2) D. Eversmann hanc dicit dimidio minorem *Resinana*, strigasque griseo-argenteas et lumbriam griseam. Ideò, vel varietatem *Bouolianiana* genuinæ, vel fortè aliam speciem vidit.

FORMOSANA H. 349-20, D.	• . . . .	Gall. mer.
CUPRESSANA D. 4317.	• . . . .	Gall. mer.
TURIONANA Lin. ( <i>ella</i> ) 403, Cl., H. 220, Ratz. (non D.).	• . . . .	Germ.
<i>Albioniana</i> & n.		
RESINANA Lin. ( <i>ella</i> ) 406, F., Fr., Tr., D.	• . . . .	Germ.
{ DUPLANA H. 229-30. Tr. (non F.)	• . . . .	Germ.
{ Var. <i>Spadiceana</i> D. 4332. (non Fr. nec H.).		

SPEC. INC. SED.

HARTIGIANA Saxs.

---

— GEN. 44. CARPOCAPSA Tr.

*Id.* et *Pedisca* Auct.

AMPLANA H. 24, Tr. (1).	• . . . .	Gall.
SPLENDANA H. 31, Fr., Tr., D. (2).	• . . . .	Gall.
GROSSANA (3).	• . . . .	Anglia.
POMONANA Lin. ( <i>ella</i> ) 401, W., F., H. 30, Fr., Tr., D.	• . . . .	Europ.

SPEC. INC. SED.

FAGICLANDANA Heyd. cat. Mann.

---

(1) Larva vermiciformis, ossea, plus minutiæ roseo-obscuro tincta, scutulis concoloribus, ubique vulgatissima, glandes Quercus paulatim fodit, nucleique loco pulvereis excrementis adimpleat. Pupa rufa-testacea, dorso saturatiore, abdominis segmentis spinosulis, quoque spinulis coronato, in folliculo papyraceo inter muscos quiescit.

(2) Larva vermiciformis, ossea, capite scutuloque cervicali pallidissimè rufa, intrà castaneas (nec non intrà glandes Quercus) vitam degit, undè illæ verniculosa dicuntur. Appropinquante metamorphosi, ostium orbicularem terebrat (quo viso castaneas respuumus) et, in oculo terreo, usque ad mensem Junium anni sequentis quiescit; tunc metamorphosim subit et imago Julio et Augusto volitat. Cur hæc tam vulgaria facta ab omnibus hucusque ignorata sunt?

(3) Statura *Splendana* illique subaffinis. Alæ anticæ fusco-cinereæ, nigro undatæ, macula interna cinerea lineolis nigris divisa, speculo magno, rotundo, umbra nigra secto, absque metallo; costa strigis cinereis in apice geminatis, in medio per fasciculos trifidos dispositis, quorum primus ad maculam internam, secundus verò ad speculum, lineola obliqua terminatus, fluunt. Alæ posticæ nigro-saturatæ. — D<sup>o</sup> Becker ab Anglia missa, sub hoc nomine.

**GEN. 15. OPADIA Gn.**

***Grapholitha* Tr., D.**

## **GEN. 16. ENDOPISA Gn.**

***Grapholitha* Tr., D.**

NEBRITANA Tr. p. 209, D. . . . . Germ., Gall. occid.

\* TENEBRIOSANA FR. in litt. . . . . . . . . . Germ.

**GEN. 17. STIGMONOTA Gn.**

***Grapholitha* Tr., D.**

†

(1) In auctoribus minimè agnoscenda; ideò sequitur diagnosis. — Minor *Splendana*, illiusque sub-affinis; at multò gracilior. Alæ antice fusco-nigræ, nebulosæ, basi latè, præsertim ad marginem internum, cinereo-undatae; macula speculati magna, rotunda, cinerea, 4-punctata; fascia media o bsoleta, nigrori; fimbria paulò rufescens; alis posticis cinereo-fuscis.

(2) Valde affinis *Nebritana*, at dilutior, palpisque aliis. — Alæ antice cinereæ, politæ, apice speculo metallico quadriluceato strigisque obliqui ornatae; costa strigis albo-luteis, in apice densè confertis, punctata; simbria plumbea, lineola albida divisa. Alæ postice in mare cinereæ, disco vix dilutiore, in femina fuscæ, simbria alba. Palpi albidi. — Larva ossea, capite fuso, punctis ordinariis nigricantibus, vitam degit intrà semina *Pisi sativi*, apud nos vulgatissima.

<sup>(3)</sup> *Afinissima praecedenti à qua pricipiū differt statuta minore aliquae posticis dilutis.* — Alia

antice cinereo-canis, politus, versus costae apicem albo-lutescentes, strigulis plumbeis punctis-que specularibus vix distincti notatae. Postica utrinquè albida. Palpi paulò graciliore.

*Nota.* Plurimæ adhuc certè existunt in hoc genere species, que in Vicia, Orobis, Lathyrus, etc. intrà semina vitam agunt. Larva autem difficiles servatu, quia hyemem in terro folliculo antè metamorphosim degunt. Ilarum educatio desideranda. — Sub nomine *Tenebriosana*, D. Fischer in litt. et cat. aliam speciem designavit; at D. Duponchel hoc nomen *Germarana* applicavit. *Tenebriosana* genuinam hucusque non satia vidi. (Vid. gen. Eudonia).

(1) Multi præcedentem sub hoc nomine possident; at pictura Clerkii hanc solam genuinam esse demonstrat.

(2) *Elegantissima* species summam affinitatem cum sequente præbens, mediaque inter hanc et *Schrankianam*. — Alæ antica suprà fusce, nitide, costa albo strigata, macula interna ponè medium, bipartita, lineisque posticis metallicis fulgentibus; subtus sericeo-albidae. — Alæ posticæ in mare niveæ, nigro ad angulum anticum limbatæ, in semina fusce, medio dilutiores. Corpus nigrum. Propè *Nugent-le-Rotrou* in monticulo herboso pleno sole volitante, mense Maio ego inveni.

(3) *Macula specularis plumbea*, si eam oculis microscopio urnatis spectas, è squamis transversè dispositis efformata appetet: unde D. Eversmann dicit: « *Lineolis quatuor transversis subtilissimis* »

{ LATHYRANA H. 207, Fr.?, Tr. (non D.) . . . . .	Germ.
{ Var.? Elegantana Fr. 208.	
{ REDIMITANA Gn. (1) . . . . .	Gall. centr.
{ Parvulana ?? Fr.	
	†††
{ TRAUNIANA W. f-3, F., H. 38, D. . . . .	Europ.
{ Var.? Floricolana Fr. 198, H. 325.	
IMMACULANA Gn. (2) . . . . .	Gall.
	††††
{ GERMARANA H. Verz., Tr. descr. (non Diagn.). . . . .	P.
{ Germmania H. 47.	
{ Tenebriosana D. Sup.?	

*argentis loco speculi* » variatatemque vel aliam speciem primo conspectu descriptisse videtur. Erraret vero qui hoc putaret. — Dicit quoque: Posticae fuscæ, basi *sæpi* pallidæ. Rectius vero dicendum est: Postica nigro-fuscæ, in mare basi niveæ.

(1) Minima in hoc genere. Alte antice obtuse, cinereo-nigre, fascia media plumbea, linea interrupta nigricante divisa, strigulis 4 costalibus albis versus apicem, quarum prima lineolam brevissimam, plumbeo-metallicam incipit; fimbria plumbea, micante. Alte postice nigro-cinereæ, fimbria concolore, sed micante. Subtus omnes unicolores, cinereo-sericeæ. Caput nigrum, fronte, palpis, femoribusque antice albis. Pectus abdomine subtus alba, micantia. — Circâ dunnetos, mense Junio, apud nos volat. — Elegans quamvis parva species; at prorsus-ne hujus generis?

(2) Cum Germarana ab omnibus ferè confusa, licet distinctissima sit, nec ad eamdem divisionem pertinet. Picture 47 Hubneri reverè ambas revocat, excepta tamen basi alarum posticarum dilutiore, que in utraque abest. D' Duponchel picture descriptionesque inagnoscendas sunt, et in illius museo Immaculana, Germarana et Tenebriosana permiscentur. — Treitschke Germaranam meam, ut credo, descripsit, sed diagnosis ejus, ex Frölichii n° 191 quasi transcripta, ad aliam speciem pertinet. Ego vero sic ambas secerno: IMMACULANA: Statura habitusque omnino Trauniana. Alte antice nigrae, lineolis ceruleis vix conspicuis, costa ubique albo punctulata, fimbria fusco-sericea. Alte postice nigricantes, fimbria longiuscula, alba. Caput, pectus, palpique alba. — GERMARANA: statura Immaculana at habitus proprius, vixque hujus generis. Alte antice fusco-fuliginose, costa tenuissime, presertim ad apicem, albo-strigulata, lineola ceruleo-fusca postica vix distincta, infra punctulis aliquot nigris praecedentibus: fimbria plumbea. Posticae fuscæ, fimbria paulò dilutiore. Corpus supra fuscum, infra albido-metallicum. Palpi unicolores, albi. — Habitum omnino Dicerorampus revocat; at palpi valde alii, nec bicolores.

GEN. 48. DICHROMAMPHA Gn. (1)

*Grapholitha* Tr., D.

†

{	POLITANA W. d-16. (2). mus. Schiff. . . . .	P.
	Alpinana D.	
	Montana Scop. H. 37?	
	Var. <i>Alpinana</i> Tr.	

HEGERIANA FR., D. Sup. 373. . . . .	Austr.
-------------------------------------	--------

* INQUINATANA H. 43. . . . .	Austr.
------------------------------	--------

{ SEQUANA H. 44, D. Sup. St. . . . .	Austr.
{ Jacquiniana W. ? F. ?	

{ PETIVERANA Lin. 423 ( <i>ella</i> ). Cl. ? F., Fr., Tr., D. (3) .	P.
{ Montana W. ? H. 37?	

††

{ ULICANA (4). . . . .	Europ.
Ulicetana Curt.?	
Zachana Tr., D. (non H.)	
Germana Fr.?	

(1) Hoc nomine, quod ore auribusque suavius efficere frustè tentavi, palpos ferè semper basi croceos marginaque fuscos revocare volui. Mira est sanè hæc Naturæ dispositio, et in tâm ægra minimorum animalculorum classificatione solatium affert. Hocce genus jam sat numerosum vides; sed quantò in posterūni numerosius!

(2) *Politana* musei Schiff., teste D. Fischer, hæc est; vix tamen W. V. descriptio convenit. — *Montana* Scop. 595 descriptio potius huic quam *Petiverana* pertinere videtur, fortèque pictura Hubneri, sed non sat certè. — *Politana* genuina maculam dorsalem indistinctam præbet: var. *Alpinana* verò maculam croceam magnam et optimè scriptam possidet. Cæterūn unā volant, vel in montibus, vel in agris.

(3) Ubiquè malè picta. Clerckii pictura, etsi à Linnaeo indicata, huic minimè convenire mibi videtur; potius *Ulicanam* designaret.

(4) Ad hanc speciem designandam Germani nomen *Zachana* adhibuerunt; minimè verò ad *Zachanan* H. 243 pertinet. *Ulicetanam* Curt. non vidi; sed, si endem est, hoc nomen speciei restituatur.

—	SATURNANA Gn. (1) . . . . .	Gall. centr.
—	PLUMBAGANA Tr. p. 218, D. Sup. . . . .	P.
•	{ Strobilana D. 1223.	
	MONTANANA FR., D. Sup. 544. . . . .	Austr.
	SENECTANA Gn. (2) . . . . .	Gall. centr.
	CALIGINOSANA Tr. Sup., Frey., D. Sup. . . . .	Germ., Gall.
*	LERNEANA Tr. Sup. . . . .	Hungar.
	GEMMIFERANA Tr. Sup. . . . .	Hungar.

SPEC. INC. SED. (3)

GRUNERIANA Mann, Cat.	DOLOSANA FR.
CINEROSANA FR.	ONUSTANA Fr. 195.
CACALEANA Mann.	ELEGANTANA Fr. 203.
GALLICOLANA Heyd.	CORONILLANA Zell.
MEGERLEANA Fr. 102.	PACTOLANA Kuhl.
CANA Fr. 192.	ILLUTANA FR.
ALPESTRANA Fr. 193.	DEMISSANA FR.

---

(1) Media inter *Ulicanam* et *Plumbaganam*. — Statura habitusque *Plumbaganae*. Alæ anticæ suprà olivaceæ, squamulis luteis, ut in *Ulicana*, presertim ad apicem, irroratæ, macula dorsali obsoletissima absque squamulis, lineolis plumbeis minimè cœruleis quarum prima speculum trigonum fngit (ut in *Plumbagana*), punctis 4 autè simbriam plumbeam nigris, costa plumbeo distinctim strigata. Alæ posticæ cinereæ, simbria concolore. Palpi mediocres. Circè dumeta volitat, presertim in nemoribus, mense junio.

(2) Affinis *Ulicana*; at major et pallidior. Alæ anticæ ejusdem forma ac *Caliginosana*, cinereo-canæ, squamulis numerosissimis luteis ex toto irroratæ, ferè immaculatæ, macula dorsali punctisque marginalibus vix perspicendi; costa plumbeo strigulata; simbria plumbea, lineola alba separata (ut in *Caliginosana*), denticuloque apicali munita. Alæ posticæ cinereæ. Subtùs omnes canæ, sericeæ, viridi-polite. Palpi elongati ut in *Ulicana*.

(3) Talis est generum in hac tribu proximitas, ut impossibile sit, nisi viso et attento interrogato animalculo, locum assignare. Ideò, in hac serie, specierum incertiarum genera plurima, sed præcipue, 11, 16, 17 et 18 in partem veniunt.

PLUMBATANA Zell.	LITURANA Fr. 194.
LOXIANA FR.	DEFLEXANA FR.
MOTACILLANA Tis.	STICTICANA Fr. 211. (non F.)
HONORANA Podv.	DIVITANA Fr. 216.
INTERRUPTANA Khl.	NIGRICANA F. 145.
VENUSTANA Fr. 116, H. 326.	RÖSELANA Fr. 220.
DAHLIANA Fr. 203.	OBSCURANA Fr. 219.
PANZERANA Fr. 185.	IMMUNDANA Ev. p. 513, non FR.
COELATANA Fr. 186.	QUADRATANA Ev. faun. p. 513.
RUSTICANA Fab. 49.	CINERANA H. 211. (non F.)
POPULANA Fab. 67, Fr.	SCHARFENSTEINIANS Fr. 90, H. 230.

— GEN. 19. PYRODES Gn.

*Grapholitha* Tr., D. *Semasia* St.

— { RHEDIANA Lin. 444 ( <i>ella</i> ), Cl., F., Tr., D. . . . .	Europ.
{ Aurana H. 22.	
{ Daldorfiana F., Fr.	

— GEN. 20. CATOPTRIA Gn.

*Grapholitha* Tr., D. *Cochylis* Tr., D. *Tortrix* D.

— ALBERSANA H. 224. . . . . . . . . . . . . . . . . .	P.
* USTULANA H. 231. (non Tr.) (1) . . . . . . . . . . . .	Germ.
— { ASPIDISCANA H. 256, Tr., D. . . . . . . . . . . . . . . . . .	P.
{ Aspidana Fr.	
{ Var. <i>Monetulana</i> H. 257.	
{ Var. <i>Zachana</i> H. 243. (non Tr.).	

(1) Au var. *precedentis*?

(1) *Succedana mus*. Schiff. nullo modo ad hanc, sed ad Phl. *Immundanam* pertinet. Ideò nomen *Theresianorum* incertum est. Species hæc, omnium fortè vulgatissima, circà Ulices catervatim sole volitat. Valdè variat. — *Asserlana mus*. Schiff. eadem est ac *Sciaph. Virgaureana*. An Wien. Verz. quoquè?

(2) Insectum patriamque adhuc ignoro. Picturæ Hubneri si fides debetur, media est hæc species inter præcedentem et sequentem.

(3) Parva in hoc genere. Primo conspectu Dichror. *Montanana* vicinissim dicas; at palpis habituque melius hic convenit. — Subaffinis *Succedana*; at alis minus elongatis. Anticea cinerea strigulis fuscis albidisque tenuissime vermiculatae, strigis costalibus brevibus, lineola speculum trilineatum cingente, simbriaque metallico-dilatioribus. Ale postice ut in *Succedana*. In sylvis herbosis, Castroduni, mense Junio, rara. — D. Bruand in alpibus quoque invenit.

(4) *Statura Aspidiscanæ*; habitus verò *Succedanæ*. Alæ anticæ fusco-olivaceo-nitidulæ, apice auro conspersæ, lineis duabus angulatis plumbeis; speculum quadripunctatum infrà ciuentibus; costa albo distinctissimè strigata. Postice cinereæ. Species hæc, que *Stigmonotæ* revocat, à D<sup>o</sup> Donzel in insulis Hyères reperta est. Unicum vidi specimen.

(5) *Hohenwartianae* affinisima, prorsus verò distincta. Caput et thorax fulva. Alæ antice albidae, basi fulve, lineis longitudinaliibus umbrisque cinereo-fuscis, speculo argenteo, nigro-lineato. Alæ postice cinereæ, medio in utroque sexu dilutiores. — Larva osseo vel flavo-albida, lineis in juventute obscurioribus; in cupulis Carduorum vivit, semina diruens, aliquando stirpem fodiens, ibique metamorphosim subit. Image nascitur Julio.

{ HOHENWARTHIANA W. d-15, Tr., D.? (1) . . . . .	P.
{ Strigana F.?	
{ Pupillana H. 20?	
{ COECIMACULANA H. 27, Fr.?, D. (2) . . . . .	P.
{ Kollariana FR. in litt.	
CUMULANA Gn. (3). . . . .	Gall. mer.
{ CONTERMINANA FR. in litt. (4). . . . .	Gall. mer.
{ Coecimaculana var. D.	
INFIDANA H. 296, D. . . . .	Helvet.
MESSINGIANA FR. p. 89, Frey. . . . .	Mecklemb.
CITRANA H. 485, Fr., Tr., D. . . . .	P.
* LUTOSANA H. 200. (5). . . . .	?
{ PUPILLANA Lin. 325. Cl., F., D. . . . .	Hungar., Helvet.
{ Absynthiana H. 34, Tr.	

(1) Plerique genuinam *Hohenwartianam* cum affinibus permiscent. Ideò diagnosis sequitur : Alæ antice flavescenti-griseæ, in longitudinem obsoletè radiatæ, basi macula rufescente in mare apertè limitata; strigis costalibus dilutioribus, interiore rufo intùs adumbrata, speculo argenteo nigro lineato. Posticæ cinereæ, nitidulæ, vix medio dilutiores. Caput et thorax pallida. — Vix *Pupillana* H., vixque *Strigana* Fab. qui, larvam in *Hypericus* indicans, potius *Hypericanam* designare voluit.

(2) Major præcedente, alisque posticis latioribus. — Alæ antice flavescenti-griseæ, basi transversè vermiculate, macula interna speculoque dilutioribus, absque metallo. Costa albido strigata. Fimbria ad extimum carueo tincta. Posticæ cinereæ, minimè medio dilute.

(3) Affinissima *Coecimaculana*; at planè distincta. Statura illius, quandoquè major. Alæ antice cinereæ, atomis fuscis strigisque dilutioribus longitudinalibus omnino consperse; costa albido strigulata cincta, absque metallo; fimbria omnino grisea, punctulis fuscis. Alæ postice in mare ciuereo-albidæ, margine anguloque externo obscurioribus. — Dinis inventus D. Donzel.

(4) Statura *Hohenwartianæ* illique affinis. Alæ antice carneæ, macula basali rectè terminata, umbracea ad extimum alœ, speculum maculanque costalem oblongam albido strigulatam cincta, obscurioribus; fimbria carnea, apice rufa. Posticæ cinereæ. — Hanc speciem D. Du ponchel quasi varietatem *Hohenwartianæ* in tab. 249, fig. 5 b depinxit.

5) *Spartiana* H. 199 Tineidam generis *Haemylis* effingit.

LACTEANA Tr. Sup. . . . . . . . . . . . . . . . . Hungar.

SPEC. INC. SED.

MODESTANA FR.

DISCOLORANA Zell.

INCANA Zell.

ALBIDULANA FR.

STAGNANA H. 193. Fr.?

RADIOLANA Ev. faun. p. 520. (4).

---

— GEN. 21 TRYCHERIS Gn.

Poedisca Tr., D.

— { MEDIANA W. c-14, F., Fr., Tr., D. . . . . . . Gall. mer.  
  { Aurana F.

---

(1) Hanc et *Infidanam* cui similem esse affirmat, D. Eversmann in gen. Teras collocat. An genuinam *Infidanam* vidit?

### Tribus VIII.

#### PYRALOIDI Gu. (1)

---

##### GEN. 1. SIMÆTHIS St.

*Choreutes* Tr., *Xylopoda* D.

---

{ VIBRANA H. 202, D., Tr. ( <i>alis</i> ). . . . . . . . . . .	Dalmat.
{ Bjerkantrana F.?	
PRETIOSANA D. Sup. 362. . . . . . . . . . . . . . . . .	Gall. mer.
PULLULANA Eversm. B <sup>n</sup> mosc. 1842. ( <i>alis</i> ) faun. 468. . . .	Casan.

---

##### GEN. 2. CHOREUTES Tr.

*Xylopoda* D.

---

{ SCINTILULANA H. verz., Tr. ( <i>alis</i> ), D. Sup. . . . .	Hungar., Austr.
{ Augustana H. 204.	

---

##### GEN. 3. XYLOPODA Lat.

D., *Choreutes* Tr., *Simæthis* St., Curt.

---

{ FABRICIANA Lin. 324, F., D. . . . . . . . . . .	Europ.
{ Urticana W., H. 273.	
{ Dentana H. 4, 5.	
{ Alternalis Tr. (2).	

---

(1) Hæcce tribus vix ad Tortrices pertinere videtur; neque ad Pyrales, sicut Germani voluere, etsi larvæ aliquo modo Pyralidas revocent. Reverè familiam admodò separatam effingit, quæ paucas sanè apud nos, plurimas verò exoticas species comprehendit.

(2) Quarè hujus antiquum speciei nomen in recentissimum *Alternalis* denominationem (et *Nemorana* in *Incisalis*) D. Treitschke mutaverit omnino non admitto.

—	{ PARIANA Lin. 820, Cl., W., F., D. . . . .	P.
—	{ Parialis Tr., FR.	
—	{ NEMORANA H. 3, D. (non Fr.). . . . .	Gall. mer.
—	{ Incisalis Tr.	

---

GEN. 4. ORCHEMIA Gn.

*Choreutes* Tr, *Coccyx* D.

{ * DIANA H. 274. . . . .	?	
{ Dianalis Tr. in not.		
{ GALLICANA Gn. . . . .		Gall. bor.
{ Diana D. 4206. (non H.).		

SPEC. INC. SED.

MYLLERANA F. 147.

---

Tribus IX.

COCHYLIDI Ga.

— GEN. 1. LOBESIA Ga.

*Argyroteza* St., *Tortrix* D., *Cochylis* Tr.

— *RELIQUANA* H. verz., Tr., D. Sup. (1) . . . . . Gall., Germ.  
    { *Permixtana* H. 75, D. (non W.)  
    { *Fischerana* FR. in litt. Tr.? (♀)

— *BOTRANA* W. e-26. (2). . . . . . . . . . . Austr.  
    { *Vitisana* Jacq., Fr. p. 45.  
    { *Reliquana* FR. in litt.

*LUGDUNANA* Gn. (3) . . . . . . . . . . . Alpes, Gall. mer.

*BICINCTANA* D. Sup. 597. . . . . . . . . . . P.

*SERVILLANA* D. 1324. . . . . . . . . . . Gall. bor.

(1) Genuina Wien. Verz. *Permixtana* adhuc ignoratur. In mus. SchiFF. sub hoc nomine duo reperiuntur scilicet: *Musselliana* Tr., et *Rubellana* H. Illa verò, etsi diversa sit D<sup>r</sup> Fischeri opinio, genuina est Hubneri *Permixtana* 75 cui, in Verz.-Bek., *Reliquana* nomen imposuit. Quin etiam *Reliquana* mas Treitschki, cuius alas posticas *niveas* *marginè carulescentes* dicit, hic tantum referri potest. (Fem. ejus verò incerta est.) D. Duponchel contrà, his feminam sub duobus nominibus edidit, non verò semel marem. — D. Frölich *Leucoptera* suam hic allegat; at minime mili convenire videtur. Potius species foret generis *Coccyx*.

(2) Vix in Gallia nota est. — Paulò major *Reliquana*, aliisque manifestè rotundioribus. Ale antica ochracea; brunneo, fusco, cæruleoque marmorata, basi brunnea puncto fusco, fascia media brunnea supernè cæruleo-nigro tincta, et in medio lacrymam obscuriorema extus emitente, apice macula brunnea subquadrata puncto fusco superata. Posticæ cinereæ. — Larva amphelophaga: imago Maii et Augusti.

(3) Præcedent paulò major. Ale anticae subrotundæ, albido-carnæ, basi fusca, perlimitata; fascia media fusca, carneo interrupta, rufo intùs adumbrata, apice macula rotunda brunnea puncto fusco superata. Ale posticæ in mare nivo-lucidulæ, marginè apiceque nigricantibus. *Lugduni* in *Pinetis* capta à D. Donzel.

— GEN. 2. EUPOECILIA St.

*Cochylis* Tr., D.

PURGATANA Tr. Sup., D. Sup. (1). . . . . Austr., Alp.

CARNEANA Gn. (2). . . . . Gall. centr.

DUBITANA H. 74, Fr., Tr., D. . . . . P.

{ SIMPLANA FR. p. 38. (3). . . . . Gall. germ.  
Ambiguana D. 1322. (non alior. auct.)

{ HYBRIDELLANA H. 354 (*ella*). (4) . . . . . P.

{ Ambiguana Tr. (non D.)

{ Cruentana? Fr.

FRICIDANA Gn. (5). . . . . Dalecarl.

{ AMBIQUANA H. 153 (*ella*). (6) . . . . . P.

{ Roserana Fr., Tr., D.

---

(1) In aliibus major, obscurior, vividior.

(2) Minima. Ale antice subtundae, pallide carneae, fascia media lata maculaque costata versus apicem ex atomis cæruleo-nigris confertis; simbrìa carnea, paulò rufescens. Subtùs nigricantes, simbrìa subrufa; posticam utrinque albido-cineræ. Corpus nigricans, capite annoe carneis. — Castroduni in dumetis; rarissima. Fontisblesudi quoque capta à D. Lefebvre, mense Maio.

(3) *Penthinas* sanè revocat ut et *Dubitana* cui similissima appetet. Hanc ego raram speciem circa Enghien, propè Parisios, mense Maio, inveni.

(4) Nemo Hybridellam H. 354 agnoverat: Ideò nomen novum huic speciei D. Treitschke imposuerat; ast immerito nomen *Ambiguana*, quod alteram ejusdem generis speciem designare debet, usurpavit. Nomina igitur Hubneriana utrèque restitui; sed, quidam jam *Sciaphila Hybrida* extiterit, verbi finem alio modo vertere debui. — Larva in Carduorum receptaculo vitam degit, latens inter pappos quorum semina rodit, ibique metamorphosim subiens. Sic papilionem educa, si colorem hunc roseum vel sanguineum in apicibus alarum observare velias ab Hubnero expressum, qui fortè picturæ agnitionem omnibus offecit, et qui à Frölichio nomen *Cruentana* haud improbabiliter meritus est.

(5) Præcedenti affinis; at major. Ale antice trigonæ, albido-nigricantes; areis passim ochraceo-olivaceis; basi macula magna marginis interni simbrìaque cæruleo-griseis; costa marginaque

— { <b>ANGUSTANA</b> H. 74, Tr., St., D. . . . . . . . . { <b>Ambiguana</b> Fr.?	P.
* <b>PUSTULANA</b> H. 208. . . . . . . . . . . . . . .	?
— <b>UDANA</b> Gn. (4). . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>Castroduni.</b>
<b>OSTRINANA</b> Gn. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>Castroduni.</b>
— { <b>RUBELLANA</b> H. 285 (non 286). Tr.. D. (3). . . . .	Germ. gall.
{ <b>Ciliiana</b> Fr. 75.	
{ <b>Ciliella</b> H. 180?	
{ <b>Ruficiliiana</b> Curt.	
— { <b>DIPSACEANA</b> FR., D. Sup. 359. . . . . . . . .	<b>Austria.</b>
{ <b>Rubellana</b> Fr.?	
<b>EPILINANA</b> Zell., D. Sup. 358. (4). . . . . . . . .	Germ.
<b>RICHTERIANA</b> FR. p. 92, Frey. . . . . . . . . . .	Siles.

*interno nigro-punctatis. Alae omnes subtus albo marmoratae. Caput palpique alba. — è Dalecarlia accepta à Dr. Boisduval.*

(6) Vide, pro ejus nomine, *Hybridellanae* notam.

(1) Statura vix *Angustana*. Alæ anticae lucidæ, fusco-olivaceo, ochraceo, argenteo que variegatae, fascia media brunnea, parùm distincta, macula nigra versus medium notata, maculas inter duas plumbeo argenteas; apice ochraceo argentea, brunneo subfasciatæ. Postica cinereo-fusca, nitidula. Caput palpique flava. In pratis paludosis inter carices mense Augusto volat. — *Pustulanam H.* revocat. An certe hujus generis?

(2) Species pulcherrima. Statura vix *Rubellana*. Alæ anticæ basi flavæ, deinceps purpureo-violaceæ, maculis duabus oppositis flavicantibus vix scriptis, fimbria crocea, basi litura costali purpurea. Posticæ cinereæ. Thorax, caput, anusque pallidè-flava. Capta Castrodoni, in ericetis, mense Augusto.

(3) Duplex in Hubnero error in hac specie invenitur — 1<sup>o</sup> 288 loco 285 legitur. — 2<sup>o</sup> Pictura 286 nullo modo *Rubellanam* effugit, nullique Tortrici mihi cognitae convenit. Genuina *Rubellana* ab omnibus facile secernitur similitudine valde rufescente.

(4) Nominis hujus originem D. Duponchel (Sup. p. 178) non invenisse queritur. Ab Epi et Linon (in Lino) ortum mihi videtur, quia imago in Lino volitare solet, sole cadente, mense Julio.

\* *JUCUNDANA* Tr., D.? (1) . . . . . Hungar.

— GEN. 3. STENODES Gn.

*ELONGANA* FR. p. 183, Frey. . . . . Germ.

— GEN 4. XANTHOSETIA St.

*Curt.* D., *Tortrix* Tr.

— { *ZOEGANA* Lin. 289. W., F., H. 438, Fr., Tr., D. . . . . Europ.  
    { *Hamana* Clerck. t. 4. f. 4.

\* *STIGMATANA* Ev. faun. p. 493. . . . . Ural.

— { *HAMANA* Lin 290, Cl., W., H. 440, Tr., D. . . . . Europ.  
    { *Cruciana* Lin., F.  
    { *Zoegana* var. b. F.  
    { Var. *Diversana* H. 439.

{ *PERAMPLANA* H. Verz., Tr. . . . . : . . Sicil.  
    { *Amplana* H. 204, D.

*FULVANA* FR. p. 35, Tr. . . . . Hungar.

— GEN. 5. CHROSIS Gn.

*Argyrolepis* St., D. *Tortrix* Tr.

— { *DECIMANA* W. b-6-7, F., H. 445, Fr., Tr., D. . . . . Austr.  
    { Var.? *Allionana* F. . . . . . . . . . . Ital.

— { *TESSERANA* W. b-7, Tr., D. . . . . . . . . . . P.  
    { *Tesselana* H. 444.  
    { *Heiseana* F., Fr.

(1) Ea est Treitschki's descriptionis inopia ut *Jucundana* ejus agnosci non possit. Ea vero quam sub hoc nomine possideo fortè non genuina est.

* RUTILANA H. 249, Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Germ.
AUDOUINANA D. 4356.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gall. bor.
EUPHORBIANA Frey., D. Sup.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Siles.

---

GEN 6. ARGYROLEPIA St.

D. *Tortrix* Tr.

{ TRIANGULANA Tr. Sup.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Germ., Hung.
{ Kuhlweiniana FR.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
{ BAUMANNIANA W. b-6, F., Fr., Tr. (1).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Europ.
{ Hartmanniana Cl. (non Lin.), H. 446.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
{ Var.? Tergana Ev. faun. p. 498.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ural.
MARGAROTANA Lef., D. 4228	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alp., Gall. mer.
MARITIMANA Gn. (2).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Armoracia.
{ ZEPHYRANA Tr. p. 427, D. Sup.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hungar., Germ.
{ Cembrella mus. Schiff., W.? (non Lin.).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VIRGINANA Gn. (3).	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gall. centr.

---

(1) Valde variat, presertim statura. Pictura Clerckii certè huic pertinet, nullo modo autem *Hartmanniana* Linnei descriptio.

(2) Affinisima precedentibus; differt verò aliis anticis paulò acutioribus, fimbria vix intersecta, colore pallidiore, costa subtus albo-flavida; posticis suprà disco albicantibus, fimbria alba, subtus albis, marginibus vix nigricantibus; femina mari concolore et nullo modo nigriore. Circiter 10 exemplaria utriusque sexù eepi, mense Augusto, in Armoracia propè Venetiam. Ad littora maris volitat, in *Eryngio maritimo*.

(3) Minima hujus generis. Subaffinis *Zephyrana*, at aliis posticis niveis planè distincta. Aliæ anticæ elongatæ, sulphureo-olivaceæ, albo-argenteo marmoratæ, micantes, fasciis duabus nigro-fuscis, dilutis, interruptis: fimbria nivea. Posticæ in mare suprà niveas; costa sspè nigricante: subtus niveas, immaculatae. Capta propè Castrodonum mense Maio, in herbidis collibus sole volitans.

PERFUSANA FR. in litt. (1) . . . . .	Austr., Alpes.
— { SCHREIBERSIANA Fr. 444, H. 306, Tr., D. . . . .	P.
{ Lediana H. 454. (non Lin., nec Cl.)	
GUENEANA D. 4293. . . . .	Sicil.
ÆNEANA H. 188. . . . .	Germ.
PURANA Gn. (2) . . . . .	Gall. mer.
AMIANTANA H. 455, Tr., D. . . . .	Austr., Hungar.
— { SANGUINANA Tr. p. 416, D. . . . .	Germ.
{ Baumanniana H. 448.	
{ Francillana F.?, St.	
{ BADIANA H. 447, W.?. Fr.? . . . .	Alpes.
{ Rubigana Tr., D.	
MANNIANA Tr., D. Sup. 545. (3). . . . .	Austr.
MUSSEHLIANA Tr. Sup.. D. Sup. . . . .	Germ.

— GEN. 7. ARGYROPTERA D.

*Argyrolepia* St., *Tortrix* et *Coccyx* Tr.

PAREYSSIANA Tr. in litt. D. Sup. 542. (4) . . .	Austria., Russ. mer.
---	----------------------

(1) Species nova, *Cochylidis* affinis. Alæ antice subtrigonæ, paleaceæ, maculis punctiformibus albo-argenteis undique conspersæ; fimbria paleacea: subtùs nigricantes. Alæ postice cinereæ, fimbria dilutiore. In summis montibus Austriae et in alpibus Delphinatùs.

(2) Statura *Amiantana*. Alæ antice niveæ, fascia subbasali alteraque terminali rufis, punctis aliquot metallicis notatis, costa rufa punctata. Postice albide, rufa subtinctæ. Thorax, caput palpique nivea. In alpibus Gallie merid., Junii. — Ferè *Noctuas* revocat.

(3) Nimis affinis sequenti.

(4) Sub nomine quoque *Mercuriana* D. Eversmann misit.

HYDRARGYRANA Eversm. B <sup>in</sup> mosc. 1842, faun. p. 495. (1).	Ural.
LATHONIANA H. 489, Tr., D. . . . .	Hungar.
NORVICHIANA H. 252. . . . .	?
ADAMANTANA Gn. (2). . . . .	Lapon.?
MARGARITANA H. 219, Tr., D. . . . .	Hungar.
LOCUPLETANA H. 268, D. . . . .	Sicil.

— GEN. 8. COCHYLIS Tr.. D.

{ DIPOLTANA H. 345 ( <i>ella</i> ), Tr., D. Sup. . . . .	P.
{ Zebrana D. pl. 260.	
— ZEBRANA H. 197, Tr., D. Sup. . . . .	Hungar., Germ.
FLAGELLANA D. 4245. . . . .	P.
{ SMEATHMANNIANA F. 28, Fr., Tr., D. . . . .	Europ.
{ Fabriciana H. 149.	
{ Var.? Biviana D. Sup. 356.	
KINDERMANNANA Tr. p. 276, FR., D. . . . .	Austr., Hungar.
{ * AGRESTANA Tr. . . . .	?
{ Verecundana FR. in litt.	
{ TISCHERANA Tr. p. 275, FR. . . . .	Hungar., P.
{ Sudana D.	

(1) Affinissima certe praecedenti, et vix, nisi nigredine alarum posticarum, distincta. Inter hanc et *Lathonianam* prorsus media.

(2) Species splendidissima D<sup>o</sup> Boisduval à D<sup>o</sup> Schœnnherr ex Lapponia (?) missa. Statura *Lathoniana*. Aleæ antice sanguineo-ferruginea, nigro-punctulata, maculis quatuor latis, argenteis nitidissimis, prima basali irregulari, secunda costali, in apice, pyriformi, majoribus; tertia ovata, interna, quarta lacrymiformi, antemarginali, minoribus. Ale postice dilute cinereæ. Thorax caput antennæque ferruginea.

**SPEC. INC. SED. (2)**

<b>POSTICANA</b> F., H. 314, Fr.	<b>KNOCHIANA</b> Fr. 70.
<b>DISSOLUTANA</b> FR.	{ <b>ANTENNANA</b> Fr. 147. { <b>Permixtana</b> H. 187?
<b>PALLIDANA</b> FR.	
<b>PUMILANA</b> Mann.	<b>LEDIANA</b> L. 313, Gl., F.
<b>ÆRIFERANA</b> FR.	<b>OBLIQUANA</b> Ev. faun. p. 528. (non F.)
<b>PURPURATANA</b> Mann.	<b>ARABESCANA</b> Ev. faun p. 528.
<b>LIMBATANA</b> FR.	<b>DISCOPUNCTANA</b> Ev. faun. p. 528.
<b>HUMIDANA</b> FR.	<b>ACUTANA</b> Ev. fauna. p. 529. (non Tr.)
<b>FLAVISCAPULANA</b> FR.	

(1) *Statura Citrana*. Alie anticæ acutæ, sulphureæ, strigis duabus rufis, fulguratis, à margine interno ineuntibus, costam verò non attingentibus. Posticæ cinereæ, sinibria albo-sulphurea. Caput, thorax palpique sulphurea; hi longi, prorecti. Fæmina minor, pallidior, at simillima. Capta à me propè Bayonne, mense Junio.

(2) Ad omnem tribu pertinent.

Tribus X.

APHELIDI Gn.

— GEN 1. APHELIA Curt.

*Argyroptera* D., *Tortrix* Tr.

†

SULPHURANA H. 162. (1). . . . . Pyren.

GOUANA Lin. 318, F., Fr., Tr., D. . . . . Helvet., Gall. mer.

Argentana Cl., W., H. 86.

Magnana H. 225-6. (2)

Pyr. Margaritalis D.

††

PRATANA H. 227-8, Tr., D. . . . . Germ., Normann.

Quadripunctana Curt., St.

— GEN. 2. TORTRICODES Gn.

*Tortrix* Fr. *Lemmatophila* Tr., D.

HYEMANA H. 267, Fr. . . . . P.

Hyemella Tr., D. Sup.

♀ { Tortricella H. 41.

Alternella D., non W.

PUNCTULANA W. e-113, F. . . . . Germ.

Punctulella Tr.

Schlemmerella H. 44.

(1) Pauld minor *Gouana*. Alæ antice trigonæ, sulphureæ, immaculatæ. Posticæ cinereo-fuscentes, simbra sulphurea. In pratis Pyrenæensisibus ubertim volat, mense Maio : sedet in Graminibus.

(2) An hæc sit *Tinea Magnella* et *Lithosia Magna* Fab. dubitari potest. Verba enim « magna in hoc genere » locutusque assignatus inter *Gigantellam* et *Colonellam* nullo modo cum *Gouana* conveniunt.

## LEPIDOPTERORUM NOCTURNORVM

PIXIS, VIII.

TINEÆ

LINNÆI.

Tribus I.

## EPIGRAPHIDI Gp.

#### GEN. 4. LEMMATOPHILA Tr.

D. *Chimabacche* H., Z.

## GEN. 2. EXAPATE Zell.

*Lemmatophila* Tr., D.

1

— SALICELLA H. 9, Tr., D., Z., Frey. . . . . P.

†† (*Cheimonophila* D.)

{ *GELATELLA* Lin. 344, F., Tr., H. 266 (*ana*), D., Frey.  
 Congelatella Cl.  
 { *Lithosia Gelata* F. Sup.

(1) Larva pallidè luteo-virescens, capite, scutulis, pedibusque veris in juventute nigro-nigritibus, postea pallescentibus, tertia pedum pari in spatula-dilatata (ut in *D. Fagella*), intrà folia Malii, Quercis, Betule, etc. vivit. Augusti metamorphosim subit, imagoque Octobri volat. — Femina alis brevioribus, ut *Fagella*, instructa est.

— GEN. 3. DIURNEA Haw.

Curt.. Kirb., D., *Lemmatophila* Tr., *Chimabaeche* Zell.,  
*Crambus* F.

— FAGELLA W., b-34, F., H. 42, Tr., D., Z. . . . . P.

— DORMOYELLA D. 1493. (1) . . . . . P.

— GEN. 4. EPIGRAPHIA Curt.

St., D., *Semioscopis* H., Z., *Lemmatophila* Tr.

— { STRIGULELLA W., e-15, F., Z. (*ana*). . . . . Austr.  
Atomella H. 43, Tr., D. Sup.

— AVELLANELLA H. 27. Tr., D., Z. . . . . P.

— { STEINKELLNERIELLA W., f-16 (*ana*), F., Tr., D. . . P.  
Characterella H. 26.

{ ALIENELLA Tr., D. (2) . . . . . Austr., Francon.  
Anella H. 28, Z.

---

(1) An varietas tantum precedentis?

(2) Mox *Aneliam* in genere *Galleria* videbimus cui nomen prius impositum est. Ideò Treitsche  
hocce mutavit, et recte.

Tribus II.

## PHYCIDI GN.

### **Gen. 4. MELIPHORA (4) Gn.**

Galleria Lat., D.

**AÈVEARIELLA** (2) F. Sup. (*aria*), Lat., Réaum., St., D. . Gall.

**Gen. 2. GALLERIA Lat.**

D<sub>e</sub>, Z<sub>e</sub>

{ ♂ CERELLA Lin. 282 (*ana*), F., H. 25, Tr., D. . . . P.  
 { ♀ MELLONELLA Lin. 375, W., F., Z.

### GEN. 3. MELIA Curt.

St., *Melissoblaptes* Z., *Galleria* Lat., D.

(1) Genus *singulare*, apud nos unicum hoc Lepidopterum includens, sed plura exotica insuper comprehendens. Speciem è Brasilia acceptam possideo quae ab *Atveariella* vix distinguitur. — *Meliphora à Meli et Phor* (non verò *pherein*).

(2) Bomb. *Cinereolum* H. 91 vix hic referre audeam; caput enim absque luteo depictum, ale postice rotundatæ, pallidæ, sicut in descriptione picturæ expressæ à nostris exemplaribus valde hunc removent.

CENTURIELLA W., b-12, F., H. 239, Tr. (1). Mont. Austr., Lappou.

FOEDELLA FR., Z. . . . . Hungar.

{ ANELLA W., b-30, F., Tr., D., Z. . . . . Germ., Gall. mer.  
Sociella H. 24.  
Bipunctana Curt., St.

\* UMBRATELLA Tr. . . . . Dalmat.

---

GEN. 4. MEGASIS Gn.

*Phycis* D., *Anerastia* Z.

{ RIPPERTELLA BdV. in litt., Z. . . . . Helvet., Alpes Dinice.  
Prodromella D. 1417. (non alior. auct.)

DILUCIDELLA D. 1430. . . . . Gall. austr.

---

— GEN. 5. ONCOCERA St.

*Phycis* Tr., D., *Epischnia* Z.

†

— { AHENELLA W., b-32, H. 58, Tr., Z. . . . . Mont. Germ. et Gall.

Var. { *Aeneella* H. 41. (non W.)  
*Ahenella* D.

— Var. *Bistrigella* D. 1424.

Var.? *Fuliginella* D. 1449. . . . . Pedemont.

RUBIGINELLA Tr., Z. . . . . Hungar.

BRUANDELLA Gn. (2) . . . . . Alpes.

---

(1) Species adhuc rarissima, nuper in montibus Austris à D<sup>o</sup> Fischer v. R. reperta. Hanc ego quoquè è Lapponia accepi.

(2) Statura habitusque *Lignella*. Alæ antice brunneæ, lunula media, area costali, lineisque duabus vix conspicuis, externa valde angulata, albido-pulvercis; margine externo albicante, punctis terminalibus fuscis. Alæ postice fusca, limbra in Mare albida. Palpi fusi, submetallici, basi albidi. Femina minor, alia obtusioribus, area costali interdum nulla. — Capta propè Vesuntonem à D<sup>o</sup> Bruand sedulo crucarum observatore.

{	CANDELISEQUELLA Ev. faun. p. 559. (1).	. . . . .	Ural.
	Propinquella Ev., Bi <sup>n</sup> , Mosc.		
*	BRUNNELLA Ev. faun. p. 560.	. . . . . , . .	Ural.
{	DIGNELLA H. text., Tr., Z.	. . . . . . . . .	Hungar.
	Lignella H. 35.		
*	SPADICELLA H. 225-6. (2).	. . . . . . . . .	?
	DECORELLA H. 304, Tr., D., Z., Ev.	. . . . . . . . .	Hungar.
{	GERMABELLA Zck., Tr., Z.	. . . . . . . . .	Hungar., Germ.
	Melanella D. Sup.		
{	MELANELLA Tr. p. 146, Z.	. . . . . . . . .	Carinth., Dalmat.
	An ♀ præced.?		
—	LIGNELLA H. 57, Tr.	. . . . . . . . . . . . . . .	Austr.
*	CHALYBELLA Ev. faun. p. 549.	. . . . . . . . . . .	Ural.
		††	
{	LURIDELLA FR. in litt. (3).	. . . . . . . . .	Gall. mer., Russ.
	Advenella ♀ D. (non alior. auct.)		
{	Rufella D.		
	Var.? Impurella D. 1423.	. . . . . . . . . . .	Corsic.

SPEC. INC. SED.

FUMELLA Ev. faun. p. 558.

(1) Maximè affinis præcedenti.

(2) Species ab Hubneri tempore nondum rursus reperta, et adhuc unceps. An picture 225 226 eamdem speciem effingant pariter dubitari potest.

(3) È tribus à D<sup>o</sup> Duponchel inventis nominibus nullum servari potest; scilicet: *Advenella*, quia Rhodophaea jam designat (vide hoc genus), *Rufella* (quæ varietas tantum), quia Elachistam iu Scopoli opero indicat: *Impurella* verò quia Hæmylidem. — Species hæc palpis omnino ab Oncoceris differt, forteque in posterum genus separatum efformare poterit. — Vidi specimen D<sup>o</sup> Boisduval a D<sup>r</sup> Eversmann è Russia sine nomine missum.

GEN. 6. BRACHODES Gn.

VERNETELLA Gn. (1) . . . . . . . . . Pyr. orient.

---

— GEN. 7. DIOSIA D.

*Phycis* Tr., *Epischnia* Z., *Bombyx* W., *Pyratlis* F.

MARGINELLA W. (ea) Noct. c-13, Esp., D., Z. . . Austr., Helvet.

Antiopella Zck., Tr.

Marginalis F., D.

Atrella F.

Var. { *Auriciliella* H. 340, Tr.. D. (2)  
Marginalis W. b-30-31.

---

— GEN. 8. CHIONEA Gn. (3)

*Phycis* et *Ennychia* D., *Myelois* Zell.

— { *ÆTHIOPELLA* D. 1468 (4). . . . . . . . . Summ. mont.

Enn. *Monspesulalis* D.

*Helveticella* Zell.

\* *ALPICOLLELLA* Z. p. 177. . . . . . . . Alp. Helvet.

---

(1) *Satura Decorella*. Alæ antice ochroleucæ, fusco-sabulosa, striga basali maculisque posticis ochroleucis; fimbria fusca. Alæ posticæ fuscae, fimbria ochroleuca. Caput luteum. Capta propè Vernet à D<sup>o</sup> Donzel. Hæc species, etsi Onc. *Luridella* affinis esse videatur, valdè tamen differt capito lanato, lingua absente, alis ferè quadratis, fimbriaque posticarum longiore. Quarè genus separatum creavi.

(2) Ambas simul volitantes in montibus propè Vienne D. Fischer invenit, speciminaque intermedia.

(3) Omnes hæc species in culminibus montium inter nives volitant. Valdè variant, plurimaque specimina antè decretoriam generis compositionem studienda desiderantur.

(4) Haec frequenter in summis Pyreneis propè St-Sauveur cum *Hercyna Rupicolali* volantem cepi; paulum verò in Alpibus differre videtur. Enyc. *Monspesulalis* Dup., cuius in ejus museo specimen detritum adhuc versatur, nihil aliud est quam ejusdem *Phycis Æthiopella*. Utraque verò nomina D. Zeller ignorasse videtur qui novum *Helveticella* nomen imposuit.

CULMINELLA Gn. (1).	Summ. Pyren.
FRIGIDELLA Gn. (2)	Summ. Pyren.

---

— GEN. 9. RHODOPHÆA Gn.

*Acrobasis et Myelois Zell., Phycis D.*

DUBIELLA D. 1444.	Helvet.
{ RUBROTIBIELLA FR. p. 158, D. Sup.	P.
{ Tumidana W.?	
— { TUMIDELLA Zck., Tr., D., Z., W.?	P.
{ Verrucella H. 73. (non W.)	
{ EPELYDELLA FR. in litt., Z. in not. (3).	Gallia.
{ Dunella Gn. oīm.	
— SUAVELLA Zck., Tr., Z., D. Sup.	P.
ADVENELLA Zck., Tr., Z. (non D.)	Germ.
RECURVELLA Gn. (4)	Gall. centr., Burgund.

(1) Affinis præcedenti sed major. Alæ antice nigro-fuliginose, strigaru[m] vestigiis vix conspiciuntur, simbria concolore. Alæ posticæ fuscae, simbria fusca. Subtùs omnes omnino fuscae, simbriis concoloribus. Palpi paulò incumbentes, nigri, basi nivea. — In Pyrenæis inveni propè Gavarnie mense Junio. Duo tantum vidi.

(2) Vix hujus generis, *Rhodophæis*que affinior. Statura *Suavella*. Alæ antice nigrae, atomis griseis in disco et ad basim consperse, strigis duabus ex istis atomis transversè sectæ, anterterminali ad costam puncto albicanter terminata; subtùs griseæ, macula costali marginaque externo latè nigris cantibus. Alæ posticæ utrinque nigro-fuscae, simbria albicante. Corpus nigrum, ano lutescente. In Pyrenæis cum præcedente capta.

(3) Statura vix *Consociehæa*, similis verò *Suavella*. Alæ antice basi omnino rubrae usque ad lineam verticalem albam versus costam subito angulatam, tunc obscurè griseæ, area media albicans puncto geminato nigro notata, linea postica uudata alba valde rubro extùs limbata: margine terminali albicante, punctis obsoletis nigris. Posticæ cinereo-fuscae; subtùs litura obsoleta costali albicante. — Circè Prinos volatit mense Maio.

(4) Statura *Suavella*. Alæ antice à medio costæ, usque ad tertiam partem marginis interni.

- LEGATELLA H. 74, Tr., Z. . . . . Hungar., Austria.  
— CONSOCELLA H. 328, Tr., Z., D. . . . . Gallia.  
— OBTUSELLA H. 245, FR., D., Z. (1). . . . . Germ., Gall.  
{ PERFLUELLA Zck., Z. . . . . Germ.  
Dibaphiella H. 472.  
{ RHENELLA Zck., FR., Tr., Z., D. fig. 1 a (non 1 b.) . Austr.  
Palumbella H. 70.

SPEC. INC. SED.

DULCELLA FR.

TEREBRELLA Zck., Tr., Z.

— GEN. 10. PEMPELIA Zell.

†

- { PALUMBELLA W. c-15, F., Tr., Z. (2) . . . . . Europ.  
Var. *Contubernella* H. 72.  
{ ALBARIELLA Z. p. 180. . . . . Hungar., Gall. mer.  
Palumbella D. pl. 281, Fig. 1, c.

rubro-fuscae, fascia albo-grisea, obliqua, marginem utrumque attingente, lineolamque arcuatam à cellula usque ad marginem internum emittente; rubro colore ibi conferto, at nunquam macula argillacea notato, tunc griseo-albidæ, puncto gemino rubricante; linea valde undata, in medio serrata, optimè expressa, extùs intùsque rubro latè adumbrata, margine terminali trilineato. Posticæ dilutè cinereæ. Thorax, caput, palpique rubro valde mixta, antennis filiformibus; Hanc ego circà Castrodunum semel inveni et à Burgundia quoquè accepi.

(1) Sub hoc nomine duas Phycidas D. Zeller designat: scilicet ista, nec non *Ph. Holosericella* FR. Si eodem nomine duo Microlepidoptera servari possunt, (et ego non annuo), saltem, duabus speciebus in eadem tribu et in eodem genere eodem modo designatis, rationis fines exirentur. Ideò nomen *Obtusella* huic servavi et, ad exempl. D<sup>r</sup> Fischer, alteram *Holosericellam* nominavi.

(2) Strigorum color animalculo nascente roseus, tunc ferrugineus, denique vix ochraceus. Inde Fabricius hunc brunneum dicit. — In *Contubernella* H., striga anterior in maculam ferè reniformem mutatur.

* PETRELLA Cat. Mann.	?
* GLAREOSELLA FR. in litt.	?
ALPIGENELLA D. 1442.	Helvet., Alp. Diniæ.
CRISTELLA H. 76, Tr., Z.	Gall., Austr.
††	
COMPOSITELLA Tr., Z., D. 2 (4)	Austr.

SPEC. INC. SED.

**FULVOSTRIGELLA** Ev. faun. p. 562.

---

— GEN. 14. PHYSICS Fab.

Tr., D., *Myelois*, *Nephopteryx*, *Epischnia*, et *Pempelia* Z.

十一

— { ROBORELLA W. c-14, Tr., D., Z. . . . . . . . . . P.  
Spissicella F., H. 75.  
Spissicornis F.

\* NEGLECTELLA H. 457. . . . . . . . . . .

十一

— { ABETELLA W. c-16, F., Tr., D., Z., Ratz. . . . . P.  
Decuriella H. 74, D. Ann. soc. ent.

(1) Forsan, antennis in *Mare* spissis, palporum forma, ab domine, aliquo crassioribus, genus separatum constituere posset.

(2) Statura habitusque *Roborella*. Alæ antice cinereo-albæ, atomis nigris adspersæ, strigis tribus transversis, basali incompleta, media sinuosa, versùs costam repanda, ante-terminali nigro intùs ferrugineo extùs adumbrata; puncto medio ferrugineo lineolas nigras superante. Postice subhyalinae, fusco marginatae. Capit à D<sup>o</sup> Donzel propè *Colmars*, in Alpibus.

(1) *Ornatella affinisima*; differt verò palpis multò longioribus, robustioribus, valde ascendentibus, antennis minimè nodosis, alis rotundioribus, anticis magis brunneis, scripturis obsoletioribus. Capta à D<sup>o</sup> Donzel in Mont-Dore, mense Junio.

(2) Nomen ab ipso D<sup>o</sup> Zeller prius inventum posteriusque mutantum, at non recte.

(3) Utinam hoc nomen deleri posset quod ubique sequitur confusio! Picturam Hubneri *Obductella* D. Duponchel applicavit, Germani verò *Cinnamomella* cuius neque color, neque alarum forma in hac pictura reperiuntur. Huic vero speciei omnino et pictura Hubneri et illius descrip-  
tio conveniunt; ideo genuina est, nomenque *Adornatella* delere debui, et si fortè melius foret. — Apud nos species hæc frequentius invenitur.

(4) *Statura Ornatella*. Alæ anticae cinereo-chalybeæ, costa latè alba marginaque intimo testaceo, lineis 2 albis tenuissimis, griseo limbatis, basili punctis duobus notata: puncta duo cellularia albocincta. Posticea albida, subhyalina, linea terminali gemina obscuriore. Antennæ in Marc nudose. Circa Hyères invenit D. Douzel.

PORPHYRELLA D. 1454.	Gall., Hispan.
†††	
* ADELPHELLA FR. p. 50, Z. . . . .	Germ.
{ JANTHINELLA H. 374, Tr., D., FR., Z. . . . .	Europ.
{ Var. <i>Spadicella</i> Tr. (non H.) (4)	
* SERRATICORNELLA Z. p. 179. . . . .	Europ., Austr.
GREGELLA Ev. faun. p. 556. . . . .	Ural.
{ CARBONARIELLA FR. p. 157, Z., D. (2). . . . .	Europ bor.
{ Carbonella Ev.	
{ HOOSERICELLA FR. p. 149. . . . .	Germ., Gall. centr.
{ Obtusella Tr., Z.	
{ Christella Frey.	
TETRICELLA W. c-22, F., H. 244, D. (3). . . . .	Austr. Sabaud.
* FOECELLA FR. p. 160, Z. (4) . . . . .	Germ., Russ.
* ILIGNELLA Z. p. 177. . . . .	Hungar.
* GILVEOLELLA TR. p. 271, FR., Z. . . . .	Hungar.
RECTELLA Gn. (5) . . . . .	Gall. mer.

(1) D. Fischer in museo Treitschkiano vidit *Spadicellam* ad hauc speciem, minime vero ad *Spadicellam* Hubneri, convenientem.

(2) In Gallia boreali, Germania, Groenlandia, Lapponia, Russia, Islandia semper eadem. —  
Cur. D. Eversmann nomen mutavit?

(3) Species ambiguæ sedis. Forsan genus separatum efformat.

(4) Hanc, si picturam tantum D<sup>r</sup> Fischer inspicis, in genere *Rhodopaea* collocare velis: at D. Fischer ipse *Carbonariella* vicinissimum dicit.

(5) Primo intuitu affinis *Convolutella* sed planè alia, fortèque in hoc genere non remanenda. Feminam unicam tantùm vidi. Alia primores cinereæ, versus costam albido, lineis 2 albido, nigro adumbratis, media tremula at perpendiculari, ante-terminali vix obliqua, sinuosa; punctis 2 nigris albo-cincti subcostalibus. Palpi breves, incurvi. Abdomen ut in *Convolutella*. Propè Monspelium invenit D. De Villiers.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| { CONVOLUTELLA H. 34, Z. (non W.) (1). . . . .<br>{ Grossulariella Tr., D., H. Lary.?  | P.                  |
| CANTENERELLA D. 1488. . . . . . . . . . .  | Corsica, Gall. mer. |
| ††††† (GEN. <i>Ancylosis</i> Z.)   |                     |
| { CINNAMOMELLA D. 1436 (2). . . . . . . . .<br>{ Dilutella Tr., Z. (non H.)<br>{ Var. <i>Cinerella</i> D. 1491 (non Lin.)<br>{ Var? <i>Trapezella</i> D. 1434. | Germ., Gall. mer.   |
| * RUTILELLA Z. p. 178. . . . . . . . . . .   | Germ.               |
| { * CANELLA W. b-34, H. 289, Tr., Z., Ev. (3). . . . .<br>{ Depositella Zck.   | Hungar.             |

SPEC. INC. SED.

**INCANELLA** Ev. faun. p. 552.

ROSCIDELLA Ev. faun. p. 554.

LATERNELLA Ev. faun. p. 555.

**VESPERELLA** Ev. faun. p. 558.

RAVELLA FR.

AFFINIELLA FR.

(1) *Convolutella* Wien-Verz. nihil aliud est quam femina *Crambi Luteelli*, et sic omnino delenda. Nomen igitur Hubnerianum pro hac specie antiquius exsurgit, et immerito ab auctoribus mutatum est. Præterea, modò larva ab Hubnero sub nomine *Grossulariella* picta genuina sit larva hujus *Phycis*, ( quod adhuc non est comprobatum ), nomen insecti perfecti non amplius mutari deberet quam in nonnullis aliis; Ex. gr. *Jasius* in : *Unedonis*, *Gentianana* in : *Pagana*, etc.

(2) Species hæc sub nomine *Dilutella* in museis Germanis undique designatur, minimè verò ad *Dilutellam* Hub. 69 convenit. Alarum enim forma (quæ hic characterem magis momenti præbet) striga baseos minimè fulgurata, puncto nigro externo destituta, statura, alaque posticæ minus late et bicoloris, etc., etc. hanc non esse demonstrant. — In Gallia merid. prope Bayonne copiose inventi. Valde variat. — *Cinerella* D. certè hujus varietas pallidior: at *Trapezella* ego non vidi.

(3) Hanc ego non vidi. Si fides Hubneri picturæ debetur, potius in divisione 111 propè *Ornatellam* collocaretur, sed D. Zeller, qui sanè eam in museo Schiff. vidit, afluxim esse præcedentibus testatur.

CINGILELLA FR.

CRUENTELLA FR. (non D.)

SPLENDIDELLA Mann.

---

— GEN. 12. NEPHOPTERYX Zell.

— ANGUSTELLA H. 68 et text., Z. (4) . . . . . Germ., Gall. centr.

---

GEN. 13. PLODIA Gn.

*Phycis* Tr., D., *Myelois* Z.

INTERPUNCTELLA H. 310, Tr., D., Z. (2) . . . . . Gall. mer.

---

— GEN. 14. EPISCHNIA Zell.

*Phycis* Tr., D.

†

— PRODRMELLA H. 254, Tr., Z., Ev. (non D.) . . . . . Gall.  
Umbraticella D. (3).

\* ILLOTELLA Z. p. 178. . . . . . . . . . . Sicil.

---

(1) *Pictura* Lubneri prava admodum, Treitschkiique descriptioni vix congruens, — Species elegans, nullique proxima. — Alæ anticæ nitidæ, minimè angustæ, costa ad apicem convexa; cunereæ, lineis submediis duabus undosis brunneis, parallelis, maculaque interna nigricante è squamis elevatis coadunata: striga obliqua ante-terminali vix distincta, supernè nigricantè, infernè rubricantè, punctis duobus subcostalibus, lineolaque media fulgurata, valdè obliqua, ex apice lineæ ante-terminalis ad basim linearum mediarium decurrente; punctis quatuor terminalibus nigris. Alæ posticæ albido-hyalinæ. Palpi capite duplo longiores, articulo secundo securiformi, tertio crasso, obtuso, piloso. Antennæ in Mare basi incrassatae, tenuissimè ciliatae. Circù dumeta volitat apud nos Augusti.

(2) Larva-ne piniperda vel zoophaga? adhuc sub judice lis est.

(3) Nomen sanè congruum, at seriùs venit. *Prodromella* D. Megas. *Rippertella* convenit. Vide supra.

††

TRANSVERSELLA D. 1429. (non alior.). . . . .	Alpes., Gall. mer.
* BIVITELLA D. 1426. . . . .	Corsic.
* DAHLIELLA Tr., Z. . . . .	Sicil.
* OSSEATELLA Tr. . . . .	Sicil.
BOISDUVALIELLA Gn. (1). . . . .	Helvet.

GEN. 15. RHAMPHODES Gn.

*Phycis* Tr., D., *Pempelia* Z.

{ ETIELLA Tr. p. 174, FR., D., Z. . . . .	Europ. austr.
Zinckenella Tr., Ohlm.	

GEN. 16. MYELOIS Zell.

*Phycis* Tr., D.

VITTABELLA Gn. (2). . . . .	P
ACHATINELLA H. 454, Z., D. . . . .	Germ.

— GEN. 17. EPHESTIA Gn.

*Phycis* Tr., D., *Myelois* Z.

†

ELUTELLA H. text., Tr., D., Z. . . . .	Europ.
CINEROSELLA FR., Z. in not. . . . .	Hungar.

(1) Afinis videtur colore *Divitella*; at alia. Alæ antice angusta, cervine, vitta costali albocinerea, marginibus interno terminalique cinereo adpersis, puncto minimo cellulari nigro, fimbria concolore, trilineata. Alæ postice albido-sub hyalinae. Antennæ minimè nodosæ. Palpi capite duplo longiores, conici, basi ascendentes, denique porrecti. — Ex Helvetia accepta ab amicissimo Boisduval cuius nomine gaudet.

(2) Statura *Achatinella*, palpi antennæque prorsus hujus speciei, habitus ferè idem, non verè

十一

- { *CERATONIELLA* FR. p. 147. . . . . Germ.  
 { *Ceratoniæ* Z.

*CALIDELLA* Gn. (4). . . . . Insul. Hyères.

SPEC. INC. SEP.

## CHYRSORRHOEELLA Zck., Tr., Z.

BIVIELLA FR.

BIGELLA Z. in not.

OBLITELLA Z. in not.

### GEN. 18. LOTRIA Gn.

*Phycis* Tr., D., *Phycidea*. Z.



color neque scripture alarum: unde vix hujus generis affirmare audeam, unico viso specimine. — Ad Rhodophaeas transire videtur. — Alae antice nigro-fuscae, vitta media sub-obliqua, alba, recta, costam vix attingente, strigaque ante-terminali vix conspicua, dilutiore. Posticae cinereo-fuscae. Subtus omnes cinereo-fuscae, nitidæ, immaculate. — è Musco D<sup>r</sup> Boisduval qui patriam ignorat.

(1) *Statura Ceratoniella cui affinis*, at alia videtur. Alæ antice cinereæ, atomis nigris conspersæ, strigis duabus albidiорibus vix conspicuis, media bi-angulata, non verò obliqua, atomis densioribus nigris extùs adumbrata, ante-terminali undata, nigro augustiùs marginata; puncto medio nigra vix ab atomis distincto, punctulæ marginalibus aliquot nigris, simbria cinerea. Alæ postice albida, sub-hyalina, lineola gemina terminali fusca. Palpi capite longiores, graciles, protensi, articulo tertio secundum aequante, cylindrico-obtuso. Antennæ omnino filiformes, articulo basali vix incrassato. — D. Donzel cepit in insul. Illyræ.

(2) Major, macula costali fusca strigas medias jungente. Posticæ obscuriores. Ex Anglia accepi.

3) Major, vividior, color in rufum transit, Apud nos sat frequens.

— BINÆVELLA H. 383, Tr., D., Ev. . . . . Gall. centr., Russia.

— { NIMBELLA D. 1489, Z. . . . . Germ.  
Var.? *Nebulella* D. 1437. (non alior.) . . . . P.

NEBULELLA H. 457, Tr., Z., W.? (non D.). . . . P.

SPEC. INC. SED.

ALBIRICELLA FR.

PLUMBAGINELLA Ev. faun. p. 555.

---

— GEN. 19. MYELOPHILA Tr. (1).

D., *Lithosia* God., *Oncocera* St., *Myelois* Z.

— { CIBRELLA H. 67, Tr., God., D. . . . . P.  
Cibrum W., Z. (2).  
Cibriformis Esp.

---

— GEN. 20. ILITHYIA Lat.

D., *Crambus* F., *Phycis* Tr., *Oncocera* St., *Myelois*, *Pempelia*  
et *Nephopteryx* Z.

†

— ARGYRELLA W. b-28, F., H. 64, Tr., D., Z. Hung., Gall. mer. et occid.

---

(1) à D<sup>r</sup> Duponchel inter Yponomeutidas collocatum, sed ingratè. Quamvis enim Larvarum formans et mores (in Phycidis et Yponomeutidis tam discrepantes!) omnino spernat ille Entomologus, habitus tamen characteresque insecti perfecti ita ad Phycidas pertinent ut colore tantum Yponomeutidas revocare possit.

(2) Nomen Wien.-Verz., ad exemplar D<sup>r</sup> Zeller, servare omnino impossibile fuit; nam jamjam nomine *Cibrum* *Lithosia* existit, que à tironibus cum Mycl. *Cibrella* faciliter miscenda foret.

---

{	CARNELLA L. 363, W., F., H. 66, Tr., D., Z. . . . .	Europ.
	Semirubella Scop.	
	Var. <i>Sanguinella</i> H. 65, St.	

††

---

{	ROSELLA Scop. 624. Z. . . . . . . . . . .	Hung. Austr.
	Pudorella H. 63, Tr., D.	
	Pudoralis W., F.	

SPEC. INC. SED.

CIRRIGERELLA Zck. 183, Z.

---

GEN. 21. SEMNIA Gn.

---

CRUENTELLA D. Sup. 510 (1) . . . . . . . . . . .	Hisp.
--	-------

---

GEN. 22. ARGYRODES Gn.

*Phycis* Tr., *Ilithyia* D., *Anerastia* Z.

---

VINETELLA F. 29, H. 42, Tr., D., Z. . . . . . . . . . .	Hungar.
---	---------

---

GEN. 23. ANERASTIA Zell.

*Phycis* Tr., D.

---

{	LOTELLA H. 334, D., Z. . . . . . . . . . .	Germ.
	Miniosella Tr.	
	Var. <i>Lotella</i> Tr.	

---

(1) D. Fischer sub hoc nomine Phycidam indicavit, at nondum in lucem edidit. Nomen Duponchelianum igitur prius servandum.

**PUNCTELLA** Tr. p. 268, D., Z. (1). . . . . . . . . . Gall. mer.

**ABLUTELLA** Z. p. 477. . . . . . . . . . Sicil.

**SPEC. INC. SED.**

**PUDICELLA** Germ.

**LEUCACRINELLA** FR.

**LIMBELLA** Podv.

---

(1) Linnaeus (S. N. 386) *Punctellam* refert quae generi *Gracillaria* pertinere videtur.

Tribus III.

CRAMBIDI Lat.

GEN. 1. TALIS Gn.

*Phycis* D., *Eudorea* Z.

{ <i>Quercella</i> W. b-18, D., Tr. ?, Z. (1) . . . . .	Hungar.
{ <i>Noctuella</i> H. 33 ?	

— GEN. 2. EUCHROMIUS Gn.

*Crambus* D., Z. *Phycis* Tr.

— <i>BELLUS</i> H. 60, Tr., D., Z. (2) . . . . .	Hungar., Gall. mer., Vosg.
--	----------------------------

<i>RAMBURIELLUS</i> D. 4382. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Corsic.
--	---------

* <i>FUNICULELLUS</i> Tr., Z. An id. ac præc.? . . . . .	Sicil. . . . .
--	----------------

— GEN. 3. PLATYTES Gn.

*Crambus* D., Z.

— <i>CERUSSELLUS</i> W. b-32, Tr., Z. . . . . . . . . . . .	P.
{ <i>Auriferella</i> H. 62, St.	
♀ <i>Quadrellus</i> W. b-23, D.	
<i>Barbella</i> H. 64.	
Var. <i>Botys Nemausalis</i> D.	

(1) Genus admodum singulare, Crambidas Phycidasque sequè revocans. — Hujus speciei unicum exemplar vidi in museo D<sup>r</sup> Boisduval à D<sup>r</sup> Duponchel descriptum et pictum. An genuina Germanorum *Quercella*? — *Noctuella* H. minime hic convenire mihi videtur.

(2) Omnes species hujus Tribus ab Hubnero desinentiam *ella* et à Fabricio, in supplemento, varias fines acceperunt. (Sic Cr. *Pascuellus* ab II<sup>o</sup> *Pascuella* à Fab<sup>o</sup> Cr. *Pascuum* appellatur.) At

GEN. 4. CRAMBUS Fab.

十一

**\* CORSICELLUS** D. 1383. . . . . Corsic.

2

<b>PALPELLUS</b> W. b-3, H. 32, Tr., D., Z. . . . .	Hungar.
* <b>PALPIGERELLUS</b> FR. . . . . . . . . . .	?
<b>TENTACULELLUS</b> H. 230, Tr., D., Z. . . . .	Gall.
<b>DISPARELLUS</b> H. 357-8, D. . . . . . . . . .	Occitan.

三

\*

**ALPINELLUS** H. 338. Tr., D., Z. *alpinellus* (L.) *alpinellus* Alpes.

四

{ PRATELLUS Cl. t. 3, f. 44, L.?, H. text. et 401 ♀., Tr.,  
D., Ev. (non W. nec Vill.) (4) . . . . . Europ.  
Pratorum Z.  
Var. *Pratellus* H. 29.

niji has desinentias semper recantare sicque synonymiam frustrà inflare inutile prorsùs apparuit. (Vid. Introd. ann. Soc. Ent., p. 123, n° IV.)

(1) D. Zeller genuinam Linnaei *Pratellam* ad Cr. *Selasellum* refert; et quidem, si solam Fauna Suecica descriptionem interrogas, hoc planè verum esse affirmare poteris. Sed, in Syst. Nat. descriptione legitur: « apice striis obliquis » quæ in *Selasello* omnino desunt. Tum præcipue Linnaeus picturam Clerckii allegat, quæ, etsi rudis et incorrecta sit, tamen ad nostrum *Pratellum* tautum, minimè vero ad *Selasellum* pertinere potest. Sic lis judicatur. — Theresiani varietatem *Tristelli Pratellam* appellaverunt. — Fabricius descriptionem Linnaei refert, tamenque Wien. Verz. allegat, sicutque negligendum est. — Villers aliam speciem vidisse, (fortassis *Perlellum*) videtur. — Hubner fennium genuinam dedit; at marem ambiguum, et forsas *Dumetellum*, ut D. Zeller dicit; si tamen descriptionem (pag. 27) accurate legas, sexus differentiam, tempus volandi, habitationem in pratis, etc. huic potius quam *Dumetello* conuenire iugeneries.

DUMETELLUS H. 389-90, Tr., D., Z. (1) . . . . .	Austr., Alp.
* ALIENELLUS Zck., H. 60, Z., Tr. in not. . . . .	Lusitan.
* TIGURINELLUS D. 4372. . . . .	Helv.
{ ERICELLUS H. 371, Tr., Z. . . . .	Germ,
{ Var.? Zinckenellus Tr.	
— { ADIPPELLUS Tr. p. 73, D. (2). . . . .	Germ., Castroduni.
{ Silvellus H. 369-70, Z.	
{ ENSIGERELLUS H. 367, Tr., D. . . . .	Germ.
{ Hamellus Th.?, Z.	
* SATRAPELLUS Zck. IV. 247, Z. . . . .	?
{ NEMORELLUS H. 384, Z. . . . .	Germ.
{ Lathoniellus Zck.	
— PASCUELLUS L. 359, Scop., W., F., Tr., D., Z. . . . .	Europ.
MALACELLUS D. 4373. . . . .	Hispan.
	†††
— LAPONICELLUS D. (3). . . . .	Lapp.
— MARGARITELLUS H. 39, Tr., D., Z. (4) . . . . .	Germ. <i>or Lycosa</i>

(1) Hic D. Zeller *Pascuellam Scopolii* refert. Ambabus certè descriptio convenit, et verba hæc : «palpi fuscescentes» potius *Dumetello* aptantur; sed *Scopolium*, quia nullo modo vittam argenteam dente vel puncto nigro in medio notatam dicit, *Pascuellum* genuinum descripsisse censeo.

(2) *Sylvestra* in vicina Tribu jam existit. Ceterò minimè in *Sylvis*, sed in pratis uidis *Crambus* ille habitat.

(3) Statura habitusque *Margaritelli*. Aliæ antice castaneo-fuscæ, minimè nitide, vitta media alba, recta, paulùm fusco marginata, à basi ferò usque ad limbriam ducta; limbris griseo-albicante. Aliæ posticæ cinctæ unicolores, ciliis griseo-albidis. Subtùs omnes concolores, griseæ. Palpi castanei, recti, porrecti, apice acuti. — è Lapponia accepit D. Pierret.

(4) Non Wien.-Verz. neque Fabricii. — Quæ sit ista *Margaritella* adhuc ignoramus. In Wien.-Verz. indicatur : *la teigne à rayure d'argent* Geoff., p. 183. At ista potius *Palpulam* et verisimiliter *Aristellam* L. designat.

ADAMANTELLUS Gn. (1) . . . . .	Burgund.
* PYRAMIDELLUS Tr. et Sup., Z. (2) . . . . .	Austr.
— PINETELLUS Lin. 358, W., F., Tr., D. . . . .	Europ.
{ Pinella Cl. Conchella H. 38. Virginella Scop.	
— MYELLUS H. 37, Z. . . . .	Alpes.
{ Conchellus Tr., D. pl. 271, fig. 5 b (non a) (non W. nec F.) Pinetella Scop.	
— SPECULELLUS H. verz., Z. (alis). . . . .	Germ. bor.
{ Pinetellus H. 36. Conchellus D. pl. 271, fig. 5 a.	
— MYTILELLUS H. 287, Tr., D. . . . .	Delphinat.
* PAUPERELLUS Tr. p. 401. (non D.). . . . .	Ital., Dalmat.
— STENZIELLUS Tr. Sup., Z. . . . .	Mont Austriae.
{ Var. maculis flavicantibus. (3). . . . .	Alpes.
Pauperellus D. 4387.	
— LUCTIFERELLUS H. 324, Tr., D., Z. . . . .	Helvet.

---

(1) Eximia species, affinissima *Margaritelli*, at verè diversa. Paulò major. Alæ antice fulvo-cervinæ, vitta media longitudinali, subsecuriformi, nivea, margine interno lineolaque insuper tenuissimè albis; simbris plumbeis puncti 4 niveis notata; 3 versus apicem, 1 ad angulum internum; margine terminali intercà punctulis 4 nigris notato. Alæ postice cinereæ, nitidulæ, ciliis albidis. Abdomen cinereum. Thorax, caput, palpi uti in *Margaritello*. — In Burgundia propè Nuits captâ à D° Bruand. — *Pyramidellum* Tr. non vidi, at, quia dicit alas angustiores quam *Margaritelli*, costam albidaam, marginemque internum non albidi, hunc ego diversum credidi.

(2) Vide notam speciei præcedentis.

(3) Varietas certè *Stenzielli* etsi maculæ, margoque interior flavescent. *Pauperellum* Tr. non vidi, at ad hanc varietatem minimè pertinere existimo, dum D. Zeller distinctum esse affirmat.

11

—	RADIELLUS H. 325, Tr., D., Z. . . . . . . . . . .	Alpes.
—	FULCIDELLUS H. 365, Tr., D., Z. . . . . . . . . . .	Alpes.
* AENEO-CILIELLUS Ev. faun. p. 546. . . . . . . . . . .		Ural.
—	{ GUENELLUS D. 1471. . . . . . . . . . .	Angl., Gall. centr.
	Lalistrius Curt.? (4).	
	Leachellus Zck.?	
—	{ PERLELLUS Scop. 620, W., H. 40, Tr., D., Z. (non F.)	Europ.
	Argentella F. (non L.).	
	Var. A. radiis fuscis.	
—	LITHARGYRELLUS H. 227, Tr., D., Z., Ev. . . . .	Hungar., Germ. Russ.
	**	
—	{ SELASELLUS H. 405-406, Tr., D., Ev. (2) . . . . .	P.
	Pratellus Z. (non C.)	
—	{ TRISTELLUS W. b-47, F., Z. (3). . . . . . . . . . .	Europ.
	Ferrugella Thb.	
	Cr. Mærens F. Sup.	
	Aquilella H. 52.	
—	Var. Culmella F. 34, H. 404. (non L. nec W.)	
—	Subvar. Culmella H. 50.	
—	Var. Paleella H. 51.	
—	Var. Pratella W. (non alior.)	

(1) Sub hoc nomine ex Anglia accepi; at genuinum esse Curtisii *Latistrium* vel Zinckenii *Leachetum* affirmare nequeo.

(2) Vide notam Cr. *Pratelli*.

(3) Rarissimæ varietati nomen imposuerunt Theresiani: servandum tamen quia antiquius. Var. *Culmella* F. frequentissimè occurrit. — D. Eversmann in Mem. soc. imp. Mosc. 1842. *Crambus* norum sub nomine *Acutellus* descripsit: at ille in ejus *Fauna Uralensi* omnino abiit. An meram esse *Tristelli* varietatem agnovit?

- DELIELLUS H. 402-403, Tr., Z., D.? . . . . . Germ., Hung.



2

- { *LUTELLUS* W. b-14, Tr., D., Z. . . Austr., Germ., Gall. centr.  
*Ochrella* H. 55.  
{ *♀ Convolutella* W. b-15, H. Verz.  
*Exoletella* H. 48. (non W.)



- { *Pedriolellus* D. 4407, Ga. Ann. soc. . . . *Helvet.*, Gall. occid.  
 { *Spuriellus* H. 474.  
 { *Aridellus* Thb.? Z.

- \* *FASCELINELLUS* H. 368, Tr. (non D.) (1) . . . , Hung., Germ.

卷之三

- PETRIFICELLUS** D. 1406. (non H.) (2), . . . . . Pyren.

基础教育






(1) Sub hoc nomine in museo D<sup>i</sup> Duponchel varietas pallidior *Pedriottielli* versatur. — *Fascellum genuinum* non vidi; sed D. Fischer v. R. speciem esse separatam affirmavit. — Hunc cum precedenti miscuit D. Zeller.

(2) Species eximia, vix cum aliis speciebus hujus sectionis conveniens; at sequentes ad eam transeunt. — Maxima. Alte primores subcineres, nitidae, vitta alba à basi usque ad summam cellulam ducta, nervis tribus albis quadripartita, fuscus, precipue inferne, adumbrata; margine terminali rotundo, punctis 7 fuscis, finibria concolore. Postice albida. — D. Lefebvre in Pyrenæis inventa, et nuper D. Donzel in Pyr. orient. reperiit.

{	COMBINELLUS W. b-3-4, Tr., Z. (non D.) . . . . .	Austr.
	Petrificella H. 47. Var.? <i>Simplonellus</i> D. 1405.	

\*\*\*\*\*

---

—	INQUINATELLUS W. b-10, H. 54, Tr., D., Z. (1). . . . .	P
—	PALUDELLUS H. 452-3, Tr., D., Z. . . . . . . . . . .	Germ.
—	{ CONTAMINELLUS H. 59, Tr., D. (2) . . . . . . . . . . .	?
	{ Exoletella mus. Schiff. W.?	
*	SICULELLUS D. 1408. . . . . . . . . . . . . . . . .	Sicil.
—	{ IMMISTELLUS H. 364 (3). . . . . P., Gall. mer., Dalmat., Turcia. Angulatellus D. Suspectellus Z.	
*	MATRICELLUS Tr., Z. . . . . . . . . . . . . . . . .	Hungar.
	POLIELLUS Tr., D., Z. . . . . . . . . . . . . . . . .	Germ.
—	{ CULMELLUS L. 361, Scop. ? Tr., D., Z. (4). . . . .	Europ.
	{ Straminella H. 49.	

---

(1) Quomodo hæc species tam vulgata Linnaeo et Fabricio incognita transiit?

(2) *Exoletellam* mus. Schiff. hunc esse D. Fischer mihi affirmavit; sed hoc nomen restituere non ausus sum, diagnosis Wien.-Verz. nimis brevi et incerta.

(3) Nemo in Hubneri opere hunc agnovit. D. Zeller *Immistellum* II. *Contaminello* refert, at statura, habitu graphidibus aliquæ ad apicem onusiuò infalcatis hic melius convenire videtur. — D. Duponchel hunc fideliter in pictura expressit. — Ubique ferè inveniri videtur. Apud nos vulgarissimè Septembri et Octobri cum *Contaminello* volat. Fimbriam valde nitentem Hubner omisit.

(4) Quæ sit Wien.-V. *Culmella* hucusque incertum est. Secundum Illiger hæc genuina foret, dum *Straminellam* II. allegat. — Si D. Zeller credas, ad *Tristellam* refertur. — Denique, peritissimus D. Fischer nihil aliud esse quam *Chrysotrichellam* contendit. — Inanis verò hæc disputatio foret, dum inaneum nomen certissimum possidens.



1



SPEC. INC. SEP.

VERELLUS Zck. II, 81, Z.

INCERTELLUS Zck. IV, 253, Z.

**PERMUTATELLUS** Mann.

TERBELLUS Zck. IV, 252.

ACUTANGUELLUS FR.

DECORELLUS Zck. IV, 250, Z.

(1) Auctores recentissimi hunc quasi varietatem *Hortuelli* habuerunt et D. Fischer ab eadem larva obtinuisse affirmavit; experimentum verò rursùs agere non prorsùs inutile foret. — Ille semper colore luteo, linea transversa nunquam plumbea, alis posticis sepiissimè apice dilutiōribus et minus saturatis constanter distinguitur. — In utroque sexus uterque invenitur. Semper verò ambo sinus voltant.

EXIMIELLUS ZCK. IV, 271.

PLEADELLUS Zek. IV, 551.

PRÆFECTELLUS Zck. IV, 249, Z.

PARENTHESELLA Lin. s. n. 384, f. s. 1435.

**GEN. 5. CHOLIUS Gu.**

*Pyralis* W., F., H. *Crambus* Tr., D. *Eudorea* Z.

{ OCHRELLUS W. Pyr. b-28. (*alis*), F. Geom. 383, H. Pyr.  
47, Z. (4). . . . . Silacellus H. 282, Tr., D.

(1) Jam-jam Botys *Ochrealis* existit, nec-non *Tinea Silacella*. Ideo nomen temperandum, ita ut, præterea, cæterorum Crambidorum desinentiam accipiat.

Tribus IV.

## **CHILIDI** Gn.

**GEN. 1. CHILO Zck.**

Tr., D., St., Z.

CICATRICELLUS H. 454, FR. . . . . . . . . .	Germ.
Strigellus Tr.	
Treitschkiella Frey.	
Amplellus Z., H. 300?	

*Phragmites* H. 297-98. Tr., FR., D. (4). . Austr., Germ., Hung.

**GEN. 2. SCHOENOBIUS Dup.**

*Erioproctus* Z., *Chilo* Tr.

{ *FORFICELLUS* Thbg. diss. ent., Tr., FR., St., D., Z. (non Scop.). P.  
*Consortella* H. 220.  
 ♀ *Lanceolella* H. 296.  
*Arbustella* F.?

\* ACUTELLUS Ev. Bin mosc. 1842, Faun. 540. . . . Orenburg.

{ *MUCRONELLUS* Scop. 643, Fr., Tr., D., Z. (2) . . . Germ., Hung.  
 ♀ *Acuminella* H. 284.

GIGANTELLUS W. b-27, F., H. 53, Tr., D., FR., Z. Austr. Hung., Pruss.

(1) *Chilo Paludellus* H. D. ad *Crambus pertinet.*

(2) Quoad *Mucronellam* W. et Fab., vide notam *Cultrella*.

SPEC. INC. SED.

SORDIDELLUS Zck. IV. 427.

---

— GEN. 3. SCIRPOPHAGA Tr.

D., Z.

{ ALBINELLA Cram. 372, D. (1). . . . .	Europ. austral.
Alba H. Bomb. 309-12, Z.	
Dubia Rossi.	
Phantasmella H. 56, Tr., D.	
Var. <i>Grisea</i> Frey. t. 168.	

---

(1) Nomen « *Alba* H. » D. Zeller ut antiquius huic speciei restituit; at non nomen Crameri prius adhuc incedit. — Egregium Crameri opus in *Europaeorum specierum determinatione* prorsus negligitur; at non semper jure. — Sic D<sup>r</sup> Treitschke et Duponchel nuper *Euploc. Aurantiellum* vocaverunt speciem jam à 60 annis in Crameri opere sub nomine *Ophisa* (pl. XIII, C.) illustratam.

Tribus V.

## YPSOLOPHIDI Gn.

**GEN. 4. PTEROXIA Gn.**

*Harpapteryx* Tr., *D.*, *Z.*, *Plutella* St., *Chilo* Curt.



**— GEN. 2. HARPIPTERYX Tr.**

D., (et *Ypsolopha*), *Plutella* Curt., Z.

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| { | SCABRELLA L. 396, F., Tr., Z., Ev. . . . .            | Germ., Gall. occ. |
|   | Bifissella W. (2).                                    |                   |
|   | Pterodactylella H. 102.                               |                   |
| { | NEMORELLA L. 264, Curt., Z. (3). (non F nec H.) . . . | P.                |
|   | Hamella H. 282, Tr., D.                               |                   |
| { | FALCELLA W. b-47, H. 442, Tr., D., Z. . . . .         | Germ.             |
|   | Dorsella et Yps. Dorsatus F.                          |                   |
|   | Subfalcata St.  |                   |

(1) Wies.-Verz. brevissima designatio nos prorsus incertos facit; *Mucronella* Fab. 47 et Cramb. *Mucronatus* Sup. huic conveuire videntur. Sed, absente certitudine, alioque nomine jam usurpatum, nomen *Cultrella* pravalet.

(2) Testibus D. Treits, et Zeller,

(3) *Nemorella Fabricii* ad *Persicellam*, *Stephensii* ad *Cultrellam*, *Hubneri* ad *Lathonictellum* referuntur. — D. Zeller duo species eodeni noniue servat, scilicet hanc et *Crambum Lathonictellum*.

---

—	{ HARPPELLA W. b-50, H. 400, Tr., D., Z., Ev. . . . .	P.
	{ Dentella et Yps. Dentatus F.	
	{ Yps. Harnatus F. (1).	

---

— Gen. 3. YPSOLOPHA Fab.

D., id. et *Harpipteryx* Tr., *Plutella* Curt., Z,

†

---

—	HORRIDELLA Tr., D., Z. (2) . . . . . . . . . . .	Europ.
---	--	--------

---

††

---

	ASPERELLA L. 397, W., F., H. 401-329, Tr., D., Z. . . . .	P.
--	---	----

---

---

—	{ PERSICELLA W. b-46-47, F., H. 400, Tr., D., Z. . . . .	Europ.
	{ Nemorella et Nemorum F.	

---

†††

---

	{ ALPELLA W. b-24, F., Tr., Z. . . . . . . . . . .	Alp.
	{ Yps. Alpinus F.	

---

---

—	{ ANTENNELLA W. b-19, Tr., D., Z.. Ev. (non F.) . . . . .	Germ.
	{ Lucella et Lucorum F.	
	{ Mucronella H. 99, Curt. (non alior.)	

---

(1) Hanc jam sub nomine *Harpella* cognitam in Al. *Dentellam* Fabricius mutavit, imò et postea eamdem in Museo D. Clairville, prioris immemor, rursùs sub tertio nomine, scilicet *Yps. Harnatus*, instituit. Larvæ designatio eamdem esse omnino probat.

(2) Egregia species ab aliis hujus generis diversa palpis, antennis ad medium usque pilosociliatis, larvaque gregaria. Fornàn genus separatum alii instituant. — Larva illius, *Harpella* affinis, luteò flavo-viridis, linea vasculari duabusque subdorsalibus citrinis, punctis ordinariis minutis, flavo-cinctis, pilo brevi sed rudi instructis, capite globuloso viridi-pallescente, spiraculis flavis, sub tela communi *Prunos spinosas*, *Oxyacanthasque* mense Junio vorat. Folliculum scaphiforme, album, carina sepè arcuata, apicibusque lateraliter depresso. Imago volat Julio.

{	SYVELLA L. 413, F., H. 420, Tr., D., Z., Ev. . . . .	Europ.
	Sylvarum F. Sup.	
	Var. immaculata.	

— GEN. 4. HYPOLEPIA Gn.

*Rhinosa* Tr., D., *Plutella* Z.

{	COSTELLA F. Al. 23, H. 107, Tr., Z., Ev. . . . .	Europ.
	Fissella ♀ D. pl. 293, f. 7.	
	Var. { Maculella et Yps. Maculatus F.	
	Costella D. pl. 292. f. 6.	

{	FISSELLA H. 408 et text. Tr., D., Z., Ev. (1). . . . .	Europ.
	Caudella L. 417?, F.?	
	Var. Unitella Tr. (non H.)	
	Var. Byssinella H. 380.	
	Var. Variella H. 406. (non alior.)	
	Var. Fulvella D. 1533 (non F.)	

*	ADSECLELLA Ev. faun. p. 574. . . . . . . . . . .	Ural.
---	--	-------

{	VITTELLA Lin. 382, Cl., W., F., H. 349, D., Z. (2) .	Europ.
	Sisymbrella Tr. (3) Ev.	
	Var. Vittella H. 164.	
	Var. Carbonella H. 424.	
	Var.? Ustella L. 383, Cl., Vill. (4).	

(1) Haec in Tineis, sicut et *Proteana* in Tortricibus, innumerabili colorum variatione innumerabiles errores sollicitat. Verissime ego loquar si dicam me hanc speciem sub 30 saltēm variis nominibus accepisse. — *Caudella* Lin. et Fab. vel hic vel ad aliquam *Palpalum* pertinet, verbis : « palpi suprā basin aristati » probantibus. Sub aliis quoque nominibus apud veteres auctores hanc invenire sperabam; sed nec in Linneo, nec in Scopolio, nec in Fabricio reperire potui. — *Lutarella* H. 168 habitu, alarum forma, punctoquo aliis posito non huic speciei pertinere mihi videtur.

(2) Linneus scribit : *Vitella*; sed inconcinniter. Non verò in Vite insectum vivit nec reperitur, sed *Vitta* prædictum est. Clerck rectum scribendi modum restituit.

---

$\left\{ \begin{array}{l} \text{PUSIELLA L. 347, F. (non alior.) (1).} \\ \text{Sequella Cl., H. 403, D., Z.} \\ \text{(Nyctemerella W., F.} \end{array} \right.$	Europ.
$* \text{ LEUCOPHÆLLA Z. p. 188.}$	Austr.

---

(3) An illa sit genuina W. *Sisymbrella* querere proorsus inutile est, dum Linnaeum nomen existit.

(4) Species adhuc obscura. *Vitellæ* varietatem pictura Clerkii summo jure indicare posset; sed Lin. (F. S. 1434) antennas corpore dimidio breviores, alarumque marginem exteriorem latum longitudinaliter cinereum dicit. Tunc Villers aliam adhuc speciem vidisse videtur, verbis sequentibus « minor imagine Clerkii, aliterque picta, nam lineæ nigrae tenuiores in parte cinerea sunt, » sed à nigredine alæ separatae. » — Lux veniat. — Noli hanc cum *Ustulella* vel *Ustolella* auctorum permiscere.

(1) Hoc nomen servare nemini in religione fuit. — Scopoli speciei gen. *OEchmia* applicavit. — Villers Aed. *Echiella* dedit. — Godart et Duponchel Aed. *Lithospermella* transtulerunt. — Clerk genuinam *Pusicella* sub nomine *Sequella* pinxit, omnesque ferè auctores secuti sunt. — Wien.-Verz. novum quoque nomen impostrit scilicet: *Nyctemerella*. — Fabricius, ut Linnaeum Theresianosque conciliaret, bis unam speciem dedit, nominaque utraque amplexus est.

## Tribus VI.

### PLUTELLIDI Gn.

---

#### GEN. 1. CHERSIS Gn.

- TAURIDELLA Gn. (1) . . . . . Tauria.
- 

#### GEN. 2. PLUTELLA Tr.

Z., *Alucita* Latr. (non Z.) *Alucita* et *OEcophora* D.

-  { XYLOSTELLA L. 389, W., F., H. 449, Geoff., Tr., D., Z.      Europ.  
Yps. Xylostei F.  
Var. absque vitta dorsali.

- IMMACULICORNELLA Gn. (2). . . . . Lappon. merid.

- \* HUFNAGELIELLA Z. p. 488. . . . . Europ austr.
- 

(1) Exemplar unicum à D<sup>o</sup> Boisduval è Tauria acceptum, antennis palpisque carens; Ideò hoc genus incerte sedis adhuc dicendum est, licet Plutellarum affine primo conspectu videatur. Hi verò characteres supersunt: Oculi prominentes. Vertex bicomosum. Abdomen alis longius, pilis terminatum. Pedes longi. Alae valde oblongæ, tenellæ, antice lanceolatae, ochroleuco-albidæ, hue et illù pulvératæ, vitta obsoleta obscuriore à basi ad apicem currente, hunc verò non tangente, maculis tribus obscurioribus ad apicem costa obsoletis, margine interno basi albido, fimbria longa, albida, linea obscuriore versùs marginem alte divisa. Alae postice semi-diaphanæ, albicanter, sericeæ, squamulis (oculo armato) pilosulis, fimbria, præsertim ad anum, longiore.  
— In Tauria D. Steven invenit.

(2) Statura habitusque *Xylostella* cui simillima; sed antennis longioribus, palpis gracilioribus, vitta dorsali incurva ad basin et versùs humerum adscendente, punctisque marginalibus distincta. — Alæ antice fuscæ, costa basi albida, nigro punctulata; marginè terminali latè albido, punctis quatuor magnis, confluentibus, antè fimbriam notato; vittaque dorsali albida, bidentata, colore nigriore limbata. Alæ postice cinereæ, fimbriis concoloribus, longis. — Invenitur in Lapponia meridionali. Unicum teneo specimen.

GEN. 3. SPANIA Gn.

- MESSINGIELLA FR. p. 193. . . . . . . . . . Hung., Meckl.

(1) Haec palpis ad Rhinosias accedere, habitu verò ad OEcophoras pertinere D. Duponchel contendit, sed prorsùs immeritò. Palpis, habitu, et omnibus reliquis planè ad hoc genus pertinet, *Xylotella*que affinis est. — Bicingulatam D<sup>r</sup> Zeller eamdem esse putabam; at descripsione patriaque non convenienti.

## Tribus VII.

### YPONOMEUTIDI St.

---

#### — GEN. 1. CHALYBE D.

*Yponomeuta* Tr., *Psecadia* Z.

- 
- { **PYRAUSTELLA** Pallas. 8 p. 181, H., Bomb. 260, D.,  
Z. . . . . Russ. mer., Ital., Gall. mer.  
Aurisluella H. 302, Tr., Ev.

**FLAVIANELLA** Tr. IX, p. 228, FR., Z., Ev. . . . Hungar., Ural.

---

#### — GEN. 2. AEDIA D.

*Erminea* Curt., *Melanoleuca* St., *Psecadia* Z., *Yponomeuta*  
Tr., God., Lat.

- 
- { **ECHIELLA** W. c-54, H. 105, Tr., God., D., Z., Ev. . . . . P.  
Bipunctella F. (Aluc.) Vill.  
Pusiella Vill. (1).  
Hochenwartiella Rossi.

\* **HÆMORRHOIDELLA** Ev. faun. p. 565 . . . . . Volga infer.

- 
- { **LITHOSPERMELLA** H. 404, Tr., Ev. . . . . Gall. mer.  
• Sequella W. (non Lin.) (2).  
Pusiella God., St., D. (non Lin.)  
Scalella Z. (non Scop.)

---

(1) Vill. duas habet *Pusiellas* quarum neutra genuina est. Mirum sanè, dūm verba Linnæi omnino, ut solet, transcribit; sed huic (nº 839) observationem propriam addit qua illum *Echielam* solam vidiisse probatur.

(2) Nominis sepiùs mutavit, nam semper auctor allegatus non concordat. — *Sequellam* Linnæi non esse verba plura et præstigium: *linea communis*, *vitta dorsalis*, Clerckiique picture allegatio

SEX-PUNCTELLA H. 304, Tr., D., Z. (non F.). . . . .	Germ., Gall. centr.
* STRAMENTELLA Ev. faun. p. 566. . . . .	Ural.
* QUADRIPUNCTELLA Ev. faun. p. 566. (1) . . . . .	Ural.
— FUNERELLA F. 98 et Sup., H. 85, Tr., God., D., Z. . . . .	P.
{ DECEM-GUTTELLA H. 303, Tr., D., Z., Frey. (non F.) . . . . .	P.
{ Dodecea St., Curt.	

— GEN. 3. YPONOMEUTA Latr.

God., Tr., St., D., Z.

SEDELLA Tr. IX, p. 223, D., Z. . . . .	Germ.
PLUMBELLA W. c-34, F., H. 86, Tr., D., Z. . . . .	P.
{ PADELLA L. 354, Scop., W., F., H. 393-4, Tr., D., Z., Ratz. . . . .	Europ.
{ Agnatella FR. in litt. (2).	
{ Var. A. tota plumbea.	
{ Var. B. (3).	
{ Var.? Malivorella Gn. (4). . . . .	Gall. centr.

demonstrant. — *Pasiellam* ejusdem auctoris verba : « *inferioribus nigris* » esse negant. — *Scalellam* Scop<sup>l</sup> non esse magnitudo indicata (2 lin.) omnino probat. — Ideò nomen Hubnerianum nisi antiquius tempore, certitudine tamen prius accepi.

(1) An generi præcedenti pertinet?

(2) Speciebus pluribus hujus generis nomina à veteris auctoribus indita sunt larvarum populis contraria. *Eonymella* enim Pado, *Cognatella* *Eonymo*, *Padella* *Pruuo* vescuntur. Indè D<sup>o</sup> Fischer v. R. et D<sup>o</sup> Von Heyden, entomologo Franco furtensi consilium venit has appellations ad veritatem reducendi. *Eonymella* igitur nomen : *Padella*, *Cognatella* nomen : *Eonymella*, *Padella*que nomen novum scilicet : *Agnatella* imposuerunt et in museos sic diffuderunt. Ego quoque rem esse incommodam non nego, sed remedium incommodius censeo, (vid. Introd. hujus operis). — Cæterū ne quis in errorem iudicatur, specierum cognitu difficultum characteres,

IRROBELLA H. 93, Tr., St., D., Z. . . . . Hung., Pruss.

{ RORELLA H. 234, D. (4). . . . . Gall. centr. et mer.  
Helicella Frey.

— { COGNATELLA H. verz., Tr.?, Z., Ratz., Ev. (2) . . . . . Europ.  
Cagnagella H. 391-2.  
Evonymella Scop.  
Padella God. H. 87.

— MAHALEBELLA Gn. (3). . . . . . . . . . . P.

larvarum mores, pabulum, puparumque differentias hic breviter scribam. (*Sedellam, Plumbeam, Evonymellamque* omitto quia nullo modo permisci possunt.)

PADELLA. — Larva murina, holosericea, punctis ordinariis maculaque subdorsali puncto laterali adnata nigris, gregatim in *Pruno spinosa* vitam degit, ubique vulgaris, mense Maio. — Pupa aggregata, nigra, segmentis 6 1/2 abdominis rufo-flavis, oculis stigmatibusque nigris. — Imago valde variat, mediæ magnitudinis, rarissimè omnino alba, sepiissimè plus minusve plumbea, præsertim in disco et in apice. Alæ posticæ nigro-cinereæ, fimbria concolor.

(3) Larva saturatior, societate minori vivens, in *Crataego oxyacantha*. — Pupa simillima, confertim aggregata. — Imago non differt.

(4) Species verisimiliter distincta; at hoc anno solum eduxi, experimentumque iterandum antea separationem. Larva vix à Padella differt; at in *Malis* vivit, ut *Malinella*, sed societate multò minor et præcipue in extremis ramusculis. Pupa lutea, thorace, capite, ano, lingue pedumque (sed minimè alarum) vagina nigra; stigmatibus rufis. — Imago: Alæ antice albae, apice, maculaque discoidali omnino separata, griseis, vix distinctis; punctis minutissimis nigris. — Alæ posticæ ut in Padella. Propè Castrodunum inveni.

(1) Larva vivit in *Salice alba*, summis ramusculis gregatim insedens, tentorio sat laxo; apud nos certis annis haud rara. Imago invariabilis, major Padella. alba, tenuiter nigro punctulata, maculæ duabus superioribus plumbeis, connatis, altera longitudinali maxima, altera apicali minori, costa semper à medio nivea; alæ posticæ nigro-cinereæ, ciliis concoloribus ad extimum albo coloratis. — Rorella Treitschii non genuina est.

(2) Larva vitam degit in *Eonymo europeo*, exigue consociata, (sepè 2, 3, 6 exemplaribus) vulgaris ubique *Evonymi* virescunt. Imago invariabilis, maxima, semper nivea, punctata, sed immaculata; alæ posticæ nigro-cinereæ, fimbriis albis, sed ad marginem analem semper cinereo mixtis. — Omnes fere autores hanc speciem cum duabus sequentibus permiscerunt præsertim Treitschke et Godart. D. Duponchel hanc in picturis dedit; sed in libro larvam miscet inconciuimenter que describit. — Hubneri picturæ antea omnes fidas, fimbria posticarum excepta. Nomen Cagnagella ipse mutavit.

(3) Larva vivit Junio in *Ceraso mahaleb* densa numerosaque calcea associata, semper albido-

SPEC. INC. SEP.

**RUFIMITRELLA** Z. p. 194. (non W. nec H.)

**GEN. 4. PEPILLA Gn. (3)**

Aedia D., OEcophora Z.

*subvirescens, segmentis primis sulphureis, linea vasculari vix expressa, macula subdorsali omnino  
orbiculata, ab omnibus punctis ordinariis nitidè separata; cæterò ut in aliis. Imago Cognatæ  
simillima et vix distinguenda, nisi fortè punctis paulò cæbrerioribus et crassioribus, fimbriisque  
alarum posticarum magis alba, minus rarijuscè ad annum griseo tincta. — Hanc ego detexi circè  
Enghien, propè Parisios.*

(1) Larva *Malo communis* vicitat, densissimo agmine conglomerata; apud nos pestis in certis annis funestissima, diebus nebulosis prementibus copiosor; indè agricole à nebula ortani credunt. Imago *Cognatella* similis et ferè indistinguenda, nisi statura minore, simbriaque alarum posticarum ferè omniù infuscata.

(2) Larva, in *Pado vulgaris* vitam degit, densa caterva et omnium, post *Malinellam*, numerosissima. Pupa ex toto nigra, immo quoque punctulis numerosissimis irrorata errorem omnem excludunt. Circè Parisios et in Germania vulgaris: Castrodiuni verò, licet 16 solū myriam<sup>ii</sup> à Parisis distante, prorsus aliena.

Plures sānē in hoc genere species detegendae supersunt. Querantur igitur larvæ et his accuratissimè studeantur. Uno frequentiū pabulo vicitant. Imaginum similitudo fastidium non moveat: magnitudo, color, maculæ, simbris posticarum, tempus volandi, etc. absentibus aliis, tibi inservient; punctorum verò numero et dispositioni ne ultrà bonum fide. Cave tandem ne tu lefallant oculi, speciesque inutiliter angere noli. • Inter utrumque tene. •

(3) Genus sedis incertissimæ, donec larva latebit.

FINIS PRIMÆ PARTIS.



**14 DAY USE**

**RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED**

# ENTOMOLOGY LIBRARY

**This book is due on the last date stamped below, or  
on the date to which renewed.  
Renewed books are subject to immediate recall.**

MAY 31 '89

**LD 21-40m-10,'65**  
**(F7763s10)476**

General Library  
University of California  
Berkeley

U.C. BERKELEY LIBRARIES



CO37126314

