

Références

Fuente y Morales (J. M.) de la, 1920. – Catalogo sistematico-geografico de los coleopteros observados en la peninsula ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomologica de España*, **3** : 321-330 (Alleculidae).

Novak (V.) & Pettersson (R.), 2008. – Family Tenebrionidae Latreille, 1802, subfamily Alleculinae Laporte, 1840 : 319-339. In : Löbl (I.) & Smetana (A.) (ed.) – Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 5 : Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 p.

Seidlitz (G.), 1896. – Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Erste Abtheilung. Coleoptera. Fünfter Band. Zweite Hälfte. Erste Lieferung. Bogen 1 bis 19. Nicolaische Verlags-Buchhandlung, R. Stricker, Berlin, 304 p.

Soldati (F.), 2002. – Les Coléoptères des milieux ouverts de la Réserve Naturelle de Jujols (Pyrénées-Orientales) et de ses environs immédiats. Rapport d'étude OPIE-LR, Millas, 33 p.

Soldati (F.) & Bouyon (H.), 2006. – *Megischina rosinae* (Seidlitz, 1896) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae), genre et espèce nouveaux pour la faune de France. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, **75** (2) : 61-65.

Xambeu (L.), 1901. – *Notes explicatives du Catalogue de la faune des environs de Ria*. Imprimerie des établissements Auclair, Moulins, 214 p.

(*) Office National des Forêts (ONF),
Laboratoire National d'Entomologie Forestière,
2 rue Charles Péguy, F-11500 **Quillan**
fabien.soldati@onf.fr et guillem.parmain@onf.fr

(**) Institut national de Recherches en Sciences et Technologies
pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA),
Unité de recherche « Ecosystèmes forestiers »,
Domaine des Barres, F-45290 **Nogent-sur-Vernisson**
guilhem.parmain@irstea.fr

R.A.R.E., T. XXII (1), 2013 : 16.

Pasiphila chloerata Mabilbe dans le sud de la France

(Lepidoptera, Geometridae)

par Terence HOLLINGWORTH*

L'attention récemment portée à ce petit géomètre, dans le précédent fascicule de RARE, m'incite à faire connaître les localités où je l'ai rencontré.

ARIÈGE

Foix en 1996 ;

Boussenac, à l'ouest sud-ouest de Foix, en 1997.

HAUTE-GARONNE

Blagnac, en 1991 et 1999 ;

Sauveterre en Comminges, en 1992, 1996 et 1997 ;

Galié, au sud de Barbazan, en 2002, 2005 et 2007 ;

Thil-sur-Save en 1991.

HERAULT.

St-Maurice-Navacelles, au nord-est de Lodève.

Sa présence dans le département de l'Hérault montre que l'espèce n'est pas confinée à la chaîne des Pyrénées mais qu'elle doit se trouver dans d'autres localités du sud de la France probablement en continuité avec son peuplement général en Europe.

De manière plus générale, *Pasiphila chloerata* doit être moins rare qu'il y paraît et simplement assez difficile à reconnaître.

N.D.L.R.

Toujours à propos de *P. chloerata*, Lionel Taurand a eu l'amabilité de nous transmettre ses dernières observations : « J'ai aussi trouvé cette espèce en plaine dans le Sud-Ouest d'où, à ma connaissance, elle n'a pas été citée.

Une femelle à Grisolles (Tarn-et-Garonne) le 25-V-2006.

Un mâle à Pibrac (Haute-Garonne), forêt de Bouconne, le 11-VI-2009. »

En quelque sorte, il suffit de s'intéresser particulièrement à une espèce pour qu'elle devienne rapidement commune ?

* 6, impasse F. Chopin, F-31700 **Blagnac**