

SOMMAIRE

---:---:---:---:---

J-M. DESSE. Editorial.	52
E. DROUET. Quelques localités nouvelles pour la répartition de trois névroptères français. [Nevr. <i>Ascalaphidae</i> L.]	53
Y. CHAILLOUS, J. PRIEUR, J-M DESSE. Sortie carabologique à travers la France, juin 1986.	56
B. LAMBERT & L. RENTIEN. Un spécimen atypique de <i>minois dryas</i> . [Lep. <i>satyridae</i> ].	59
P. BIRONNEAU. <i>Spialia sertorius</i> Hoff. dans le Baugeois (M. & L.) [Lep. <i>hesperidae</i> ].	60
B. LAMBERT. Nouvelles captures d' <i>anomis erosa</i> [Lep. <i>Noctuidae</i> - <i>Ophiderinae</i> ].	61
L. RENTIEN. Un élevage de <i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffer) [Lep. <i>Saturniidae</i> ].	62
B. LAMBERT. Notes de chasse. [Lep. <i>Rhopalocera</i> ].	65
L. GAGNIE, J. PRIEUR, P. BIRONNEAU, J-M DESSE. Compte rendu d'une sortie entomologique dans le sud pyrénéen et le nord-est espagnol. [Lepidoptères].	66
E. DROUET. Une nouvelle localité de <i>Polyommatus thersites</i> Cantener dans les Deux Sèvres. [Lep. <i>Lycaenidae</i> ].	69
B. LAMBERT. <i>Chazara briseis</i> (Linné) espèce nouvelle pour l'Indre-et Loire [Lep. <i>satyridae</i> ].	72

---:---:---:---:---



# BULLETIN ENTOMOLOGIQUE DE L'ANJOU

BASSE VALLEE DE LA LOIRE

TOME 2

1987

FASC. 4



## NOUVELLE CAPTURE D'ANOMIS EROSA Boisd.

[ LEP. NOCTUIDAE OPHIDERINAE ]

par Bruno LAMBERT

Depuis la découverte en 1980 d'*Anomis erosa* (LAMBERT, 1984, Bull. Anjou Touraine 1 (1) : 3.) qui parasitait des cultures d'Hibiscus aux Ponts-de-Cé, (M. & L.), j'avais pu observer l'insecte dans la nature en 1982 et 83. Supposant alors une possible acclimatation dans notre région grâce à deux Malvacées fort communes dans nos campagnes, je ne pouvais jusqu'alors affirmer si les quelques spécimens observés étaient issus de générations ayant survécu à l'hiver.

Le 27 mai 85 en inspectant une friche à *Malva sylvestris* des environs de Trélazé, je récoltais au repos sous une feuille de mauve, un ♂ d'*Anomis erosa*. Aucune importation d'Hibiscus n'ayant eu lieu depuis l'été 84, il faut bien admettre que l'espèce a résisté à notre hiver pourtant si rude cette année (jusqu'à  $-18^{\circ}$  aux Ponts-de-Cé).

A noter qu'il s'avère que l'établissement horticole qui est à l'origine de cette introduction accidentelle n'est pas le seul à importer des Hibiscus d'Afrique. Cette pratique est également utilisée sur la Côte d'Azur. D'autres surprises sont donc à prévoir...

B.L., 46 rue de Salpinte, 49000 ANGERS.

Chenille et dégâts  
échelle x 3

