OBSERVATIONS SUR *THAUMETOPOEA PROCESSIONEA* L.

Le 11 septembre 1920, en cherchant, dans la forêt de Quimperlé des insectes, et notamment, le *Carabus intricatus*, qui n'y est pas rare, sous les vastes plaques de mousse qui couvrent le bas des vieux troncs, j'ai trouvé une quinzaine de cocons encore pleins, qui m'ont paru être des processionnaires du chêne (*Thaumetopoea processionea* L.). Les démangeaisons caractéristiques, ressenties dans la soirée ont achevé de lever le peu de doutes qui pouvaient me rester sur leur identité.

Tous ces cocons m'ont donné leurs Papillons, fin de juin, commencement de juillet 1921.

Dans mon pays (département de l'Aisne), j'ai toujours vu les processionnaires se transformer vers la fin du printemps et donner leur Papillon pendant l'été de la même année. C'est, je crois, ce qu'indiquent la plupart des auteurs. J'ai donc été assez surpris de voir ce Papillon hiverner à l'état de chrysalide.

Cette observation unique n'est, d'ailleurs, évidemment pas suffisante pour permettre d'affirmer que ce soit la règle en Bretagne.

Le processionnaire du chêne n'est pas mentionné dans l'excellent *Catalogue de Lépidoptères du Morbihan*, publié par M. l'abbé de Joannis. La forêt de Quimperlé, comme son nom l'indique, est dans le Finistère, mais en bordure de la Laita, qui forme la limite des deux départements. Il n'est donc pas improbable que ce *Bombyx* puisse se rencontrer au moins dans la partie ouest du Morbihan.

L. de Larminat,
Lorient (Morbihan).

NOTE RECTIFICATIVE

A la suite d'un échange de correspondances, provoqué par ma note sur les Bonnes localités des environs de Caen, M. le colonel Dattin, de Nantes, a bien voulu accepter de reviser les exem-