

l'avons pas rencontrée très souvent, en général par individus isolés :

- Curienne, la Roche (la Paraie), 700-800 m, 12-VII-1973 (Vigneron) ;
- Aix-les-Bains, en ville, 1896 [AGASSIZ, 1897] ;
- Aiguebelette, 3-VI-1973 [DESCOMBES, 2001] ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte-Anne, 730 m, 4-VI-2003 (MS) ;
- Hermillon, stade, 550 m, 28-VI-2003 (MS) ;
- Fontcouverte, la Martinette, 700 m, 30-VI-2003 (MS) ;
- Le Châtel, Rieu Salomon, 730 m, 28-VI-2003 (MS) ;
- École, les Landagnes, 700 m, 24-VI-2003 (PhF).

4911. *Opigena polygona*

Eurasiatique montagnarde qui vole en fin d'été. Elle n'est pourtant pas signalée à notre connaissance de Haute-Savoie, très peu de l'Isère et encore assez peu de Savoie :

- Termignon, 11-IX-1982 (*leg.* POUGET, coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Bramans, 1200 m, 18-IX-1982 (*leg.* POUGET, coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Aussois, 1200-1500 m, 1972-1974 [BOURGOGNE, 1975] ;
- Villarodin-Bourget, chapelle, 1150 m, 11-IX-1992 [DESCOMBES, 2001] ;
- Sollières-Sardières, route du Crêt, 1545 m, 28-IX-2009 ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 7-VIII-1991, 20-VIII-1992, 25-VII-2003, 23-IX-2004, 15-IX-2005, 26-VII-2007 (MS).

4938. *Rhyacia lucipeta*

Cette grande espèce méditerranéo-asiatique n'était encore signalée que par Fernand Borde au col des Aravis, en limite Savoie/Haute-Savoie. Il n'est pas impossible que les individus isolés observés soient des migrants.

- Doucy-en-Bauges, Charbonnet, 1800 m, 2-IX-2005 (PhF) ;
- Arvillard, refuge de la Perrière, 1830 m, 25-VIII-2008 (PhF).

4939. *Rhyacia simulans*

Eurasiatique a priori répandue, mais qui semble en net recul dans ses biotopes thermophiles préférés. Très peu vue en Savoie :

- Vions (Chautagne), 230 m, 1-X-1971 (coll. Borde, muséum de Chambéry) ;
- Doucy-en-Bauges, Charbonnet, 1850 m, 6-X-2006 (PhF) ;
- Entremont-le-Vieux, col de l'Alpette, 1545 m, 20-VI-2008 (PhF).

5010. *Heliothis ononis*

Petite noctuelle au vol diurne, qui semble très localisée :

- Pralognan, le Laitet, 1900 m, 4-VII-1970 (BOURGOGNE) ;
- Apremont, col du Granier, 1200 m, 23-VI-1984 (Mothiron) ;
- Beaufort, lac de Saint-Guérin, 1560 m, 27-VI-1985 (Mothiron) ;
- Val d'Isère, 1900 m, 21-VI-1985 (Mothiron) ;
- Peisey-Nancroix, Rosuel, 1550 m, 26-VI-1985 (Mothiron) ;
- 1600 m, 21-VI-2004 et 16-VI-2005 (PhF) ;
- Lanslevillard, le Collet, 1750 m, 11-VI-2006 (MS).

Remerciements

Merci à tous nos informateurs des inventaires savoyard et rhône-alpin qui alimentent très régulièrement nos fichiers, plus particulièrement ceux cités dans le texte. Une mention particulière à André Pouget, Jean-Paul Descombes, Gérard Manzoni et aux fidèles amis Jean Bréard et Marc Nicolle. ■

Bibliographie

- AGASSIZ (G.), 1897. – Notice sur la chasse aux papillons nocturnes autour des lampes électriques à Aix-les-Bains, Savoie. *Mittl. Schweiz. Ent. Ges.*, **9** (10) : 443-450.
- BOURGOGNE (J.), 1973. – Premier inventaire des Macrolépidoptères et Pyralides du Parc National de la Vanoise. *Trav. Sci. Parc Nat. Vanoise*, **3** : 115-131.
- BOURGOGNE (J.), 1975. – Supplément à l'inventaire des Macrolépidoptères et Pyralides du Parc National de la Vanoise. *Trav. Sci. Parc Nat. Vanoise*, **6** : 175-181.
- DESCOMBES (J.-P.) & POUGET (A.), 2001. – Noctuidae Sapaudiae. Liste provisoire des noctuelles de Savoie (Lepidoptera, Noctuidae). *R.A.R.E.*, **10** (2) : 43-63.
- DUFAY (CL.), 1967. – *Panthea coenobita* Esp. dans le Jura français (Lep. Noctuidae Pantheinae). *Alexanor*, **5** (3) : 133-135.
- DUFAY (CL.), 1979. – Les lépidoptères des marais de Chautagne. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, **48** (10) : 589-605.
- HELLMANN (F.), BROCKMANN (E.) & KRISTALL (P.-M.), 1999. – I Macrolepidoteri della Valle d'Aosta. Monografie 2. *Museo Regionale di Scienze Naturali St Pierre Valle d'Aosta*.
- HELLMANN (F.) & BERTACCINI (E.), 2004. – I Macrolepidoteri della Valle di Susa. Monografie XL. *Museo Regionale di Scienze Naturali Regione Piemonte*.
- LERAUT (P.), 1997. – Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). Supplément hors série à *Alexanor*. 526 p.
- LHOMME (L.), 1923-1935. – Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. 1, Macrolépidoptères, 800 p. Léon Lhomme édit. Le Carriol, par Douelle (Lot).
- MARTIN (R.) & REHFOUS (M.), 1958. – Catalogue des lépidoptères de la région de Genève (Macrolépidoptères). *Soc. Ent. de Genève* : 22 p.
- SAVOUREY (M.), 2002. – Premier inventaire des Noctuelles du département de la Savoie (Lep. Noctuidae). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, **71** (10) : 390-404.
- SAVOUREY (M.), 2002. – Visite improvisée au marais de Montfort à Crolles (38). *Rosalie*, **18** : 25-26.
- SAVOUREY (M.), 2002. – Premier complément à l'inventaire de lépidoptères de la réserve du Luitel (38). *Rosalie*, **18** : 27.
- SAVOUREY (M.), 2004. – Premier inventaire des Noctuelles du département de la Savoie (Lep. Noctuidae). Errata et premier complément. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, **73** (9) : 364-368.
- TEOBALDELLI (A.), 1979. – Lépidoptères capturés en Val d'Aoste (suite et fin). *Alexanor*, **11** (4) : 145-152.
- TOUCHON (R.), 1958. – Liste des Noctuelles capturées dans la cluse de Grenoble de 1920 à 1957. *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, **27** (6) : 162-178.

M.S. : 481, avenue Samuel-Pasquier
F-73300 Saint-Jean-de-Maurienne
savourey73@orange.fr
Ph.F. : Véniper F-73100 Trévisignin
ph.francoz.lépidos@orange.fr

Deux nouvelles plantes-hôtes du Damier de la succise (*Euphydryas aurinia* Rott.)

(Lep. Nymphalidae)

JACQUES-HENRI LEPRINCE

Nous réalisons chaque année, par convention avec la société CEMEX, le suivi d'une population de Damier de la succise située près d'une carrière, sur les coteaux calcaires de la vallée du Rhône (Châteaubourg, Ardèche). Les milieux fréquentés par le Damier sont des pelouses calcaires à forte affinité méditerranéenne, et la plante-hôte du Damier de la succise est ici la Céphalaire à fleurs blanches (*Cephalaria leucantha*), en limite nord de répartition. Le 28 juillet 2009, nous avons eu la surprise de découvrir des nids de chenilles de Damier de la succise sur deux autres espèces un peu surprenantes : un pied de Buis (*Buxus sempervirens*, famille des *Buxaceae*) et deux pieds de Panicaud des champs (*Eryngium campestre*, famille des *Apiaceae*) sur deux stations éloignées. Les plantes-hôtes du Damier de la succise régulières ou plus exceptionnelles connues appartiennent toutes majoritairement à la famille des *Caprifoliaceae* (selon APGIII) : *Succisa pratensis*, *Cephalaria leucantha*, *Lonicera* spp., *Valeriana* spp., *Centranthus* spp. Ces observations ont été réalisées dans deux zones à densité importante de Céphalaire à fleurs blanches et de nids de chenilles.

Chenilles d'*Euphydryas aurinia* sur *Buxus sempervirens*. © J.-H. LEPRINCE.



FRAPNA Ardèche 07110 Largentière
expertise-ardeche@frapna.org