

Sur les ravages exercés par *Pygaera anastomosis* L. [Lép.], dans
les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube

Paul Alfred Marchal

Citer ce document / Cite this document :

Marchal Paul Alfred. Sur les ravages exercés par *Pygaera anastomosis* L. [Lép.], dans les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 2 (14), 1897. p. 235;

doi : <https://doi.org/10.3406/bsef.1897.22088>

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088

Fichier pdf généré le 09/11/2021

**Sur les ravages exercés par *Pygaera anastomosis* L. [LÉP.]
dans les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube**

Par le D^r PAUL MARCHAL.

Le *Pygaera* (*Clostera*) *anastomosis* fait depuis deux ans de grands ravages dans les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube, dans le département de la Marne. D'après un de mes correspondants, en moins de 15 jours pendant l'été de 1896, sur une étendue de plus d'un kilomètre, à Vouarces, par Anglure (Marne), tous les arbres sans exception, avaient perdu leurs feuilles, et, à les voir ainsi dénudés, on se serait cru en plein hiver. Un certain nombre de ces arbres ainsi éprouvés ont péri et on n'est pas sans crainte sur le sort réservé aux belles plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube.

Ajoutons que ce n'est pas la première fois que le *Pygaera anastomosis* se multiplie d'une façon exagérée, au point de se montrer sérieusement nuisible. Boisduval, Malapert, G. Fallou ont déjà signalé des invasions analogues (Voir *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1870, p. VIII; 1879, p. c.; et Maurice Girard, *Traité d'Entomologie*, p. 453).

En Allemagne, elle fit de grands ravages aux environs de Berlin en 1875 (Altum. *Forstzoologie, Schmetterlinge*, p. 54).

**Descriptions de deux espèces nouvelles
de Bostrychides algériens [COL.]**

Par P. LESNE.

Les deux espèces suivantes font partie d'une série de Coléoptères récoltés dans le sud du département de Constantine par M. le D^r Carbonnier, médecin aide-major de la division de Constantine, et communiqués par M. le D^r Normand, médecin aide-major aux hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

Apate Carbonnieri n. sp. (♂). — Allongé, subparallèle, un peu déprimé, brun roussâtre. Antennes de dix articles. Prothorax notablement élargi en avant, graduellement rétréci vers le bord postérieur qui est de la largeur de la base des élytres; aire postérieure du pronotum fortement et densément ponctuée au milieu, chaque point enfoncé large, formant une dépression circulaire et donnant naissance à un poil très court, couché. Élytres plus étroits que le prothorax, légèrement élargis en arrière, conjointement angulés en ogive au bord apical, couverts d'une ponctuation grossière, serrée; suture carini-