

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES HESPÉRIDES
DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE
'LEP. HESPERIIDAE'

par Roger MÉTAYE

Aux 14 espèces d'Hespérides citées par JOURDHEUILLE (1883 : 28-29), il convient d'ajouter Carcharodus lavatherae dont j'ai parlé récemment dans ce même Bulletin (Tome 4, p. 90 et 141). Mais des 15 espèces ainsi observées dans le département de l'Aube, il en est 6 qui n'ont pas été retrouvées depuis 1978 : Heteropterus morpheus, Hesperia comma, Carcharodus flocciferus, C. lavatherae, Pyrgus carlinae cirsi et P. carthami (= fritillarius).

Certaines, telles que morpheus, flocciferus et lavatherae, se trouvant à la limite de leur aire de répartition, n'ont dû jadis être observées qu'exceptionnellement dans le département de l'Aube. Quant à carthami, carlinae cirsi et comma, leur disparition est plus troublante, d'autant que comma, par exemple, est toujours présente en Haute-Marne.

Pour la période 1978-1986, la présence des espèces actuelles, exprimée en tétrades, est la suivante :

| | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 2888. <i>Carterocephalus palaemon</i> | 16 | 2897. <i>Erynnis tages</i> | 35 |
| 2891. <i>Thymelicus sylvestris</i> | 51 | 2898. <i>Carcharodus alceae</i> | 3 |
| 2892. <i>Thymelicus lineolus</i> | 26 | 2902. <i>Spialia sertorius</i> | 3 |
| 2893. <i>Thymelicus acteon</i> | 12 | 2904. <i>Pyrgus malvae</i> | 20 |
| 2895. <i>Ochlodes venatus</i> | 81 | | |

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes







