

# Cuivrés, Azurés Théclas ou Argus



*Lycaena dispar* Hw., 21-VIII-2009, Sauveterre-de-Comminges (31). © D. DEMERGÉS.

Si certaines espèces sont rares ou menacées – voir notre rubrique "spécial *Maculinea*" –, les lycènes sont parmi les papillons de jour que l'on remarque le plus facilement, leurs couleurs éclatantes, cuivrées ou azurées, ne manquant pas d'attirer le regard. Hormis les Théclas qui restent cantonnés à proximité de leurs arbustes nourriciers, on voit la plupart d'entre eux butiner la journée durant dans les prairies fleuries ou regroupés parfois par dizaines autour des flaques d'eau des chemins de montagne. Les chenilles de plusieurs espèces vivent dans les fourmières, en mutualisme avec les fourmis, secrétant du miellat pour celles-ci et se nourrissant, en échange, de leurs larves.

*Glaucopsyche melanops* Bsdv., 15-IV-2007, Valcros (83). © D. DEMERGÉS.



*Lycaena tityrus* Poda, 25-VII-2009, Monesple (09). © D. DEMERGÉS.



*Polyommatus icarus* Rott., 10-VII-2008, Belvéze (82). © D. DEMERGÉS.



*Cupido osiris* Meigen, 24-VI-2010, Teilhet (09). © D. DEMERGÉS.



*Polyommatus escheri* Hb., 2-VII-2010, Fondamente (12). © D. DEMERGÉS.



*Polyommatus daphnis* D. & S., 17-VII-2010, Rivière-sur-Tarn (12). © D. DEMERGÉS.



*Polyommatus dolus* Hb., 29-VII-2010, La Couvertoirade (12). © D. DEMERGÉS.



*Lysandra hispana* H.-S., 22-V-2009, Notre-Dame-de-Londres (34). © D. DEMERGÉS.

*Lycaena alciphron* Rott., 23-V-2009, Saint-Guilhem-le-Désert (34). © D. DEMERGÉS.

*Lampides boeticus* L., 24-VI-2009, Gaudies (09). © D. DEMERGÉS.



*Plebejus argus* L., 29-VI-2009, Lacaune (81). © D. DEMERGÉS.

*Polyommatus amandus* Schneider, 2-VII-2009, Prades (12). © D. DEMERGÉS.