

# Écailles et lithosies friandes de lichens



*Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758), la Veuve, VI-2004 (Côtes-d'Armor). © A. COSSON.

En effet, elles partagent ce point commun : toutes ces espèces se nourrissent exclusivement de lichens et principalement de la Xanthorie ou Parmélie des murailles (*Xanthoria parietina* Linnaeus, 1753). Cette dernière peut s'observer aussi bien sur les murs, les toitures et les arbres sur lesquels elle forme des plaques jaune orangé ou verdâtre. Les adultes de ces papillons essentiellement nocturnes, considérés aujourd'hui comme des noctuidés, produisent une génération annuelle que l'on peut rencontrer de la mi-mai pour les plus précoces, au début septembre pour les plus tardives. Les chenilles sortent la nuit pour s'alimenter ; dans la journée, elles vivent la plupart du temps au sol. C'est là qu'elles se nymphosent, sous la litière ou sous les pierres.

*Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758), l'Eborine, VII-2003 (22). © A. Cosson.



*Eilema caniola* (Hübner, 1808), le Manteau pâle, VIII-2003 (22). © A. Cosson.



*Eilema complana* (Linnaeus, 1758), le Manteau à tête jaune, VII-2005 (22). © A. Cosson.



*Eilema depressa* (Esper, 1787), la Lithosie ocre, VII-2007 (22). © A. Cosson.

*Eilema griseola* (Hübner, 1803), la Lithosie grise, VIII-2002 (22). © A. Cosson.



*Eilema lurideola* (Zincken, 1817), la Lithosie companule, VII-2007 (22). © A. Cosson.



*Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766), le Manteau jaune, V-2004 (22). © A. Cosson.



*Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) mâle, la Lithosie quadrille, VIII-2005 (22). © A. Cosson.

*Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766), la Lithosie muscerde, V-2009 (47). © A. Cosson.



*Setina aurita* (Esper, 1787), l'Écaille alpine, VI-2010 (05). © A. Cosson.



*Setina irrorella* (Linnaeus, 1758), l'Endrosie diaphane, VI-2010 (12). © A. Cosson.



*Thumatha senex* (Hübner, 1808), la Nudarie vieille, VII-2010 (22). © A. Cosson.