

LES LÉPIDOPTÈRES DE LA FORÊT DE LA PERTHE
EN 1980

'RHOPALOCERA'

par Pierre PORCHERET

Commune de Plancy-l'Abbaye

Forêt de la Perthe : '72 243' (Lamb. II ét.) - EP78 (UTM)

Période d'observation : 1er mai au 28 septembre 1980

Nombre de visites effectuées : 20

Nombre d'espèces observées : 31

TABLEAU PHÉNOLOGIQUE (par quinzaines)

	mai		juin		juillet		août		sept.	
	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e	1re	2e
P. machaon			o					o	o	
I. podalirius		o	o	o						
A. crataegi				o	o					
P. rapae						o		o	o	o
P. napi							o	o		
A. cardamines	o	o	o	o						
C. australis		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G. rhamni	o	o		o		o	o	o	o	o
L. sinapis							o		o	
M. galathea				o	o	o				
P. tithonus							o	o	o	
C. pamphilus		o	o				o		o	o
C. arcania				o						
P. aegeria									o	
L. megera									o	
I. io	o						o	o		
V. atalanta				o	o					o
V. cardui		o	o	o	o		o	o		o
A. urticae				o					o	o
P. c-album										o
M. aglaja				o	o	o				
M. athalia					o					
E. aurinia		o	o							
H. lucina		o	o							
H. tityrus								o		
A. agestis		o	o	o			o	o	o	o
L. coridon							o	o	o	o
L. bellargus		o	o	o					o	o
P. icarus		o	o	o	o		o		o	o
P. malvae	o									
T. sylvestris					o	o				

OBSERVATIONS

Iphiclides podalirius. - Je n'ai pas observé de seconde génération malgré quatre visites en août et cinq en septembre.

Aporia crataegi. - Nombreuses éclosions, mais la période de vol a été courte (du 18 juin au 3 juillet).

Colias australis. - J'ai rencontré cette espèce lors de presque toutes mes visites, du 26 mai au 28 septembre, en quantité assez importante. La dernière génération paraissait être de plus petite taille (une ♀ capturée le 16 septembre avait une envergure de 40 mm contre 47 mm pour les femelles capturées précédemment).

Pararge aegeria tircis. - En très petit nombre.

Lasiommata megera. - Observé seulement deux ou trois exemplaires.

Inachis io. - Peu nombreux, sauf ceux observés au début de mai.

Polygonia c-album. - En très petit nombre.

Mesoacidalia aglaja. - Nombreuses éclosions. Les spécimens observés fin juillet et début août étaient défraîchis.

Mellicta athalia. - Observé un seul exemplaire.

Lysandra coridon. - Très nombreuses éclosions, les mâles très nombreux étaient parfois rassemblés sur des excréments d'animaux, au point de les recouvrir entièrement. Les spécimens observés en septembre étaient défraîchis.

À noter que j'ai capturé un exemplaire (*L. coridon*) - un seul - près de la Seine à St-Oulph '71 239', dans un biotope qui ne semble pas du tout correspondre à celui de l'espèce (d'après le "Guide des Papillons d'Europe" : *L. coridon* vit dans les friches, terrains secs et caillouteux, surtout calcaires).

Remarque. - Je n'ai pas observé de Colias crocea, la dernière visite ayant été effectuée le 28 septembre.




Fig. 1. - Histogramme du nombre d'espèces par quinzaines dans la forêt de la Perthe.

Remarque : Il fait bien apparaître les conséquences néfastes du mauvais temps de juillet.

(rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine)