

THEFSAMOLYCAENA DISPAR Haworth
À DROUPT-SAINTE-MARIE ET À MÉRY-SUR-SEINE (AUBE)
'LEP. LYCAENIDAE'

par Pierre PORCHERET

Dans un précédent article (PORCHERET, 1984), je signalais la relative fréquence de *Thersamolycaena dispar* à Méry-sur-Seine et aux environs en août 1983. J'indiquais également que l'une des stations, située à Droupt-Sainte-Marie, près de la rivière de Beauregard (716 2389), risquait d'être détruite par suite de défrichage. De fait, le terrain fut replanté en Peupliers et ensemencé en Maïs entre les rangées d'arbres, ce qui entraîna la disparition de ce Lycénide. Toutefois, quelques exemplaires apparaissaient chaque année dans un pré situé non loin de là. Or, en 1988, le terrain n'a pas été cultivé, peut-être en raison du haut niveau des eaux en mai, si bien que, la nature reprenant ses droits, le sol s'est couvert de *Rumex acetosa* (Oseille des prés), de *Pulicaria dysenterica* (Pulicaire dysentérique), de *Lythrum salicaria* (Salicaire commune) et de bien d'autres plantes.

Lors d'une visite effectuée le 13 août 1988, j'ai eu l'agréable surprise de constater la présence de nombreux exemplaires ♂♂ de *Thersamolycaena dispar*, ce qui montre que dès qu'un milieu redevient favorable, l'espèce est capable de le recoloniser rapidement.

Une autre visite, le 18 août, m'a permis de voir encore un grand nombre de ♂♂ et quelques ♀♀.

J'ai relevé sur ce même biotope, les 13 et 18 août, la présence de *Polyommatus icarus* Rottemburg, *Cynthia cardui* Linné et *Pyronia tithonus* Linné.

Quant à la station signalée en 1983 à Méry, entre la Seine et la rivière du Moulin (715 2390), je n'y ai observé qu'un seul exemplaire ♂, le 16 août.

RÉFÉRENCE

PORCHERET (P.), 1984. - Sur la présence de *Lycaena dispar* Haworth à Méry-sur-Seine (Aube) et aux environs 'Lep. Lycaenidae'. - Bull. d'Ent. champen., 3 (1), 1984 : 17-18.

9, rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

NDLR. - Coordonnées d'après le quadrillage kilométrique Lambert II étendu.