Bulletin de la Société
entomologique de France

Séance du 23 mars 1898

Citer ce document / Cite this document :

Séance du 23 mars 1898. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 3 (6),1898. pp. 141-142;

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1898_num_3_6_22171

Fichier pdf généré le 09/11/2021

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 23 mars 1898

Présidence de M. E.-L. BOUVIER.

MM. R. de la Perraudière (de Jarzé) et J. Vachal (d'Argentat) assistent à la séance.

Admission. — M. Émile Lucet, pharmacien-chimiste, 52, rue de la Grosse-Horloge, Rouen (Seine-Inférieure). *Entomologie appliquée, Parasites.*

Présentation. — Le Rév. P. Vincente Martinez, Colegio de PP. Escolapios, Sevilla (Espagne), présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. l'abbé J. de Joannis et G.-A. Poujade.

Nomination. — M. A. Vayssière, professeur adjoint à la Faculté des Sciences de Marseille, est nommé professeur de Zoologie agricole à la même Faculté (création nouvelle).

Mission. — M. J. Künckel d'Herculais annonce à la Société son prochain départ pour Buenos-Ayres. Notre Collègue est détaché par le Gouvernement français auprès du Gouvernement de la République argentine afin d'organiser un service d'Entomologie appliquée. Il compte, en particulier, continuer ses importants travaux, commencés en Algérie, sur les moyens de combattre les invasions de Criquets.

L'absence de M. J. Künckel d'Herculais doit durer deux années.

Changements d'adresse. — M. Ch.-E. Porter, naturaliste, directeur du Musée d'Histoire naturelle, 1108, Casilla, Valparaiso (Chili).

— M. A. Warnier, 8, rue des Templiers, Reims (Marne).

Captures. — M. E. Simon signale la capture qu'il a faite, en juillet 1896, dans le sud de la forêt de Fontainebleau, d'un *Coelotes* encore inédit. Cet Arachnide, qui se trouve communément en Auvergne, n'avait pas encore été capturé dans le bassin de la Seine.

— A propos de la capture de l'*Erebia Medusa* Fabr., signalée à la séance du 9 juin dernier (*Bull.*, 1897, p. 169), M. G.-A. Poujade fait

Persée BY: creative commons

remarquer que ce n'est pas à Lagny, mais à Largny (Aisne) que le Dr Vogt a capturé trois ou quatre individus de ce Lépidoptère, ce qui n'est pas surprenant, puisque à la même époque plusieurs individus avaient été vus aux environs de Pierrefonds.

Communications.

Description de deux espèces nouvelles de Cynipides [Hymén.]

Par l'abbé J.-J. Kieffer.

Synophrus Olivieri n. sp. — Hartig et G. Mayr donnent comme caractère générique du genre *Synophrus*, que le grand segment abdominal couvre tous les suivants et dépasse même le bout de l'abdomen. Ce caractère est vrai pour *S. politus* Hart., l'unique espèce connue jusqu'à présent, mais il ne l'est plus pour l'espèce que nous décrivons ici. Chez cette dernière, le grand segment couvre seulement les quatre cinquièmes du dessus de l'abdomen, laissant parfaitement visible le dessus des segments suivants; bord postérieur du grand segment (2e et 3e soudés) et du segment suivant ou 4e fortement échancré en angle; le quatrième segment est finement ponctué; le cinquième plus densément ponctué, avec quelques poils gris, dressés et un peu denses. Cette espèce se distingue encore de *S. politus* par une forte carène médiane allant d'entre les antennes jusqu'à la bouche, et par la couleur des antennes qui sont d'un brun sombre avec l'extrême bout de chaque article du funicule plus clair. Antennes composées de 15 articles chez le mâle et de 13 chez la femelle. — Long. 4,5 mill.

Galle. — L'insecte vit dans une galle irrégulièrement arrondie, de la grosseur d'une noix, pluriloculaire, ligneuse et très dure, sur les rameaux de *Quercus suber*.

Patrie. — Ces galles ont été recueillies en Algérie, aux environs de Philippeville, par M. Al. Olivier à qui je dédie ce Cynipide.

Andricus Trotteri n. sp. — Noir; tibias antérieurs et intermédiaires, ainsi que l'extrémité des cuisses, bruns; dessous de l'abdomen brun sombre. Tête et thorax mats, vertex luisant, mésopleures, fossettes et abdomen brillants. Mésonotum et scutellum finement ridés et finement pubescents; abdomen non ponctué, glabre, à l'exception d'une petite tache de pubescence de chaque côté de sa base. Antennes de