

LA REGION DE LA FERTE - ALAIS (ESSONNE)

(suite des articles parus dans les numéros 10 et 12)

par J. Richebourg-Peyrache

ADDENDA

GEOMETRIDAE

Gymnoscelis rufifasciata - Très commun. IV,VI-VIII. Très variable.
Chloroclystis rectangulata L.- Commun. VII. Très variable en ce qui concerne la coloration des ailes, qui peut passer du brun clair au vert.

C. v-ata Un seul exemplaire capturé sur le Pont de Villiers, le 11-VII-75.

Acesis viretata Un seul exemplaire frotté capturé sur le Pont de Villiers, le 18-VIII-76.

Hydriomena furcata Thbg. Assez commun. VII. On peut observer un certain nombre d'individus avec des ailes antérieures de fond couleur crème, avec des dessins marron clair.

Horisme tersata Schiff. Assez commun. VII.

Orthonama obstipata Un seul exemplaire capturé sur le Pont de Villiers, le 8-VII-75.

Eupithecia haworthiata Dbld.(= isogrammaria H.S.). Semble rare.VII.

E. innotata Hfn. Un seul exemplaire capturé sur le Pont de Villiers, le 21-VII-75, puis un autre le 19-VIII-76. Cette espèce semble donc être assez rare.

E. tripunctaria H.S. (= albipunctata Hw.) Assez commun. VII.

NOCTUIDAE

Cuculliinae

Atethmia centrago Hw.--= xerampelina Hübner, nec Esper). Un seul exemplaire très frais capturé sur le Pont de Villiers, le 15-VIII-76.

Je tiens à remercier notre ami Patrice Leraut pour sa précieuse participation dans la détermination (difficile) d'une partie du matériel récolté.

Pour tous renseignements, s'adresser à : M. Jean RICHEBOURG
43, rue de Lille, 75007 PARIS