

Dans le département de la Gironde

JACQUES ROGARD



CAPTURE D'UNE FORME NOIRE DE *CYDALIMA PERSPECTALIS* (WALKER, 1859) (LEP. CRAMBIDAE)



Récemment découverte en France, cette espèce a fait l'objet de quelques notes dans la présente revue. Je l'avais signalée pour la première fois en Gironde, à Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde (ROGARD, 2013). Depuis, je l'observe régulièrement dans

mon jardin où elle est commune, pour ne pas dire abondante. Le 12 juillet 2013 avant minuit, j'ai l'heureuse surprise de voir arriver au tube actinique, un spécimen entièrement noir, seul le point discoidal des ailes antérieures apparaît en clair. Depuis le mois d'août, cette forme aberrante se présente régulièrement au piège lumineux, au point même d'être plus commune que la forme typique ! Le département de la Gironde est donc à ajouter à la cartographie établie par notre collègue Sylvain DELMAS (*Oreina*, 2013). ■

Bibliographie

DELMAS (S.), 2013. – Observation de *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) dans l'Hérault et mise au point de sa répartition en France (Lep. Crambidae).

Oreina, 22.

ROGARD (J.), 2013. – Un Crambidae récemment découvert en Europe et nouveau pour la Gironde : *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, tome 148, (N.S.) n° 41 (1), 2013 : 59-60.

S'ajoutant aux notes déjà parues dans *oreina* (Schmitt & Demergès, 2012 [n° 19], Lechat, 2012 [n° 20], Delmas, 2013 [n° 22]), des communications personnelles, plusieurs sites et blogs signalent la présence de l'espèce (Société alsacienne d'entomologie, Le Monde des insectes, Papillons Poitou-Charentes, Le Jardin de Lucie...). Il est bien difficile de citer les localités où elle a été observée tant sa progression est explosive, nous avons listé les départements où sa présence semble nouvelle : Bouches-du-Rhône, Dordogne, Gironde, Ile-et-Vilaine, Jura, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Territoire de Belfort. Merci à J. BLANC, Fr. BOUDRANE, Chr. GIBEAUX et A. LANTZ.

La rédaction

20, rue Raoul Larche - Les Clairières de Mingot
F-33160 Saint-Médard-en-Jalles
jacques.rogard@gmail.com

En Loire-Atlantique

DAVID BATOR




REDÉCOUVERTE DE *RHYACIA SIMULANS* (HUFNAGEL, 1766) (NOCTUIDAE)

Ce vendredi 4 octobre 2013, la météo est clémente sur le département de la Loire-Atlantique. Avec mon ami Jean-Alain GUILLOTON, nous nous rendons au pied du coteau de Guérande et installons une lampe à ultraviolet dans un petit chemin de terre perpendiculaire à la route touristique qui mène aux marais salants. Il est 22 h 20 et en attendant l'arrivée des premières espèces, nous décidons de prospecter les alentours à la lampe frontale. Bientôt, notre attention est attirée par la présence de nombreux papillons posés sur une longue clôture en bois. Parmi ceux-ci, nous avons la bonne fortune de découvrir un exemplaire assez frais de *Rhyacia simulans*. Cette observation est surprenante au regard de la carte de distribution figurant sur le site Internet « Lépi'Net ». En effet, si cette espèce est présente historiquement sur une grande partie de notre territoire, actuellement elle semble avoir complètement disparu des régions de plaines de l'Ouest de la France, excepté dans l'Indre où elle a été encore signalée en 2010. Pour la Loire-Atlantique, la seule mention connue est celle figurant dans le catalogue Bonjour (1897) sous le nom d'*Agrotis pyrophila* Fab. Elle y est indiquée comme « très rare, prise autrefois à la Mâtinaie, commune de Missillac, par M. THOMAS. Non retrouvée depuis. Chenille sur graminées ». Cette espèce au comportement lucifuge peut facilement passer inaperçue. Toutefois, il convient de déterminer si la présence de cet exemplaire en Loire-Atlantique est le simple fait d'un apport migratoire comme il semble que cela soit probable pour une partie des observations de *Rhyacia simulans* en Grande-Bretagne ou si ce spécimen trouvé dans un secteur assez dégradé (cultures céréalières, pâtures à chevaux et

centres équestres, bas-côtés girobroyés) est issu d'une petite population qui a pu se maintenir dans le site Natura 2000 remarquable et tout proche des marais salants de Guérande. Mes remerciements chaleureux à Jean-Alain GUILLOTON pour la relecture critique de cette note et à Philippe MOTHIRON pour avoir autorisé la publication de la carte de répartition de l'espèce. ■

Fig. 1, imago de *Rhyacia simulans*, coteau de Guérande (44), 4-X-2013 ; fig. 2, biotope de capture. © D. BATOR.




Bibliographie

BONJOUR (S.), 1897. – Faune lépidoptérologique de la Loire-Inférieure. Macrolépidoptères. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, vol. 7, n° 2, 161-263.

SKINNER (B.), 1984. – Colour identification Guide to Moths of British Isles (4^e éd.), 267 p., 42 pl. Viking, London.

Site Internet

MOTHIRON (Ph.), en ligne. – Les Carnets du lépidoptériste français <<http://www.lepinet.fr>> (consulté le 7/10/2013).



Répartition en France de *Rhyacia simulans*.

■ Données postérieures à 1980
■ Données antérieures à 1980

16, rue Georges Feydeau F-44810 La Chevallerais