

Ordo III. Lepidoptera

by: Giovanni Antonio Scopoli

in: Entomologia Carniolica exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa

in ordines, genera, species, varietates, methodo Linnaeana

pp. 142 - 258



NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Terms and Conditions

The Göttingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes.

Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact:

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

Digitalisierungszentrum

37070 Goettingen

Germany

Email: gdz@www.sub.uni-goettingen.de

Purchase a CD-ROM

The Goettingen State and University Library offers CD-ROMs containing whole volumes / monographs in PDF for Adobe Acrobat. The PDF-version contains the table of contents as bookmarks, which allows easy navigation in the document. For availability and pricing, please contact:

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Goettingen - Digitalisierungszentrum

37070 Goettingen, Germany, Email: gdz@www.sub.uni-goettingen.de

ORDO III.
LEPIDOPTERA.

LINN. *Syst. Nat.* p. 458.

ALÆ QUATUOR IMBRICATÆ SQUA-
MIS. CORPUS PILOSUM.

PAPILIO.

LINN. *Syst. Nat.* 1. c.

I. TETRAPLI. (†)

(*) *Alis angulatis.*

419. PAPILIO *Antiopa.*

Alæ ant. long. unc. 1. lin. 5½. lat. lin. 11½. (††)

LINN. *Syst. Nat.* p. 476-477.

Faun. Svec. 2. 1056.

ROES. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 1. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 71.

Diagn. Nigricans; alarum limbo utrinque ali-
ter colorato, intra quem superne maculæ cæruleæ
in ala superiore octo, in inferiore septem, in unam
seriem ordinata. (†††)

Habitat in Salice.

Alæ

(†) Natura hos ordines instituit, nec frustra.

(††) Alæ longitudo a basi ad apicem latitudo ab
apice ad angulum posticum; quarum propor-
tio constans.

(†††) Colores ex cadaveribus, non vero ex vivis
animalibus, desumpti sunt; quorum prævalen-
tes primarii.

Alæ anticæ supra color

1. Caryophyllinus, a basi usque ad fasciam nigram extensus.
2. Albus aut isabellæ, limbi utrinque & macularum duarum margini crassiori antice adsidentium, nec non tibiarum.
3. Niger, fascia nempe nigra adjacens limbo.
4. Cæruleus, maculæ cæruleæ nigrae fasciæ impositæ.
5. Rosatus, accessorius, quo limbus in margine & præsertim circa posticum angulum adspersus, non perpetuus, & facile evanidus.
— infra color
1. Fuscus, & fuscæ lineolæ punctaque in limbo.
2. Niger, lineolæ nigrae transversæ confertæ.
3. Albus aut isabellæ limbi, & punctum concolor in medio septem linearum intervallo a basi distans; maculæ marginis crassioris fusco-variegatæ.
- posticæ supra anticis concolores, absque maculis in margine superiore fasciaque nigra septem maculis ovatis cæruleis variegata.
- — subitus anticis concolores, puncto in medio colore limbi.

Antennæ alarum paginæ superiori concolores, clavæ apice fulvo.

Nigricans dicitur, quia a longe visus, totus niger apparet, propius autem observatus non item. Color caryophyllinus est equidem sed obscurior. Verno tempore circumvolans limbum album semper habet, alio autem tempore sèpius isabellatum; adservatus limbum album quandoque acquirit qui talis non erat antea; idem punctis caryophyllinis sèpius variegatus.

Larva echinata, nigra. Pupa fusca, bicornis, postice adpensa. *Ichneumonis* puparum aptissimus nidus.

420. PAPILIO *Polychloros*.*long. unc. 1. lin. 1 $\frac{1}{2}$. lat. lin. 9.*

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1057.

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 2. fig.

4. 5.

FRISCH. Infect. 6. Tab. 3. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ supra corticinæ: anticæ maculis nigris, ovalibus, quatuor, liberis.

Habitat in *Salice ceraso*.

Alæ anticæ supra color.

1. Corticinus.

2. Niger; fascia nigricans submarginalis; maculæ tres ad marginem superiore, quarum duo majores margini insidentes, alia minor libera anterior; in disco maculæ aliæ quatuor subovatae: anteriore majore;

3. Fuscus; margo exterior. (†)

— — infra —

1. Cupressinus.

2. Umbrinus, quo basis fasciatim variegata, & cupressinus alibi lineatim & punctatim dense maculatus; fascia ab angulo postico ad angulum alæ distans ab apice intervallo lin. 2 $\frac{1}{2}$.

— posticæ supra color

1. Corticinus.

2. Niger, macula semielliptica prope marginem superiore in medio posita, fascia obsoleta undata submarginalis.

3. Cæruleus, maculæ hemisphæricæ fascia nigra immersæ.

4. Fuscus, quo dentes colorati.

— — infra —

1. Umbrinus, ab alæ basi extensus per spatum lin. 6 $\frac{1}{2}$. longum; similes lineaæ transversæ crebræ alibi paginam cupressinam variegantes.

2. Cu-

(†) Alæ margo superior aut crassior a basi ad apicem, exterior ab apice ad angulum posticum, inferior ab angulo postico ad basim.

2. Cuprellinum punctum in medio, intervallo lin. $1\frac{1}{2}$ distans ab umbrino & exteriore margine.

Var. 1. Inter maculas duas majores margini exteriori alae anticæ incumbentes, colore albido

2. — Citrino.

3. Maculis submarginalibus cæruleis in alæ posticæ pagina superiore (3-4).

Antennæ clava recta: apice corticino.

421. PAPILIO *Urticæ*.

— long. lin. 11. lat. $7\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1058.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 4. fig. 6-7.

FRISCH. Inf. 6. Tab. 3. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 71.

Diagn. Alæ anticæ corticinae fascia limbi maculisque senis atris, quarum tres majores margini superiori impositæ, aliæ in disco liberæ: antica duplo & triplo majore.

Habitat in *Urtica urente*. LINN. sed etiam circa *Idriam*, & alibi, ubi *Urtica urens* nulla.

Alæ anticæ color supra

1. Sature corticinus.

2. Niger in locis prædictis.

3. Cæruleus, maculæ aut puncta 5-8. in fascia nigra limbi.

4. Albus, maculæ ad marginem superiorem, inter fasciam & maculam proximam.

— — infra

1. Cupressinus in limbo.

2. Umbrinus baseos, marginis exterioris, & maculæ subconicæ magnæ basi sua superiori margini imposta.

3. Niger, lineolis repandis transversis umbrinam basim variegantibus.

— posticæ color supra

1. Niger a basi ad medium usque, fasciaque limbi.

2. Sature corticinus in area interjecta.

3. Cæruleus, maculæ hemisphæricæ 6-7. fasciæ immerse.

M

3. cæ-

— — — infra

1. Umbrinus a basi ad medium usque, nec non in limbo.
 2. Cupressinus, areæ interjectæ, umbrinique lineoli transversis variegatæ.
- Variat 1. Lineola cupressina in medio alæ posticæ subtus,
2. Absque hac lineola, aut puncto.
- Antennæ clava nigra; apice corticinio.

422. PAPILIO C album.

— long. lin. 10½. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 477.

Faun. Svec. 2. 1059.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I Tab. 5. fig. 5. 6.

FRISCH. Infect. 4. Tab. 4. fig. 5. 6. p. 6-9.

Diagn. Alæ sinuatæ, posticæ subtus in medio linea curva alba C latinum referente notata, cuius convexitas infecti corpus respicit.

Habitat in *Humulo* &c.

Alæ anticae color supra

1. Corticinus.
2. Umbrinus, limbi & macularum (7), quarum quinque liberæ, tres aliæ marginibus adjacentes.

— infra.

1. Umbrinus fasciæ mediæ obtuse-angulatæ & macularum ad basim positarum, nec non limbi ab angulo alæ superiore ad ejus posticum.
2. Cupressinus inter fasciam & limbum, sed exiguis confertis umbrinis lineolis transversis variegatus.
3. Viridis, maculæ obsoletæ variantes versus limbum.

posticæ color supra ut in anticis, sed margo unidique umbrinus & tres maculæ umbrinæ in disco, versus basim liberæ.

subtus ut in anticis, sed maculæ virides plures, & in medio album C.

Variat 1. Maculis binis alarum anticarum superiore paginam antice occupantibus liberis & cohærentibus.

2. Ma.

2. Macula postica marginali ibidem manifesta, aut obsoleta.
3. Alis subtus non tam cupressino quam corticino colore tinctis.
4. Alis posticis subtus maculis nonnullis virescentibus & subocellatis.

423. PAPILIO Jo.

— long. unc. 1. & lin. $1\frac{1}{2}$. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 472.

Faun. Svec. 2. 1048.

ROESEL. Insect. Diur. Cl. I. Tab. 3. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 66.

Diagn. Ocellus magnus pavonio similis unus in qualibet alæ pagina superiore.

Habitat in *Urtica dioica* &c.

Alæ antice color supra

1. Fulvus.
2. Murinus limbi.
3. Niger, margo superior, maculæ duo magnæ ei impositæ & margo exterior ocelli.
4. Offeus, lineolæ transversæ in margine superiore usque ad maculam nigram majorem extensæ, maculæ tres ad marginem eundem.
5. Cæruleus, polleni adspersus spatio a linea nigra lunata ocelli & maculis offeis posticis intercepto.
6. Albus puncta quinque prope limbum, quorum tria cæruleo colori immersa.

— — infra

1. Plumbbeus.
2. Cupressinus limbi, punctorumque (6) versus marginem exteriorem.
3. Niger, lituræ transversæ ad basim, striæ confertæ transversæ in disco, maculæ lunulatæ 6-7 in limbo.

— postice color supra

1. Murinus.
2. Niger ocelli ovati lin. $3\frac{1}{2}$. longi, ejusque supercilii.
3. Cæruleus pupillæ ocelli abruptæ.

M ♀

4. ♂.

4. Oſteus palpebræ utriusque, & pollinis
ad basim alæ.

— — — infra

1. Plumbeus.

2. Niger, lituræ transversæ repandæ, lineo-
læque plurimæ.

3. cupressinus, versus limbum intersper-
sus, punctoque in medio alæ.

424. PAPILIO Atalanta.

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 9.

LINN. Syſt. Nat. p. 478.

Faun. Svec. 2. 1060.

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 6. fig. 6. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 72.

Diagn. Alæ supra nigræ; anticæ fascia media
minia, posticæ limbo minio.

Habitat in *Urtica dioica*.

Alæ anticæ color supra

1. Niger.

2. Minius, vividior tamen quam trochus
exhibit.

3. Albus, maculæ (7), quarum sex inter fas-
ciam & limbum, una in ipsa fascia,
margo alæ albo nigroque varius.

4. Cærulescens, lineolæ convexæ (5) sub-
marginales.

infra

1. Niger.

2. Minius, fascia ut supra.

3. Albus, maculæ ut supra, tribus extimis
subocellatis.

4. Cupressinus, inter apicem & maculam
albam majorem.

5. Cæruleus, linea conica ad basim, &
alia linea recurva (?) inter fasciam &
maculam majorem albam.

6. Isabellæ inquinans basim fasciæ rubræ.

posticæ color supra

1. Niger; ut & puncta (4) in fascia limbi.

2. Minius, fascia limb.

3. Albus nigroque varius margo exterior.

4. Cæruleus, maculæ duo didymæ ad an-
gulum ani, margine nigro.

— infra

- — — infra
1. Cupressinus sed obscurior.
 2. Niger lineæ inæquales transversæ vagæ, ut & palpebræ ocellorum ad limbum.
 3. Isabellæ, macula in medio marginis superioris nigro - nebulosa, conica, bases ocellorum, lineæ marginales (7).
 4. Albus & nigro varius margo exterior.
 5. Cæruleus, lineolæ hemisphæricæ, pupillas ocellorum constituentes, nec non lineam submarginalem.

Antennæ lin. 7. longæ; stipite nigro: annulis albis, clava nigra: apice corticino. Oculi corticini; cruce nigra, punctis quinque facta, inscripti.

Larva echinata. Pupa antice bifida, maculæ auri nudi ad bases tuberculorum auctorum posticæ partis, evanescentes, cum ex pupa partui proxima alarum rubra fascia translucet.

(**) *Alis dentatis.*

425. PAPILIO Hypermenstra.

— long. unc. 1. & lin. $\frac{1}{2}$. lat. lin. 7.

ROESEL. Suppl. Tom. IV. Tab. 7. fig. 1. 2.

Diagn. Alæ supra isabellatæ; maculis, venis, fasciisque marginali pectinata, nigris.

Labaco missus, an indigena? in vineis *Austriæ*, certe spontaneus.

Alæ anticæ color supra

1. Isabellæ.
2. Niger, maculæ (5) exteriori margini in- cumbentes; venæ nigræ; fascia marginalis dentibus octo pectinata, duplex.
3. Ruber, punctum intra maculam nigram extimam.

— — — infra

1. Cereus.
2. Niger, maculæ venæ fasciæque ut supra.
3. Cinnaberinus, maculæ alternæ marginales supra nigræ.
4. Minius, spatia dentibus fasciæ quinis aut senis duplicatis relicta.

— posticæ color supra

1. Isabellæ.
2. Ni-

2. Niger, fascia limbi dentata duplex, venæ & maculæ his interpositæ.

3. Cinnaberinus, maculæ (6).

4. Cæruleus color squamarum alæ quarumdam infra basim maculæ cujusque cinnaberinæ ad limbum positæ.

— infra

1. Cereus.

2. Niger, ut supra.

3. Cinnaberinus, maculæ ut supra, & spatio inter dentium fasciæ duplicaturas.

Antennæ lineas quatuor longæ; stipite hepatico, clava nigra gibba. Circum oculos annulus cinnaberinus. Abdomen utrinquè binis ordinibus punctorum cinnaberis colore.

Variat 1. Macula puncto nigra, vel maculis duabus nigris inter marginem inferiorem alæ anticae & nervum secundum ibidem.

2. Maculis alternis nigris marginalibus ejusdem alæ subtus maxima parte nigris, aut totis fere cinnaberinis.

3. Area illa ovali ad basim alæ posticæ posita, ex qua fere parallelæ demum oriuntur decurrentque venæ, maculis (2) & puncto nigro, aut maculis (3), vel denique (4) parallelis notata.

426. PAPILIO *Cardui.*

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 8 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1054.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 10. fig. 6-7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 69.

Diagn. Alæ anticae fuscæ; insulis tribus, ochreaceis in medio, albisque maculis quinis ad apicem, quarum tres sphæricæ: posticæ subtus ocellis quatuor.

In Carniola non rarus.

Alæ anticae color supra

1. Fuscus.

2. Ochreaceus.

3. Albus, alba quoque lineæ sublunatæ (5) in limbo, versus apicem.

— infra

— infra

1. Nigricans, maculæ octo circiter inæquales angulatæ sparsæ a basi ad medium usque.
2. Albus, maculæ magnæ tres exteriori margini impositæ; aliae tres multo minores rotundæ, ut supra; lineæ juxta totum limbum in fasciam quasi unitæ submarginales.
3. Ochreaceus in medio.
4. Corallinus versus basim.
5. Cervinus ad apicem.

— posticæ color supra

1. Ochreaceus insulæ in medio & limbi.
2. Murinus ubique alibi.
3. Fuscus, maculæ (5) subrotundæ, aliæ (?) subarginales; sex aliae in margine.
4. Cæruleus, squamæ nonnullæ ad bases macularum fuscarum duarum cohærentium ad angulum ani.

— infra

1. Albus.
2. Cervinus, maculæ variæ, nebulosam reddentes albam paginam.
3. Cæruleus squamarum, quæ pupillas efficiunt ocellorum.
4. Niger, annulus ultimus ocellorum lateralium.
5. Paleaceus annulus penultimus ocellorum lateralium

Antennæ lin. (?) longæ. Ocelli, alarum posticarum subtus, intermedii minores.

427. PAPILIO Galathea.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 474.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Tab 37. fig. 1, 2. bene.

P. PODA. Mus. Græc. p. 68.

Diagn. Alæ supra fuscæ albido maculatæ, posticæ subtus ocellis fenis: ultimis binis coalitis minoribusque.

In gramineis subsylvestribus Carnioliae non rarus.

Alæ anticæ color supra

1. Fuscus.

M 4

— infra

2. albus *fæminæ*, isabellæ *mari*, nempe maculæ (13), majore ad basim.

— — — infra

1. Albus, maculæ magnæ, una ad basim, tribus in medio.

2. Fuscus.

3. Isabellæ ocelli fusco-punctulati, pupilla glauco-argentea.

— posticæ color supra.

1. Fuscus.

2. Albus aut isabellæ, macula magna cuneiformis ad basim, aliæ 8-9 in medio fasciam quasi efficientes, maculæ aliæ submarginales (3-6).

— — — infra

1. Albus.

2. Isabellæ fusco-punctatus.

3. Glauco-argenteus pupillarum.

Antennæ lin. (6.) longæ, clavæ apice corticino. Abdomen nigrum. Volatus latus; insessus facilis.

428. PAPILIO *Fagi*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 10.

Diagn. Fuscus; fascia communi, utrinque lucidoire, alis singulis subtus ocello.

Inter *Fagos*, & circa tuguria rusticorum.

Alæ anticæ color supra

1. Fuscus, fuscæ huius partis margine exteriore dentato; limbus fuscus, ocellus fuscus; pupilla alba fasciæ lucidiori impositus, una cum macula minore rotunda.

— — — infra

ut supra, sed fascia lucidior, & ocellus maculaque nigra.

— posticæ color supra

1. Fuscus, pariter externe dentatus.

2. Albus fasciæ, albo fuscoque varius marginis exterioris.

— — — infra

1. Fuscus.

2. Albus fasciæ & pupillæ ocelli.

3. Niger liturarum trium dentatarum & transversarum.

Antennæ lin. $6\frac{3}{4}$. longæ, clava compressa obtusa gibba, subtus albida, basi corticina. Corpus fuscum.

Variat 1. Macula ad apicem alæ supra ocelata & cœca.

2. Fascia alæ antica utrinque ossea.

3. Ala antica supra ocello parvo, aut puncto cœco notata.

4. Punctis tribus albis sub ala postica, in eadem cum ocello distantia a margine.

429. PAPILIO *Dryas*.

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9.

Diagn. Alæ concolores; anticae utrinque ocellis binis atris; pupilla glauca.

Inter *Quercus*.

Unus & idem alæ utriusque color, obscurior tamen fascia versus limbum sub alis posticis.

Variat 1. Colore murino, ocelli inferioris in alæ pagina inferiore, diametro lin. $2\frac{1}{2}$.

2. Ocellis iisdem subtus atmosphæra lucidiore.

3. Alæ longitudine unciali; ocello utroque cæcutiente & parvo.

4. Colore fusco: ocellis æqualibus.

5. Ocellis etiam æqualibus, sed alis posticis utrinque ocello exiguo.

Antennæ semiunciales, apice corticinae; clava tenui: apice curvula; volatus latus; structura facies, proportio partium geometrica, locus natalis idem, speciem indicant.

430. PAPILIO *Iris*.

— long. unc. 1. lin. 4. lat. $10\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 476.

ROESSL. Papil. Diurn. Cl. I. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 70.

Diagn. Alæ supra colore variantes pro vario oculi situ, singulæ subtus uni ocellatæ, anticae supra ad apicem maculis binis, albis.

M 5

In

In Carniolia patim occurrit, aitatae.

Variat 1. Alis fuscescensibus; anticis maculis

(II) albis; posticis fascia alba ocello quoque nigro cœco: iride ochreacea, qui sub alis anticis pupillam habet cœrulecentem, & maculas duas albas iridi immixtas. Alæ posticæ subtus fascia alba dente exterius instructa. Huic potissimum convenientia LINNÆANA.

2. Alis fuscescensibus; fascia maculisque ochreaceis; punctis binis albis ad apicem anticarum utrinque, quæ maculas albas subtus habent, & ocellum cœcum. Alæ posticæ subtus fascia albida non dentata; pupilla cœrulecente. Hanc piuxit ROESELIUS.

3. Alis anticis supra, castaneis; maculis ochreaceis; fascia abrupta, paleacea, maculisque ad apicem tribus albis; posticis fascia paleaceo-ochreata, maculisque ochreaceis, subtus ocello obscuriore fasciaque albida obsoleta.

431. PAPILIO Mæra.

—. long. lin. II. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

Faun. Svec. 2. 1049.

P. PODA. Mus. Græc. p. 67.

Diagn. Ex notis constantibus hisce.

1. Ocellus magnus utrinque versus apicem, cui subtus adjacet exiguus alter.

2. Alæ anticæ subtus corticinæ; lineis transversis fuscis quatuor, quarum una a margine crassiore ad angulum posticum usque producta.

3. Alæ posticæ supra ocellis plerumque tribus.

4. Eadem alæ subtus aliter ac superiores coloratae; lineis repandis transversis binis obliquioribus anticis, & ocellis sex prope

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 155

prope limbum, quorum duo abdomini
proximi in unum fere coaliti.

Paffim in gramineis.

Variat. I. alis anticis supra

1. Nuceis.

2. Corticina macula cuneiformi magna
postica, cuius basis ocellum continet.

3. Nigro ocello, cuius diameter lin. 1 $\frac{1}{2}$
pupilla alba parva.

— infra

1. Griseis circumquaque & ad basim.

2. Corticinis alibi.

3. Macula, ut supra, ocellata sed paulo
majore.

— posticis supra.

1. Nuceis.

2. Corticina atmosphæra ocellorum.

3. Nigra iride, ocelli, cuius pupilla alba
infra

1. Griseis ubique, exceptis ocellis, &
stria transversis.

II. Alis anticis posticisque supra cortici-
nis; fasciis, lineis, venisque fuscis;
posticis ocellis quatuor.

— — — — subtus cortici-
nis; stria lineisque transversis fuscis.

— posticis subtus, ut in Varietate priori, sed
ocellis (7), quorum duo ad angulum
ani coaliti.

III. Alis anticis corticinis; limbo, margine
toto lineis fasciaque rivulosa fuscis;
ocelli diametro lineari.

— — — — subtus ut in
Var. 2.

— posticis supra fuscis; fasciis binis obsoletis,
corticinis; ocellis tribus.

— — — — subtus, ut in priore.

IV. Alis anticis posticisque ut in Var. 3:
sed his supra ocellis quatuor; subtus
ut in priore.

Larva virens, subvillosa Pupa virescens,
obtuse bifida, pone lateribus echinatis.

432. PAPILIO *Aegeria*.

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

ROESEL. Tom. IV. Tab. 33. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 68.

Diagn. Alæ omnes utrinque murinæ, anticæ ocello utrinque ad apicem maculisque paleaceis variegatae; posticæ supra ocellis tribus; subtus punctis tribus, albidis, atmosphæra murina cinctis.

In sylvestribus herbidis, non rarus.

Ocellus alarum anticarum maculæ subovatae, paleaceæ, sæpius immersus.

Variat 1. Ocellis alæ posticæ supra atmosphæra corticina cinctis, aut paleacea, iisque plus minus evidentibus.

2. Ocello anticarum alarum macula una in apice, alia ab basim.

Hisce notis adgnosci & a priore facile distingui potest.

433. PAPILIO *Achne*. (†).

— long. unc. 1. lat. lin. 8.

Diagn. Alæ supra murinæ: anticæ ocellis cœcis (5), posticæ supra (4) cœcis, subtus (6) pupillatis.

In *Frangula ora solii integra*, seu *Rhamno alpino*.

Alæ anticæ color supra

1. Murinus.

2. Niger macularum ocellarium; utrinque (5).

3. Paleaceus annuli ocelli cuiusque.

— — — infra

1. Murinus.

2. Paleaceus fasciæ & annuli cujusque ocelli.

3. Griseus, lineolæ transversæ mediæ.

— posticæ color supra ut anticæ.

— — — infra

1. Murinus.

2. Al-

(†) Danai Regis mater, e quo filiæ quinquaginta natæ.

2. Albus lineolæ obliquæ & fasciæ.

3. Niger iridis ocellorum, pupilla alba parva: gemina in ocello ad angulum ani posito.

4. Paleaceus annulus ocelli singuli.

Palpi nigri rachi alba. Oculorum margo posterior albus. Antennæ lin. (5) longæ, nigrae albo-annulatae; clava tenui, sub apice corticina, extrorsum deflexa. Corpus fuscescens.

434. PAPILIO *Polymeda*. (††).

—. long. lin. 11. lat. 7.

Diagn. Supra murinus, subtus nuceus; alis anticis supra ocellis binis, infra subternis, posticis supra binis, subtus quinis.

In *Caprifolio*, seu *Lonicera xylosteo*.

Alæ anticæ murinæ, singulæ supra ocellis binis, atris, parvis, quandoque coecis.

Postice ocellis (5) annulo paleaceo cinctis, quorum duo in medio ad marginem superiorem, alii postici versus marginem interiorem.

Variat 1. Alis supra & infra murinis: anticis ad apicem subtus ocellis binis.

2. Alis omnibus subtus nuceis: anticis subtus ad apicem ocellis tribus.

435. PAPILIO *Jurtina*. (sexus unus.)

—. long. unc. 1. lat. lin. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1052.

ROESSEL. Suppl. Cl. I. Tab. 34.

P. PODA. Muf. Græc. p. 69.

Diagn. Ala antica utrinque ad apicem ocello immerso maculæ alterius coloris, cui diameter linearis & pupilla excentrica; postica vero subtus fascia lata pallidiore.

In herbidis collibus Carniolie frequens.

Variat

(††) Mater JASONIS, cui e Colcho reduci, AEMONA, seu LABACUM, suam debet originem anno ante Christum 1223, post diluvium 1174, ante ROMAM conditam 472. SCHÖENLEBEN.

158 Papilio. ORDO III. Papilio.

- Variat 1. Alis supra murinis, anticis macula corticina, magna, cuneiformi.
— anticis subtus corticinis; disco obtcuriore.
— posticis supra murinis.
— — — subtus cervinis fusco-punctulatis; fascia pallidiore, subpaleacea, fusco punctulata, in qua puncta tria nigra: exterioribus binis, interiore & versus angulum ani, tertio.
2. Alis singulis supra murinis, sed macula corticina obsoleta.
— posticis subtus ut in Var. 1. sed punctis tantum binis, atris, in fascia.
3. Alis singulis murinis; macula albida: basi corticina, utrinque.
— posticis subtus fascia vix evidenter lucidore, absque punctis nigris.
4. Alis singulis cervinis; macula antarum utrinque alba.
— posticis subtus fascia pallidore, & unico, nigro, puncto interius notata.

435. PAPILIO Janira. (sexus alter).

— long. lin. 11. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 475.

Faun. Svec. 2. 1053.

P. PODA. Mus. Græc. p. 69.

Diagn. Alæ singulæ murinæ utrinque sed anticæ subtus corticinæ; limbo murino, ocelloque ad apicem utrinque parvo.

Una cum priore in copula visa.

Huic ocelli pupilla centralis, macula ocellum continens nulla, alæ posticæ versus limbum obscurissime pallidiores binisque punctis nigris atmosphæra corticina cinctis.

Variat 1. Ocello alarum antarum subtus pupilla obscura.

2. Punctis posticarum exterioribus punctulo albo ocellatis.

436. PAPILIO Ligea.

— long. lin. 11 $\frac{1}{2}$. lat. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 473.

Faun. Svec. 2. 1050.

Diagn.

raga. Alæ omnes utrinque fuscæ: anticæ utrinque versus apicem ocellis punctisve binis contiguis; intra falciam aut maculam corticinam se�cis.

In sylvis nostris, passim.

Notæ constantes in omni Varietate, præter totas, nullæ. Neque *Ligeam* il. LINNÆI huc retinuem, nisi eius alas fuscæ; fascia fulva dixisset, que in omnibus fere varietatibus observantur, inter quas præcipuæ sequentes.

Var. 1. Alis supra nigrantibus: anticis macula oblonga, corticina, in medio coarctata, in qua ocelli tres utrinque: potticis maculis tribus, corticinis, quarum exterior ocellum, aliae punctum nigrum continent.

— infra pallidioribus; anticis ut supra maculatis posticis immaculatis.

2. Alis fuscis; anticis supra fascia corticina, in qua ocelli tres: infra eadem fascia cum ocellis tribus.

— — posticis supra fascia corticina, in qua ocelli quatuor minores: infra fascia pallidior, immaculata & cœca.

3. Alis fuscis: anticis supra fascia corticina, interrupta, in qua ocelli duo: infra, ut supra.

— — posticis supra ocellis quatuor; atmosphæra corticina: infra ocellis quinque; atmosphæra eadem.

4. Alis fuscis, anticis supra ocellis tribus; atmosphæra corticina: infra ocellis binis puncto nigro.

— — posticis supra ocellis quatuor: exteriore cæcutiente: infra ocellis quatuor puncto nigro exteriore.

5. Alis fuscis, anticis supra fascia corticina, in qua puncta tria nigra: subtus, ut supra.

— — posticis supra fascia corticina; punctis tribus atris: infra punctis tribus atmosphæra corticina cinctis.

437. PAPILIO *Cinxia*. $\text{— long. lin. } 10. \text{ lat. } 6\frac{1}{2}.$

LINN. Syst. Nat. p. 480.

Faun. Svec. 2. 1063.

ROSSEL. Tom. IV. Tab. 13. fig. 6. 7. &
Tab. 18. fig. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 73.

Diagn. Varietates nostræ hæcse notas communes habent.

1. Alæ supra corticinæ, fuscis maculis variegatæ;
2. Alæ utriusque margo albo-fuscoque varius;
3. Limbus alarum superne fuscus;
4. Alæ anticæ subtus corticinæ; apice posticis subtus concolore;
5. Posticæ subtus fasciis binis eiusdem fæpe coloris ac pagina inferior alæ anticæ;
6. Fascia antica alæ posticæ rivulosa.

In gramineis frequens.

Var. Alis posticis subtus

1. Paleaceis nigro maculatis; fasciis corticinis: anticæ insula unica.
2. —— nigro maculatis; fasciæ anticæ insula nulla.
3. —— nigro maculatis; fasciis abruptis.
4. Cereis, lineis transversis dentatis maculisque nigris.
5. —— fascia prima composita maculis (5) corticinis sublunatis, altera insulis binis.
6. —— fascia antica insulis tribus.
7. —— fascia antica insula nulla.
8. Paleaceis; fascia prima Var. 5. altera insulis binis.

438. PAPILIO *Paphia*. $\text{— long. unc. } 1. \& \text{ lin. } 4. \text{ lat. lin. } 10.$

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1064.

Ross-

Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 161

ROESEL. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 7. fig.

4. 5.

Diagn. Alæ corticinæ fusco-maculatæ: posticæ subtus virescentes; fasciis argenteis.

Passim circumvolat, etiam in fylvis.

Alæ *anticae* in limbo binis ordinibus macularum fuscarum, ad marginem superiorem rudi numerica inscriptione utrinque signatae, subtus ad apicem virescentibus maculis variegatae; *police* supra binis ordinibus macularum liturisque fuscis; subtus limbo fasciisque tribus argenteis, quarum *anticæ* binæ pyramidatae & abruptæ.

Var. 1. Alis anticis apice supernæ immaculatis; margine parumper fuscescente; posticis subtus ordinibus binis macularum rotundarum fusco-virescentium; limbo rubore quodam suffuso.

2. Alis ubique fusco-maculatis; margine fuscō.

3. Alis singulis supra murinis, fusco-maculatis: anticis subtus apice flavicantibus alibi pallidis; singularis hæc varietas in fylvis reperta, circa Idriam.

439. PAPILIO *Aglaja*.

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 8 $\frac{1}{2}$

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1065.

ROESEL. Tom. IV. Tab. 25. fig. 4. 5.

Qui ad solum numerum & nitorem macularum in his speciebus attenderit, is fane fallere & falli potest. Ego lubricas hasce notas expertus, limites dabo forte certiores, ne multiplicentur entia sine necessitate.

Diagn. 1. Ala antica ad marginem crassiorem lituris nigris quinque transversis, arabicas litteras referentibus, quarum quarta duplex.

2. Eadem venis parallelis fuscis striata.

3. Inter has venas maculæ rotundæ, liberae sex, quarum unica punctum est.

N

4. Ma-

4. Maculæ aliæ quatuor nigræ pariter, sed totum spatum inter venas occupantes.
5. Eadem ala subtus maculis in disco septem nigris.
6. Ala postica supra maculis submarginalibus lunatis nigris septem, quibus proximæ sunt aliæ tres maculæ rotundæ, duoque puncta nigra.
7. — — infra maculis (7) argenteis aut pallidioribus in limbo, totidem in medio transverili seriatæ, totidemque ad basim.

In pratis.

P. Aglaja LINN. alas posticas subtus anterius virescentes, nullasque maculas inter seriem posticam & medium argenteam positas, gerit, & paulo major eit.

P. Cydippe. LINN. Faun. Svec. 2. 1066. paulo minor, alas posticas subtus paleaceas, & maculas fature corticinas 4-5 inter duas posticas series argentearum locatas habet, quarum tres argenteum punctum in medio gerunt.

Hujus varietatem habeo, maculis alarum, quæ argenteæ sunt in aliis, in hac minime talibus & duntaxat pallidioribus.

440. PAPILIO *Lathonia*.

— long. lin. 11. lat. 7

LINN. Syst. Nat. p. 481. sed figura ROESELII hic citata non eit *Lathonia*, sed *Euphrosyne* meæ. Faun. Svec. 2. 1068.

Diagn. Convenit cum priore alis corticinis nigro maculatis sed differt

1. Alis singulis ad limbum supra binis ordinibus macularum, quarum plures subrotundæ.
2. Alis anticis subtus ad apicem maculis parvis argenteis (6-8).
3. Alis posticis subtus ad marginem externum maculis argenteis (7) inæquilibus,

libus, quarum duo penultimæ exteriore majora sunt.

4. — — — ordine macularum fuscescentium & argenteo centro notatarum, (7).

5. — — — maculis aliis usque (12) anterioribus argenteis sparso, inæqualibus, quarum ea quæ medium alæ tenet omnium maxima est, & cuneiformis.

In pratis.

Variat colore corticino plus minus exaltato, maculis nigris & fuscis, nec non alæ anticæ longitudine lin. (9).

441. PAPILIO *Euphrosyne*.

— long. a lin. $7\frac{1}{2}$. ad $11\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$ - 6.

LINN. Syst. Nat. p. 481.

Faun. Svec. 2. 1069.

ROESEL. Suppl. Papil. Diurn. Cl. I. T. 10.

Diagn. Vere difficilis ; mihi ex sequentibus notis, quæ propriæ omnibus.

1. Si obversum adspicias animal, in ala sinistra ad marginem crassiorem lituras quatuor anteriores ita figuratas habet ac si videres numerum (1071).

2. Ad limbum alæ utriusque supra series duæ macularum, quæ in antica sublunatae, in alia vero & interiore subrotundæ, nigræ.

3. Margo externus alæ utriusque niger.

4. Ala postica subtus maculis (7) marginalibus, pallidioribus, inæqualibus.

5. — — — dein sferie punctorum (6).

6. — — — cui succedit fascia pallida, constans maculis (8) inæqualibus & diversæ figuræ, quarum media cuneiformis major, & saepius argentea.

7. — — — supra hanc maculam majorem est punctum nigrum vel argenteum.

N 2

8. — ad

8. — — — ad basim maculæ (4)
pallidiores, intima & extima sæpius
argenteis.

In pratis, & collibus, frequens.

Aliæ omnes notæ fallaces & incertæ sunt, nam

- Var. 1. Alis posticis maculis supra (7) albidis
marginalibus.
2. — iisdem subtus fature corticinis, aut
subrubentibus.
3. — — — maculis marginalibus
albis & argenteis.
4. — — — punctis limbi fuscis cœ-
cis, aut puncto lucidiore vel argenteo
ocellatis.
5. — — — fasciæ macula majore
fola argentea.
6. — — — macula majore,
una cum extima & intima, argenteis.
7. — — — omnibus albi-
dis, nec ulla argentea.
8. — — — puncto prope basim ni-
gro, aut nigro & margine paleaceo, vel
argenteo.
9. — — — maculis baseos dua-
bus tribus vel quatuor argenteis.
10. Habeo & bina specimina alis anticis
supra fuscis, postice corticino nebulosis.
11. — — specimen alis albo-fuscoque
variis: posticis subtus maculis fasciaque
griseis.

442. PAPILIO *Prorsa*.

— long. lin. $8\frac{1}{2}$. lat. lin. $5\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 480.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. I. Tab. 8. fig.
6-7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 72.

Diagn. Alæ supra murinæ, subtus fusco-rufæ,
omnes utrinque fascia media alba, primoribus in-
terrupta.

In Carniola calidiore.

Utra

Utraque ala, præter fasciam albam, punctis & lineolis pariter albis variegata est, sed in hac specie alæ posticæ superne lineolas corticinas, in duas series limbo parallelas ordinatas prope limbum habent; subtus vero, alæ omnes, ad basim, albis lineis fere reticulatæ sunt. Præterea huic ala antica utrinque inter fasciam & apicem exhibet puncta alba (6), quorum quartum (a costa deorsum numerando), reliquis majus est & rotundum. Definitio Papilionis hujus a LINNAEO data, etiam sequenti convenit, et si omnino diversus sit.

443. PAPILIO Rivularis.

— long. lin. 11. lat. lin. 7.

Diagn. Supra niger, subtus rufo-castaneus; alis posticis utrinque fascia alba, maculis distinctis, (6-7), oblongis & angulatis facta.

Circa rivulos & aquas in sylvis volitat, Augusto M.

Alæ anticæ utrinque maculis tribus approximatis albis, intervallo trium vel quatuor linearum ab apice, dissitis; nec non macula elliptica, pariter alba, in medio, utrinque, sed versus costam colligata.

Var. 1. Alis anticis, utrinque, præter maculas quatuor dictas, aliis (4 & 8), inæqualibus, maculatis.

— posticis, fascia facta maculis septem, vel sex tantum cum puncto intermedio, loco maculæ septimæ.

2. Alis posticis subtus basi duabus, albis, oblongis, contiguis maculis.

— — — omnino albis; in qua varietate limbus alæ posticæ subtus puncta (7) nigra gerit.

3. Alis superne fuscescentibus; macularum obscuriorum seriebus binis in limbo, subtus fusco-ferrugineis; maculis iisdem limbi. Alæ posticæ basi pallide cæruleæ; maculis nigris.

Varietas hæc major prioribus, nec adeo nigricans.

II. H E X A P I.

(*) Equites.

444. PAPILIO *Machaon.*— long. unc. 1. & lin. $5\frac{1}{2}$. lat. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 462.

Faun. Svec. 2. 1031. cum optima
descripitione.ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 1
fig. 4. 5.

FRISCH. Inf. 2. Tab. 10. fig. 2. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 61.

Diagn. Alæ luteæ; limbo superne fusco macu-
lis anticarum (8), posticarum (6) luteis; macula
rotunda croci austriæci ruditer pulverisati colore.Habitat in *Dauco carota*, *Ruta graveol.* &c.

Alæ anticæ color supra

1. Niger, ad basim & initium limbi luteo
polline adspersus.2. Luteus, maculæ (3) ad marginem su-
periorem, (8) in disco: interioribus
majoribus, (8) in limbo, quarum tres
versus apicem subrotundæ cæteræ fe-
re hemisphæricæ.

— infra

1. Luteus.

2. Niger; fasciæ duo parallelæ posterio-
res, ad angulum alæ posticum in u-
nam confluentes; nervi in disco; ma-
culæ (3-4) obsoletæ ad marginem
crasiorem,

— posticæ color supra

1. Luteus.

2. Niger limbi.

3. Cæruleus macularum obsoletarum (6)
in limbo.4. Crôcatus maculæ ad angulum ani po-
sitæ; lunato nigro annulo circumdatae,
superne cærulecente polline sub an-
nulo adspersæ.

— — — infra

1. Luteus.
 2. Niger, nervorum & litorum transversarum, ac caudæ.
 3. Cæruleus sub quatuor litura ordinis anterioris.
 4. Crocatus maculæ ad angulum ani.
- Antennæ, lingua, abdomen supra nigrum.
Variat alis anticis basi & fascia limbi nigris,
luteo tamen polline adspersis.

445. PAPILIO *Podalirius*.

— long. unc. 1. & lin. 7. lat. unc. 1. & lin. 1.
ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 2. fig.

3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 62. Sinon. Tab.
2. fig. 1.

Diagn. Alæ supra albidae aut lutescentes; limbo fusco; anticæ fasciis inverse pyramidatis, fuscis, senis, alternis brevioribus; posticæ fasciis binis fuscis, tenuioribus.

Apud nos frequens, cœnosis in locis & circa aquas libenter sedens.

Alæ anticæ ad basim fasciis binis integris, cæteris ad oppositum marginem usque non productis.

— eadem subtus margine externo fasciisque (7) nigris, quarum media ad basim oblonga pallide lutea macula notata est; nulla harum fasciarum oppositum alæ marginem integre attingit.

— posticæ supra maculis lunatis cæruleis (4) limbo fusco immersis; margine dentato: dentium sinubus flavo margine præditis: dente quarto in caudam nigram lin. (7) longam: apice albida, producto. Ad angulum ani macula subrotunda nigra, puncto excentrico cæruleo ocellata, palpebra superiore crocata.

— subtus luteolæ fasciis (4) nigris, intermedis approximatis; maculæ (4) cæruleæ margine nigro; ocellus ad angulum ani ut supra.

(**) *Heliconii.*446. PAPILIO *Macaronius*. (†)

— long. lin. 10. lat.—

Diagn. Antennæ corpore nigro longiores, alæ luteæ: posticæ basi apiceque nigrae.
Unicum cepi circa Lariam, in herbido colle.

Antennæ nigrae, longæ; clava lata, obtusa, brevi. Caput lin. (2) crassum, hirsutum.

Alæ integerrimæ lanceolatae, subtus quasi vernice lucida oblitæ; anticæ nervulis reticulatae & seminudæ; maculis binis, fuscis, ex eo reticulo transparentibus; posticæ flavæ, lin. (8) longæ, latiores anticas; apice nigro.

447. PAPILIO *Apollo*.— long. unc. 1. & lin. 3 $\frac{1}{2}$. ad lin. 7. lat. 11-12.

LINN. Syst. Nat. p. 465.

Faun. Svec. 2. 1032.

ROESSEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 45.

fig. 1. 2.

P. PODA. Mus. Græc. p. 66. Rhea.

Diagn. Albidus totus; alis anticis utrinque maculis (3-4), nigris, posticis utrinque ocellis binis cinnaberinis; pupilla alba; iride nigra.

Habitat ad radicem alpium nostrarum, præferunt ad pedem M. Greben, Grindovitz, in Kankerthall, & supra Gariutsche inter Veldes & Vochein.

Huic, præter dicta, propria sunt. 1. Facies Papil. Cratægi, quo paulo major. 2. Nativitas circa dies caniculares. 3. Volatus latus, quo captu facilis redditur. 4. Macula nigra alæ anticæ marginem inferiorem spectans subrotunda. 5. Alæ ejusdem limbus fere nudus. 6. Ala utraque pellucens, strepens, subtus lucida nudiuscula. 7. Antennæ lin. (5) longæ; clava nigra; stipite albo-nigroque vario. 8. Ad basim alæ posticæ subtus maculæ duæ, cinnaberinæ.

Hujus

(†) In honorem Merlini Coccagi Poëta Mantuani lepidissimi, edito *Macaroniorum* opere clari.

Hujus causa potissimum, *Danai candidi Europæi*
Heliconiæ gentis Novitii facti in Faun. Svecica 2.

- Variat 1. supra ocellis pallide cinnaberinis, &
maculis binis atris ad angulum ani.
2. — ocellis cinnaberinis; pupilla
excentrica, maculis ad angu-
lum ani iisdem.
3. — ocellis iisdem, maculis ad an-
gulum ani rubro puncto no-
tatis.
4. — — — maculis hisce cin-
naberinis; margine nigro.
5. — ocello postico antice obtuso
aut emarginato.
6. — — eodem pupilla alba ge-
mina.

Larvam & pupam descriptis ROESELIUS. l. c.
p. 29 - 36.

448. *PAPILIO Cratægi.*

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 8½.

LINN. Syst. Nat. p. 467.

Faun. Svec. 2. 1034.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 3.
fig. 5, 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 62-63.

Diagn. Albus totus; alarum venis, præsertim
subtus, nigris.

Habitat in *Pruno domestica* & *Cratægo spin.*

Margo alarum anticarum sæpius denudatus, po-
sticarum non item; lunula nigra ad costam primo-
rum non semper adest. Conventicula instituit æsta-
te circa vias publicas, cœnosas, & circa rivulos.
Delectatur floribus *Braffææ* & *Salviae hortensis*.

Larva supra nigra, sub communi tentorio in
societate vivens, quod deserit Majo M. integras ar-
bores foliis suis sæpe denudans; maculis fulvis ad
latus utrumque undecim. *Pupa* flavicans, nigro-
maculata, antice acuminata; hinc natus *Papilio moe-*
conium roseum excernit, aut bolarem. *Femina*
antennæ clavam semifialbam gerit.

449. PAPILIO *Mnemosyne*.

— long. unc. 1. & lin. 2½. lat. lin. 8½.

LINN. Syst. Nat. p. 465.

P. PODA. Mus. Græc. P. Cratægi β. in litteris vero *Mnemosyne*.

Diagn. Simillimus P. Cratægi, sed diversus maculis binis atris subangulatis in ala antica qualibet, in medio, prope costam.

Circa *Labacum* captum misit R. P. WULFEN.

Huic antennæ lineas quinque longæ, nigræ. Alæ subtus splendidæ ac si vernice oblitæ forent.

450. PAPILIO *Braffæ*.

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 457.

Faun. Svec. 2. 1035.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 4. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 63.

Diagn. Albus; alis anticis supra costa apice que nigris, subtus maculis binis nigris subrotundis.

Pallidum reperitur.

Variat 1. alis anticis utrinque maculis binis nigris.

2. — — supra absque maculis.

3. — posticis in medio marginis superioris macula nigra.

451. PAPILIO *Rapæ*.

— long. lin. 11. lat. 6½.

LINN. Syst. Nat. p. 468.

Faun. Svec. 2. 1036.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 5. fig. 3. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 63-64.

Diagn. Ala antica uncia non longior, macula nigra saltem subtus notata; alæ posticæ subtus fere sulphureæ atomis fuscis adspersæ. Antennæ clava apice corticino.

Habitat in *Braffæ oleracea*.

Variat 1. alis omnibus immaculatis, anticis subtus maculæ nigræ vestigium litteræ latinæ (V) simile gerentibus.

2. alis

2. alis anticis apice fuscescente, supra macula una nigra, subitus binis: media nigra majore emarginata, altera obsoleta.
3. alis anticis apice maculaque una superne, subitus binis atris: media maiore.
4. — — apice, maculisque binis utrinque fuscis, subitus obsoletis.
5. — — apice fusco, maculis binis & qualibus nigris utrinque.
6. — — apice fere excolere, maculis binis nigris & qualibus utrinque.

Larva viridis, villosofa, ocello luteo: pupilla nigra, utrinque in singulis segmentis. Pupa luteovirens, antice acuminata; linea dorsali eminente & laterali pallidioribus; punctis luteis sub linea laterali tot quot segmenta posticæ partis. Post dies aliquot eadem albidi redditur, & omnem sensim viorem exuit.

452. **PAPILIO Sinapis.**

— long. lin. 9½. lat. fere 6.
LINN. Syst. Nat. p. 468.
Faun. Svec. 2. 1038.

Diagn. Minor priore, albus totus; alis anticis absque maculis in medio & solis apicibus supra saepius fuscescentibus.

Ruri, & circa hortos, passim degit.

Variat 1. alis omnibus totis albis, nec apice fuscis.

2. — anticis apice supra fusco veluti polline leniter inquinatis.

3. — — apice toto fusco.

4. — — apice toto nigricante.

Antenn. capitulum apice nigrum, corticineo tamen puncto notatum.

453. **PAPILIO Napi.**

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN.

LINN. Syst. Nat. p. 468.

Faun. Svec. 2. 1037.

Diagn. Statura sequentis. Alæ subtus lineis
obscürioribus juxta nervos decurrentibus varie-
gatæ.

In *Braffica*.

Variat 1. alis albis, basi nigricantibus: anticis
apice fuscis; utraque subtus lituris
longitudinalibus, juxta venas de-
currentibus, glaucis.

2. alis supra osleis; lituris murinis; sub-
tus albis; lituris fuscis.

454. PAPILIO *Cardamines*.

— long. lin. 9. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 468. mas.

Faun. Svec. 2. 1039. mas.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 8. fig.
5. ♂. fæmina. 7. 8. mas.

Diagn. Alæ utriusque supra prævalens color al-
bus; anticæ in medio versus marginem crassiorem
macula alterius coloris utrinque; posticæ subtus vi-
ridi nebulofæ.

Habitat in *Nasturciis*, præsertim *Cardamine*.

Mas minor alis *anticis* basi albis, apice fuscis;
spatio ab his coloribus relicto aurantio; macula
fublunata parva nigra libera in medio posita intra
aurantium colorem. Eadem ala subtus basi isabel-
lata; apice albido venulisque glaucis variegato, ali-
bi aurantiæ seu colore *Agarici chantarelli* cum ma-
cula nigra, ut supra.

— alis *posticis* supra albis, subtus pariter albis
sed viridi nebulosis.

Variat 1. alis anticis apice superne fuscis; pun-
cto utrinque medio semi ovali.

2. — — apice utrinque fuscis;
puncto nigro subro-
tundo.

3. — — absque puncto utrinque.

Fæmina alas albas gerit, anticas ad apicem fusco-
maculatas, absque aurantio colore; maculæ illæ sub-
tus

tus virecentes sunt, ut & pagina inferior alae posteriorum viridi-nebulosa.

Variat 1. alis anticis supra macula lunata libera apicibusque fuscis, posticis rivulose viridi-nebulosis.

2. alis anticis macula angulata libera apicibusque fusco-nebulosis, posticis subtus fasciatim viridi-nebulosis.

3. alis anticis macula angulata marginem proximum contingente fusca; apicibus fusco-nebulosis; posticis subtus ut in Var. 2.

4. alis anticis maculis binis didymis oblongis apicibusque fusco-nebulosis.

455. PAPILIO Hyale.

— long. unc. 1. lat. lin. 6 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 469.

Faun. Svec. 2. 1040.

ROESEL. Suppl. Cl. II. Pap. diur. Tab. 46.

fig. 4. 5.

Diagn. Alae supra concolores: anticæ margine externo, apiceque supra nigrae; macula media utrinque nigra; posticæ subtus ocello medio, subargenteo, cæco; omnes, præterim subtus, rubella firmaria terminatae.

In herbidis locis, & subsylvestribus non rarus.

Antennæ lin. 3 $\frac{1}{2}$. longæ; stipite rubello; clava obtusa, obscuriore. Alae posticæ in medio macula aurantia, subtus limbo punctis (4-5) fusciscentibus, variegato. Volatus celer; inquietum animal it redditque saepius eadem fere via, floribus non diu infidens.

Mas alis aurantiis, subtus pallidioribus; utriusque limbo superne nigro: anticis subtus punctis vel maculis tribus in limbo fuscis.

Variat 1. Maculis binis, flavis, alarum primorum fusco limbo immersis; alis posticis subtus ocello medio, cæco, sesquialtero, argenteo.

2. Alarum anticarum limbo fuso, absque maculis luteis; posticis ocello Var. 1.

2. Lim-

3. Limbo alarum anticarum immaculato;
ocello subtus posticarum unico tubar-
genteo.

Fæmina alis sulphureis: anticis limbo maculis
sulphureis variegato; posticis absque limbo fusco.

Variat 1. Alis posticis subtus ocello unico.

2. — — — — fesquialtero.

3. Alis supra pallidioribus: posticis lim-
bo subfuscō, subtusque ocello fesqui-
altero.

An ergo *Papil.* Trite Ill. LINNÆI huc referen-
dus, examinent autoptæ.

456. PAPILIO *Rhamni.*

—. long. unc. 1. & lin. 2. lat. $7\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 470.

Faun. Svec. 2. 1042.

ROESSEL. Suppl. Cl. II. Papil. Diurn.
Tab. 46. fig. 7. mas.

— fig. 2. fæmina.

P. PODA. Mus. Græc. p. 65.

Diagn. Alæ utrinque concolores, angulatæ:
singulæ in medio puncto superne aurantio, subtus
æneo-ferrugineo, notatæ.

Pasim occurrit, sed larvam in *Rhamno* non-
dum vidi.

Antennæ deflexæ, rubellæ, extrosum craf-
fiores; apice fusco, lin. ($4\frac{1}{2}$) longæ. Thorax &
abdomen basi albido sericeis longis villis pube-
scentia.

Mas alis sulphureis.

Fæmina — pallidioribus.

Martio & Aprili M. jam circumvolat.

457. PAPILIO *Amyntas.*

—. long. lin. 8. lat. lin. $5\frac{1}{2}$.

R. P. PODA. Mus. Græc. p. 79.

Diagn. Alæ anticæ corticinæ; limbo fusco, cui
subtus immersus est unicus ocellus prope apicem.
Posticæ fuscescentes; subtus fascia dentata alba &
ocellis sex: quinis infra, uno supra fasciam.

Habitat in herbidis & subsylvestribus, non in-
frequens.

Alæ

Alæ posticæ iupra ad angulum ani tuvo colore tinctoræ. Ante ocellum alæ anticæ subtus est macula albida. Fascia posticarum, apud nos, alba. Ocellus solitarius, sub alis posticis, adiacet margini superiori; ocellus anguli ani minimus, duo huic proximi maximi sunt.

458. PAPILIO *Menalcas*.

—. long. lin. 7. lat. lin. 4½.

P. PODA. Mus. Græc. p. 78.

Diagn. Alæ primores utrinque, posticæ supra tantum, pallide ochreaceæ. Ad apicem alæ anticæ est macula aut punctum nigricans, quod subtus ocellus est.

Habitat apud nos passim.

Alæ rotundatae, ut in priore; limbo plus minus fuscescente; fimbria cinerea. Alæ anticæ subtus apicem posticis alis concolorem habent. Ocelli pupilla est punctum album, iris nigra, quam ambit annulus alæ pagina pallidior. Ab alæ posticæ margine superiore descendit ad medium usque fascia repanda, supra quam ala eadem obscurior est, quam versus limbum.

Papiliones hi *Heliconii* potius, quam *Ruralibus* adnumerandi.

(***) *Rurales*.

459. PAPILIO *Pruni*.

—. long. lin. 8. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 482.

Faun. Svec. 2. 1071.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 7.

fig. 4. 5.

Diagn. Alæ concolores supra fuscæ, subtus pallidiores: posticæ caudula nigra: apice alba, supra ad angulum ani macula colore gummi cerasorum, subtus linea transversa alba.

Reperitur etiam ubi *Prunus* nulla.

Papilio ROESELII omnino noster est a LINNÆO quoque citatus ibidem, et si alas posticæ in Fauna Svecica aliter describat, ac ego coram habeo. Et sane, si unquam, certe in hac profapia facilis est multiplicatio specierum, quoties ex una aliave no-

notula characteres specifici desumuntur. In nostris varietatibus haec nota communes sunt. 1. Antennae fuscæ, annulis albis variegatae; clava subtus & apice fulva. 2. Oculorum margo albus. 3. Pectus cinereo-cærulescens. 4. Alæ supra fuscæ, subtus pallidiores, & nunquam obscure-cinereæ. 5. Sub utraque ala linea alba constans lineolis in unam seriem disposita. 6. Prope caudam alæ posticæ subtus maculæ duæ saltet saturato gummi cerasorum colore tinctæ, subhemisphæricæ: apice nigro.

Variat 1. Lineola sub alis posticis obsoleta, sub anticis fere nulla.

2. Maculis sub ala postica in limbo 3-5.

460. PAPILIO Rubi.

—. long. lin. $6\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1077.

Diagn. Alæ supra pallide cervinæ, subtus virescentes: posticæ femiden atæ.

In Kubo.

Alæ posticæ subtus punctis (4-5) albis; intimo dente incurvo.

461. PAPILIO Argus.

Diagn. 1. Alæ supra concolores, sine maculis ocellaribus, margine obscuriore albaque fimbria terminato; subtus alio eoque pallidiore colore tinctæ; maculis ocellaribus multis atris plerumque rotundis, iisque pluribus sub posticis, quam sub anticis alis.

2. Alis posticis subtus basi cæruleis.

3. Maculis prope discum alæ anticæ subtus rotundioribus, senis.

4. Maculis prope discum alæ posticæ septem, in unam quasi seriem dispositis.

5. Antennæ fipite nigro, annulis albis variegato; clava tenui.

6. Oculis fusco-castaneis, ante & postice lineola alba notatis.

7. Margo superior seu crassior alarum antistarum albus.

8. Facies, volatus, alarum figuræ, propria partium, omnibus his eadem.

P. *Arion.*

— long. lin. 10. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1073.

ROESEL. Suppl. Papil. Diurn. Cl. II. Tab.

45. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ fuscæ; disco cœruleo, fuscis maculis variegato.

In sylvestribus locis.

Ala antica subtus prope basim puncto nigro rotundo, dein macula subcordata, postea serie transversa repanda macularum (7); quarum extima punctum est, dein in limbo duo ordines punctorum (7). — postica absque fascia maculosa fuscis ad limbum.

Variat statura minore, & macula ovata in medio alæ anticæ subtus, loco maculæ cordiformis.

P. *Argus.*

— long. lin. 6½. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1074.

Diagn. Alæ subtus canæ: postcæ fascia crocata, dentata, subtus prope limbum.

In herbidis collibus.

Alæ, apud nos, supra fuscæ, fimbria albo fuscoque varia terminata; anticæ maculis duabus cuneiformibus, cœruleis, longitudinalibus, contiguis, ad basim superne positis, quarum una altera duplo major; ad apicem maculæ cœruleæ majoris, macula nigra jacet. En Arionis in Argum degenerantis argumentum! Eadem ala subtus ordine interno macularum limbi in fasciam coeuntium. Ala postica subtus inter ordines binos macularum limbi crocato colore tintita. Nulla harum alarum macula iride lucidiora cincta est.

P. *Argiolus.*

— long. lin. 5. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 483.

Faun. Svec. 2. 1076.

O *Diagn.*

Diagn. Alæ supra cæruleæ, alba fimbria terminatae: posticæ punctis nigris & absque maculis crocatis aut fulvis in limbo.

Cum priore.

Ill. LINNAEUS posuit puncta nigra, parva, decem, sparsa, sub alis secundariis, quæ apud nos etiam duodecim occurunt.

Papilio ROESELII quartus Tab. 37. Cl. 2. Papil. diurn. huc pariter reduci posset, cum alæ ejus posticæ subtus careant maculis fulvis.

Varietatem habeo, alis supra fuscis, anticis unico ordine macularum in disco.

P. *Idas.*

—. long. lin. $6\frac{1}{2}$. lat. 5.

LINN. Faun. Svec. 2. 1075.

Diagn. Alæ supra ut in *Argiole*, sed posticæ subtus ordine macularum crocatarum in limbo.

Cum prioribus volitat, & circa rivulos congregatur.

- Variat
1. Alis supra cæruleis: *anticis* fimbria alba nigro-punctata terminatis, punctis subtus ad basim tribus, dein unico oblongo, postea septem, denique binis ordinibus macularum fuscarum in limbo; *posticis* punctis tribus ad basim, dein (9) in disco, denique maculis limbi crocatis subhæmisphericis (9) margine nigro & ad basim nigra macula sub singulis.
 2. Alis iisdem, sed fimbria *anticarum* alba, iisque subtus macula nigra in medio, dein ordine uno macularum (6), denique limbo maculis (3-4), crocatis, obsoletis; quibus ad basim subjacet punctulum fuscum; *posticarum* maculis crocatis pariter ad basim puncto fusco notatis.
 3. Alis iisdem, sed posticis subtus maculis crocatis (9) conicis, quarum quælibet, excepta extima & intima, maculam nigram ad basim habet.
 4. Alis iisdem, sed posticis ad limbum maculis crocatis obsoletis, fusca macula suffultis.

5. Alis

5. Alis supra fuscis; posticis subtus cervinis, supra maculis in limbo (3-4) crocatis, subtus maculis iisdem conicis (8), quibus ad basim punctum nigrum.
6. Alis iisdem, anticis supra in limbo maculis crocatis obsoletis (3-4); subtus (4-5) apice fuscis, basi puncto fusco notatis; posticis supra maculis crocatis submarginalibus (4-5), subtus (8) conicis, puncto fusco ad basim signatis.
7. Alis iisdem, subtus canis, omnibus in limbo utrinque maculis crocatis, in unam seriem dispositis.

P. Coridon.

— long. lin. 7. lat. $5\frac{1}{2}$.

P. PODA. Mus. Græc. p. 77-78.

Diagn. Alæ supra cæruleo-argenteæ, limbo fusco.

In Carniola calidiore.

Alæ anticæ subtus canæ; posticæ subtus cervinæ; maculis submarginalibus, crocatis, conicis (7).

P. Alexis.

— long. a lin. 6. ad 8. lat. $3\frac{3}{4}$ -5.

Diagn. Alæ supra fuscæ, fimbria alba: posticæ utrinque maculis crocatis.

In sylvestribus.

Variat 1. Alis anticis supra puncto in medio nigro & maculis crocatis in limbo (6).
— — subtus cinereis, maculis ocellaribus in disco (7), crocatis limbi (6) punctisque fuscis marginalibus totidem.

— posticis supra maculis crocatis, lumnatis, in limbo, (4-5).

— — subtus cinereis; maculis crocatis in limbo (9); quarum tres ad angulum ani coalitæ.

2. Alis anticis supra, punto medio obscuriore, maculisque limbi crocatis (3-4).

O a

Alis

- Alis anticis subtus maculis ocellaribus (10), maculisque crocatis in limbo (6).
 — posticis supra maculis crocatis ocellaribus (4-5);
 — — subtus maculis iisdem (9).
3. Alis anticis supra immaculatis, subtus maculis ocellaribus (9), tribusque crocatis, obsoletis in disco.
 — posticis supra maculis lunulatis, crocatis, in limbo (3-4), subtus (9).
4. Alis anticis supra punctis obscurioribus in disco (9), crocatis nullis.
 — — subtus cinerascentibus maculis fuscis, subocellaribus in disco (11); binisque seriebus (in quilibet (6)) similiter coloratis, in limbo, cum intermediis (3-4), crocatis.
 — posticis supra fulco-punctatis, maculis crocatis in limbo (3-4), obsoletis.
 — — subtus maculis disci subocellaribus (17), binisque seriebus punctorum fuscorum in limbo, quibus interjacent crocatae maculae (7).

An hic *Tityrus*. R. P. PODA. *Mus. Græc.*
p. 77. ? videtur utique.

462. PAPILIO *Virgaureæ*.

— long. lin. 6-8½. lat. 4½. — 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 484.

Faun. Svec. 2. 1079.

Diagn. Alæ anticæ fulvæ; margine externo, maculisque subtus atris; posticæ ad angulum ani binis dentibus instructæ.

In Carnioliae prati, non rarus.

Sexus unus, alis omnibus supra sericeo nitore fulvis; anticis margine crassiore & limbo nigris; posticis margine undique nigro.

REESSEL. Suppl. Cl. II. Tab. 45. fig.
5. 6.

Ma-

- Major, alis anticis subtus maculis nigris (11),
quarum octo transversim in unam se-
riem ordinatae,
— — posticis versus basim punctis (4)
nigris, postice serie una macularum
albarum nigro puncto terminatarum.
Sexus alter, alis anticis supra fulvis; margine
toto maculisque octo fuscis; quarum
tres posticæ sèpius conjunctæ; subtus
maculis ocellaribus (10): duabus infi-
mis in unam cohærentibus.
— — posticis murinis, punctis ad
(15) nigris, maculisque lunatis ful-
vis in limbo, (5-6); supra vero
fuscis, fascia limbi dentata fulva.
ROESEL. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 37.
fig. 6. 7.

463. PAPILIO *Comma?*

— long. lin. 6½. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 484.

Faun. Svec. 2. 1080.

P. PODA. Mus. Græc. *Sylvestris*.

Diagn. Alæ concolores corticinæ; limbo fu-
fco. Caput crassum; antennis unco terminatis.
In *Sylvestribus*.

Noster caret maculis pallidis albidisque, cæ-
terum idem cum *Linnæano*, juxta descriptionem da-
tam in *Fauna Svecica*.
Sexus unus habet lineam nigram obliquam in me-
dio paginae superioris alæ anticae cuiusque.
— alter caret hac linea, & pallidior est.
— Uterque sedens, gerit alas subereatas.

464. PAPILIO *Morio.*

— long. lin. 6-7. lat. 4-5.

Diagn. Fuscus totus; alis subtus maculis pal-
lidioribus.

Habitat cum priore. —

Var. 1. Alis supra totis fuscis; punctis albidis,
marginalibus.

ROESEL. Papil. Diurn. Cl. III. Tab. 10.
fig. 5, 6.

♂. Alis anticis supra albo punctatis; fimbria
albo fuscoque varia; subtus albo ma-
culatis, eademque fimbria; posticis u-
trinque simili fimbria, subtus albo sor-
didoque varis.

ROESEL. l. c. fig. 7.

P. PODA. Mus. Græc. p. 79. *Fritillarius.*

S P H I N X.

LINN. *Syst. Nat.* p. 489.

(*) *Metamorphosi occulta, sub terra.*

465. SPHINX *Ocellata.*

— long. unc. 1. lin. 4-6. lat. 9-9½.

LINN. *Syst. Nat.* p. 489.

Faun. Svec. 2. 1083.

ROESEL. Papil. Nocturn. Cl. I. Tab. 1.
fig. 3, 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Alæ anticæ subangulatæ, posticæ ocel-
lo magno superne notatæ. Os elingue.
Habitat in *Salice viminali.*

Alæ anticæ linea cana arcuata, una extremitate
apicem alæ, alia angulum posticum at-
tingente, alibi supra canæ lituris trans-
vervis caffè colore variegatæ.

— — subtus disco baseos cinnaberino aut
vinoso; prope limbum fascia dupli-
fusca, margine caffeo, præsertim in-
ter apicem & dentem alæ secundum.

— posticæ supra vinosa aut rubella, margine caff-
eo, maculaque ophthalmoides tres
lineas longa, pupilla fuscescente, iride
albida, atmosphæra nigra.

— — subtus canescentes, sed atomis caffè
colore ubique adspersæ, fasciisque bi-
nis canis.

An-

Antennæ rufæ. Thorax macula dorsali, magna, caffea.

466. SPHINX *Populi.*

— long. unc. 1. & lin. 6. lat. 10.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

Faun. Svec. 2. 1084.

Diagn. Corporis alarumque color primarius utrinque cinereus. Alæ omnes dentatæ: antice supra puncto albo medio, postice basi moscatinæ. Antennæ osseæ.

Habitat in *Salice rubra*.

Corpus totum cinereum, sed oculi nigri & abdomen supra colore quodam moscatino inquinatum. Alarum sedentis situs peculiaris, nempe anticæ suberectæ & versus caput tendentes, posticæ deflexæ & posteriora corporis spectantes. Os bilingue.

467. SPHINX *Tiliæ.*

— long. unc. 1. & lin. 1½. — 3. lat. 6½. — 8.

LINN. Syst. Nat. p. 489.

Faun. Svec. 2. 1085.

Diagn. Alæ anticæ finuato-dentatae; maculis duabus, obscurioribus, fasciam præferentibus: una maiore, aliaque alba ad apicem basi dente notata. Habitat in *Tilia* & *Salice*.

Var. 1. Corporis alarumque colore primario corticino utrinque.

2. Partium omnium colore primario ochreaceo; maculis cervinis.

3. Corporis alarumque supra colore primario osseo; maculis ferrugineis; subtus vero potius ferrugineo.

4. Alis anticis supra maculis umbrinis; disco subrubente; limbo utrinque fusco-limoniatō.

— — subtus basi ferrugineis; limbo virescente.

— posticis supra nuceis; subtus limbo virescente.

Huic proxima ROESELIANA. fig. 5. 6. Tab. 2. Papil. Noct. Cl. I. Huic etiam uni conveniret
O 4 de-

deter puto C. L. LINNAEI. Faun. Svec. FRISCHII figura 3 Tab. 2 fig. 7 alæ maculam majorem tuberculatam habet, quam ego nondum vidi.

Sed & omnibus communis sunt antennæ supra albæ, subtus ochreaceæ; alæ posticæ fascia obscuriore obsoleta; larva virescens, calami scriptorii crassitie; lineis lateralibus obliquis lutescentibus; cornu ani cœrulecente; maxillis nigris; quæ in pupam mutanda se se sepelit intra terram, altero anno insectum paritura. Sic brevis vitæ vermis, consummato humili vitæ cursu, sepultus obdormit, ut resurgat gloriösus.

468. SPHINX *Convolvuli.*

— long. unc. 2. lat. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 490.

ROESEL. Pap. Noct. Cl. I. Tab. 7. fig. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Lingua alarum anticarum longitudinem superans. Abdominis acuminati latera fasciis rubris & nigris alterne variegata.

Apud nos non rara.

Corporis alarumque color primarius supra cinereus est, licet alæ anticæ atomis lineisque nigris passim nebulosæ, posticæ vero fasciis fuliginosis notatae se prodant. Margo exterior alæ utriusque non penitus integer, sed lenissime crateratus & subrepandus. Ala utraque subtus unicolor & corpore obscurior, margine albis punctis variegato, nullisque fasciis posticarum. Antennæ apice subtus denticulatae. Abdomen utrinque fasciis lateralibus nigris (6), totidemque rubris interpositis. Sub abdomine griseo, duo puncta nigra sunt.

469. SPHINX *Atropos.*

— long. unc. 1. & lin. 11. lat. unc. 1.

LINN. Syst. Nat. p. 490.

ROESEL. Suppl. Cl. I. Papil. Noct. fig. 5. 6.

P. PODA. Mus. Græc. p. 81.

Diagn. Bicolor, nempe ochreacea & nigricans; antennæ tamen apex & punctum medium alæ anti-

ticæ supra alba sunt. Alæ posticæ ochreaceæ; fasciis binis, nigris, utrinque.

Irritata stridet ut *Cerambyx*.

Habitat in *Cannabi*, & *Erythronium*, in quibus lar-
vas ipse vidi, iisque enutrivi. Visa etiam in *Pyro-*

Lingua antennis brevior, canaliculata, abdomen fere inane, cartilagineum, ochreaceum: fasciis nigris. In dorso macula ochreacea calvariam referens. Sub alis anticis in medio fascia nigricans inferiorem marginem non attingens. Tibiae spinosæ Color ochreaceus idem, qui sub alis *Turdi Musici*.

Larva irritata stridens, uncias tres longa, septem lineas crassa, flavescens; striis lateralibus, obliquis, cærulefcientibus; corniculo caudali flavis verrucis scabro; pedibus pectoralibus nigris: albo punctatis; 21. Septemb. se se sepelit intra terram, sub qua fornicem proprio glutine parat, non vero folliculum, unde 10. Junii alterius anni prodiit animal.

470. SPHINX *Ligustris*.

— long. unc. 1. & lin. 8½, lat. lin. 11.

Linn. Syst. Nat. p. 490.

Faun. Svec. 2. 1037.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. I. Tab.
5. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ posticæ supra rufæ; fasciis binis, nigris. Abdomen rosatum; linea dorsali & fasciis lateralibus utrinque quinque atris.

Habitat in Salice, Fraxino.

Antennæ supra albæ subtus fuscæ. Caput inter antennæ albidum, unde utrinque decurrit plaga alba thoracem inter & alæ basim. Thorax alibi niger. Abdomen subtus tribus lineis nigris longitudinalibus. Pedes fuliginosi.

Alæ anticæ supra obsolete rufæ; disco fuscescente; lineis nigris longitudinalibus, unaque media transverfa, linea alia alba prope marginem exteriorem.

— — *prope marginem extenuata, subtilis, obscuriores; fasciis binis obsoletis, fuscescentibus, prope alæ marginem inferiorem in unam conjunctis,*

apice linea nigra, maculaque albida inter hanc lineam & marginem crassiorem. Alæ ejusdem limbus pallidior.

Alæ posticæ supra præter fascias dictas, etiam tertiam habent prope basim sed ad marginem exteriorem usque non productam.

— — subitus fascia fusca duplicita: antica obscuriore; pagina alæ inter has fascias albicante.

471. SPHINX *Euphorbiae*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 492.

Faun. Svec. 2. 1086.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 3. fig.

4. 5.

FRISCH. Ins. 2. Tab. 11. fig. 7. p. 43-45.

Diagn. Dorsum nuceum; lateribus albis. Alæ omnes subitus, corpusque rosato colore tinctæ; posticæ supra basi fasciaque nigris; anticæ subitus macula disci nigra.

Habitat in *Euphorbia*.

Alæ anticæ supra subincarnatae macula ad basim, alia in medio, fasciaque pyramidali nuceo colore tinctis; fascia hæc basi sua incumbit margini interiori, apex vero in apice alæ definit.

— posticæ supra rosatae, limbo pallidiore, margine interno inter fascias albo.

Abdomen supra nuceum, cingulis lateraliter albis, maculisque duabus ad basim lateralibus utrinque nigris.

472. SPHINX *Elpenor*.

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 491.

Faun. Svec. 2. 1089.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 4. fig.

5. 6.

FRISCH. Ins. 12. Tab. 1.

Diagn.

Diagn. Bicolor, paleaceo nempe & pudorino colore tinctus; alis posticis supra basi nigris.

Habitat in *Epilobio angustifolio*.

Pudorino colore tincta sunt, corpus totum subitus excepto abdominis medio, alae posticæ supra, infraque pars maxima, dorsum postice, abdominis apex latera & linea dorsalis, thoracis linea a rostro per latus utrinque decurrentis, alarum anticarum fasciæ alternæ; reliqua paleacea sunt; sed punctum album in medio alæ anticæ supra, eiusque margo inferior pariter albus.

473. SPHINX *Pinastris*.

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 9.

LINN. Syst. Nat. p. 492.

Faun. Svec. 2. 1088.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 6. fig.

4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 80.

Diagn. Alæ canæ; anticæ in medio lineis tribus inæqualibus caffeatæ; cingulis abdominis lineisque lateralibus in dorso thoracis pariter caffeatæ.

Habitat in *Pino*.

Abdomen basi maculis albis lateralibus utrinque tribus; inter alas anticas & thoracem alba linea, antennæ ferrugineæ; rachi interdum albida.

474. SPHINX *Stellatarum*.

— long. lin. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1091.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. I. Tab. 8. fig.

5. 6.

Diagn. Alæ anticæ supra umbrinæ; fasciis binis, obscurioribus; posticæ supra ochreaceæ basi & margine obscuriores. Pectus album. Volatus diurnus, rapidissimus.

Habitat in *Galio*.

Antennæ clavatae, umbrinæ, lingua breviores, aristatae: arista ad angulum rectum. Caput & dorsum umbrinum. Abdomen in medio thoraci concolor; ano barbato, obscuriore; lateribus albo-nigro-

groque variis barbatisque. Caput subitus album.
Femora albida.

Alæ anticæ inter fascias puncto eisdem concolore,
similique macula versus apicem.

— — subitus ferrugineaæ, limbo obscuriore.

— posticæ subitus totæ ferrugineaæ; margine lucidore.

Expansis alis, nec sedens, exerta lingua, nectar florum haurit, autumno etiam circumvolans.

475. SPHINX *Fuciformis.*

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1092.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. I. Tab.
38. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. p. 82.

Diagn. Abdomen barbatum nigrum; fascia flavescente. Alæ hyalinæ venis & margine obscurioribus.

In *Lonicera, Scabiosa.*

Periit mihi hæc & sequens, hinc mensuras alarum, verosque colores, definire non licet. Statura tamen minor est quam in priore. Alæ pellucidae. Volatus diurnus. Metamorphosis occulta?

476. SPHINX *Culiciformis.*

— long. — lat. —

LINN. Syst. Nat. p. 493.

Faun. Svec. 2. 1094.

P. PODA. Mus. Græc. p. 81.

Diagn. Alæ subnudæ: anticæ lanceolatae; margine fascia nigra. Abdomen barbatum pilis lateribus apice albis, atro-ceruleum; cingulo medio fulvo-rubro.

Inveni in floribus *Sambuc. ebuli*, sub *Arce Veldensi*. Julio M.

Corpus semiunciale. Volatus tardus, diurnus. Alarum margo pilosus.

477. SPHINX *Scopigera.*

Diagn. Statura *Vespæ Parietum*. Abdominis segmenta margine flava, apex terminatus pilis rotundum ventilabrum præferentibus.

Ha-

Habitat in herbidis & sylvosis collibus *Carnioliae* super. interdiu nectar florum hauiens. Nigra. Inter caput & thoracem annulus flavus. Ad basim alae anticæ punctum flavum. Thorax villo folido pubescens. Alæ margine fasciaque nigris; apice fulvo venisque nigris lineato. Abdomen nigrum; scopa terminali binis flavis lineolis in medio notata. Pedes nigri. Tibiæ pilosæ; spinis fulvis.

An hæc *Sphinx Vespiiformis* LINN. Faun. Svec?

(**) *Metamorphosi manifesta*, supra terram.

478. SPHINX Carniolica.

— long. lin. 7. lat. 3.

Diagn. Nigra; alis anticis umbrinis; maculis (5) cinnaberinis: margine albo; posticis cinnaberinis, immaculatis.

In *Carniola* non rara.

Statura S. *Filipendulae*. Inter caput & thoracem linea transversæ albæ, linea alia in thoracis latere utroque. Maculæ alarum anticarum una vel duæ connatae cuneiformes ad basim, tres subrotundæ in disco, quinta in limbo oblonga transversa. Subtus ala eadem similiter maculata, sed albus margo macularum obsoletus. Alæ posticæ untrinque cinnaberinæ; margine nigro.

Folliculus ovatus, palleaceus, lœvis, latere adhærens folio. Pupa, post partum, prominens ex apice trivalvi sui folliculi.

479. SPHINX Filipendulae.

— long. lin. 7. lat. 3½

LINN. Syst. Nat. p. 494.

Faun. Svec. 2. 1097.

ROSEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 57. fig.

5. 6. 7.

Diagn. Nigra; alis anticis cyaneis, rubro maculatis; posticis cinnaberinis, immaculatis.

In pratis nostris frequens.

Mas alis anticis maculis (6) cinnaberinis, absque iride alba; quarum duæ ad basim alæ, aliæ quatuor subrotundæ in disco. Huic convenit descriptio *Linæana*.

Va.

190 *Sphinx.* ORDO III. *Sphinx.*

Variat thorace canis pilis tomentoso, maculisque duabus posticis alæ anticæ in unam coadunatis.

Femina; alæ anticæ maculis tribus, oblongis, longitudinaliter, variegatae.

Folliculus rugosus, oblongus, utrinque acuminatus, membranaceus.

480. SPHINX *Phegea.*

— long. lin. 8. lat. 5 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 494.

FRISCH. Infect. 6. Tab. 15. fig. 7.

Diagn. Atro-cærula; alis anticis maculis albis (6); abdominis macula baseos, cinguloque palleaceis.

In sylvestribus *Carnioliae*, umbrosisque locis.

Antennæ filiformes, nigræ, apice albæ. Macula in alis anticis una minor ad basim, duo in medio, tres prope limbum, utraque in pagina. Alæ posticæ utrinque maculis binis albis. Abdominis segmentum quartum superne & lateraliter palleaceo colore tinctum, macula simili superne ad basim abdominis, duæque aliæ utrinque ad latera pectoris, sub alis.

481. SPHINX *Statices.*

— long. lin. 6. lat. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 495.

Faun. Svec. 2. 1098.

P. PODA. Mus. Græc. p. 83.

Diagn. Alæ anticæ supra viridi-cærulescentes, subtus una cum posticis utrinque umbrinæ. Antennæ maris pectinatae.

In collibus herbidis, non rara.

Conjungit *Sphinges* cum *Phalænis Bombycibus*, quarum antenas habet; hic tamen relinquenda ex habitu, volatu gravi diurno, summaque cum tribus prioribus similitudine.

PHA-

PHALÆNA.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 495.

I. *Bombyces.* Pupa intra folliculum.

(*) —— *expositum.*

A. Elingues.

482. PHALÆNA *Pavonia.*

— long. unc. 2. & lin. 8. lat. unc. 1. & lin. 8.

LINN. *Syst. Nat.* p. 496. 497.

Faun. Svec. 2. 1099.

ROSEL. Inf. Tom. 4. Tab. 16. 17.

SPECTACLE DE LA Nat. I. p. 62.

P. PODA. Mus. Græc. p. 83.

Diagn. Gigas nostrarum; alis omnibus utrinque limbo albo margine cervino, maculaque ophthalmoides, cui pupilla nigra, iris cervina, linea ciliaris alba, palpebra cinnamomea, annulus communis niger.

Habitat in *Pyro*, & *Malo*.

Alæ anticæ supra caryophyllinæ, albis atomis tanquam polline adspersæ; basi fascia obscuriore, marginem crassiore non attingente; stria dentata ab apice usque ad medium marginis inferioris fulminis adinstar decurrentis cervini coloris. Ad apicem, quæ albo limbo caret, macula nigra insidens margini externo.

— — subtus minus obscuræ, albis pilis antice atomisque similiter coloratis canescentes; fascia fulminante, ut supra.

— posticæ supra ad basim limbo conclores; fasciis duabus, caryophyllinis; fascia alia postica, undata, cervina, quam inter & limbum alæ pagina caryophyllina est.

— — subtus albidis pilis atomisque canæ; fascia ad basim caryophyllina, marginem superiorem non attingente; fascia repanda, postica, ut supra, idemque color

color inter hanc & limbum, ut in pagina superiori, ibidem.

Mas antennis ferrugineis, bipectinatis; articulis (36).

Larva perfecta digitum longa, pollicis crassitie, sordide flava, verticillata verrucis in quolibet annulo (6) cœruleis, calyce quinque- & sexdentato exceptis, e quibus pili prodeunt simplices, nigri, longi, præsertim duo medii idemque mucoris adinstar capitati. Frons nigra, linea triquetra inscripta. Valvis caudalibus adnatum est scutellum hemisphæricum, rubrum: margine albo. Pedes pectorales acuminati, rubri; abdominales obtusa rubraque lamina terminati; caudales his similes.

Folliculus horizonti obliquus, fuscus, ob'ongus; filis rigidis, fragilibus, vix extricandis. Pupa atro-rubra, pone pilis rigidis brevibus hirta. Infectum per menses septem & octo latet intra pupam.

483. PHALÆNA *Pavoniella*.

— long. unc. 1. lin. 1. lat. lin. 8 $\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 497. *Pavonia* Var. minor.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 5.

Diagn. *Pavonia* facies, sed diversa ocellis alarum primorum maculae albidæ impositis, iisdemque pupilla nigra sed lineola cœrulecente inscripta, iride ferruginea, linea ciliaris cœrulecente, annuloque communi nigro latiore.

Rarior apud nos.

Alæ posticæ ferrugineæ; fascia limbi caryophyllina. Margo alarum umbrinus. Macula laccata conica ad apicem alæ, ex qua fascia undata potius quam fulminans oritur, eadem alæ subtus disco albente, fasciisque binis contiguis dentatis prope limbum. Alæ antice subtus ochraceæ, absque fascia ad basim. Tuto itaque a *Pavonia* separari poterit in tanta copia diversitatum.

484. PHALÆNA *Tau*.

— long. unc. 1. & lin. 7. lat. 11.

LINN.

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 193

LINN. Syst. Nat. p. 497.

Faun. Svec. 2. 1100.

ROESEL. Suppl. Tom. 4. Tab. 7. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ paleaceæ; macula atro-violacea, sphærica, in cuius medio macula alba parva trigona, clavi capitulo similis.

In *Betula*.

Alæ anticae ocello utrinque; posticæ tantum supra, sed macula trigona, alba, etiam subtus. Ala utraque supra, fascia linearis nigricante prope limbum. Posticæ subtus fascia media, ferruginea.

485. PHALÆNA *Quercifolia*.

— long. unc. 1. & lin. 7. lat. unc. 1. & lin. 3.

LINN. Syst. Nat. p. 497.

Faun. Svec. 2. 1110.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. II. Tab. 49.
fig. 5. 6.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 1. fig. 4. p. 20-25.

P. PODA. Mus. Græc. p. 84.

Diagn. Tota corticina; alis dentatis, reversis: posticis, dum sedet animal, ultra marginem crassior rem anticarum exorrectis.

Habitat in *Amygdalo perfico*, & *Pruno spinosa*.

Palpi porrecti, paralleli, fusco-cærulescentes. Alæ anticae strigis tribus; posticæ binis, undatis, nigricantibus, fasciatæ.

Folliculus oblongus, tenuis. Pupa albida veluti farina adspersa.

486. PHALÆNA *Mori*.

— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$. lat. 7.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. I. Tab. 8.
fig. 19. 20.

Diagn. Alba; alis anticis obiter sinuatæ.

Colitur *Goritiæ*, *Tergesti*, *Labaci* a paucis, ac utinam ab omnibus, non sine summo Patriæ & Principis emolumento.

Enutrivi hanc *Idriæ* An. 1760. omni diligentia, & sequentia observavi. 1. Decima Maji ex ovo genita larva, decima sexta Julii ex folliculo Phalæna. 2. Deponit involucra septem, unum ovi,
P qua-

quatuor in itatu larvæ, unum dum fit pupa, ultimum ex quo insectum. 3. Vix natæ larvæ pondus est decima pars grani, a primo somno quarta, a secunda ponderat grana tria, a tertio sex, a quarto & jam perfecta gr. (68). 4. Folliculum paratura excernit viginti circiter guttulas liquoris crassi gelatinosi, dein opus inchoat & perficit intra quadratum. 5. Pupa cum folliculo ponderat grana circiter (50), sola vero pondus habet gran. (42). 6. Ex folliculis (55) prodierunt mares duodecim, reliquæ erant fæminæ. 7. Phalæna fæmina excreto mæconio ponderat grana (14). 8. Unica fæmella ponit ova (450) flava, demum fusca, dum adhuc alia (210) in ejus ventre latent, filo tenui, catenulæ adinstar, adhærentia.

Infante Epidemica Taurinensi constitutione, e bombycibus vix pauci nitidum de pectore filum, pretiosaque flamina edidere, haud modica etiam pars imperfectum opus reliquit. Car. RICHA. N. 16.

Hostes larvarum, sunt mures, fumus tabaci.

487. PHALÆNA *Quercus.*

— long. unc. 1. lat. lin. 8.

LINN. Syst. Nat. p. 498.

Faun. Svec. 2. 1106.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 35.

fig. 5. 6. 7.

Diagn. Alæ utrinque concolores: antice supra puncto albo; margine nigro, qui septem lineas ab apice distat; nec non fascia pallidiore, punctum album inter & apicem posita; posticæ fascia prope limbum, priori simili.

Habitat in *Salice viminali*.

Mas totus supra castaneus; fasciis pallide ochreaceis; subitus cinnamomellus; fasciis fere paleaceis. Antennæ huic acinaciformes, ($\frac{3}{4}$) linea crassæ, (5) lin. longæ.

Fæmina pallidior; alis posticis limbo palleaceo utrinque. Antennis tenuioribus; deflexis.

Larva subvillosa, dorsi auricularis longitudine, calami scriptorii crassitie, segmentis atris, linea alba laterali, dorso maculis albis, inter folia arida aut cespitosis.

cespites, prope terram folliculum parans oblongum,
filis fragilibus & digitis tenaciter adhaerentibus.

Vix inde natam fæminam, acu tabulæ ligneæ
adfixeram An. 1760., jam sexdecim mares e vicinia
advolantes, & cubile ingredi, mira cupidine circa
eandem vagabantur, quales annis prioribus nullibi
videram. Quam stupendi sensus animalium! Quæ vis
effluviorum!

Fæmina ponit ova fusca, puncto nigro & ma-
cula laterali notata, quæ in aere libero statim gri-
seum colorem induunt. Ex his larvæ nigræ, pilo-
fæ; fasciis flavigantibus.

488. PHALÆNA Vinula.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7½.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

Faun. Svec. 2. 1112.

FRISCH. Inf. 6. Tab. 8. fig. 6. non bene.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 19. fig.
9. 10.

Diagn. Pili albis densis lanatum corpus & ba-
ses alarum posticarum. Dorsum linea media punctis-
que nigris. Alæ antice punctis striisque nigris re-
pandis dentatisque variegatæ; venis ferrugineis.

In Salice.

Larva, *Camellus* ROESEL, iracunda; cauda du-
plici, unde exerit irritata corpora totidem flaccida
retractilia, helicis tentaculorum adinstar. Hæc va-
lidis maxillis, scutulæ inclusa, durum quoque li-
gnum rodit, imo & *Salicis* truncum, cuius scobe
glutine proprio unita folliculum parat solidum, ova-
tum. *Ichneumoni* vix alia magis obnoxia.

489. PHALÆNA Pudibunda.

— long. lin. 9½. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 503.

Faun. Svec. 2. 1118.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 38.
fig. 4. 5.

Diagn. Antennæ rufæ; rachi alba. Alæ albidae;
antice lineis tribus, repandis, umbrinis fasciatæ; pa-
ginas alæ inter fasciam medianam & posticam umbrina
totæ; postice subtus macula media, fusca.

P a

Hæ.

Habitat in *Fago*, *Corylo*, & pomiferis arboribus.
Statura *Ph. Mori*. Oculi nigri. Antennarum pectines pilo terminati. Palpi fusi: apicibus albis. Dorsi crista albo-nigroque varia. Maculæ duo fuscæ ad femora antica. Pedes albi, fusco-anulati.

Larva citrina, pilosa; segmentis nigerrimis; frontis latere utroque puncto fusco-rubro notato; corporis segmentis omnibus puncto subocellato, laterali utrinque, segmentis (a capite deorsum numeratis) 4, 5, 6, 7 penicillum truncatum pallidius dorso gerentibus; 9, 10, puncto nigro laterali, 11, rubello penicillo, caudam referente. Hæc; leviter quoque tacta, contrahitur fere ut *Erinaceus*, & folliculum parat duplicem, tenuem, album, glutine pilisque propriis, rubros caudæ pilos ibi adglutinans, ubi *Phalæna* proditura.

Pupa lucida, nigricans, lin. (10) longa, (4) crassa; segmentis alternis ferrugineis; aliis vero infra medium pilosis rugosisque. Ex hac post menses septem prodiit animal.

Larva variat colore albo, ex qua fæmina nata est, ponens ova albida, rotunda, puncto fusco notata.

Lamina sulcata, rufa, dentiformis, ad genua antica, interius posita, in hac specie.

490. PHALÆNA *Monacha*.

— long. lin. 9. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

Diagn. Alæ albæ; maculis marginalibus striisque transversis, undatis, fuscis; posticæ fascia obsoleta obscuriore. Incisuræ abdominis rubræ. Antennæ nigrae.

Habitat in pomiferis arboribus.

Ad basim antennæ singulæ macula lutea. Oculi nigri. Thorax prope caput macula nigra transversa.

Decima Maji 1760 in cortice *Pyri mali* reperta larva, colore corticis, cui insidebat, subtus vero virescens, capite cinereo villosum, lateribus verrucosis: verrucis acutis pilosis. Hæc decima quarta laxis sparsisque filis constructo tenui folliculo

culo in pupam transiit lucidam fuscum, e qua vi-
gesima septima, hora quarta vespertina *Phalæna* pro-
diit.

491. PHALÆNA *Difpar*.

— long. lin. 9½. lat. 5½. mas.
LINN. Syst. Nat. p. 501.
P. PODA. Mus. Græc. p. 86.

Diagn. *Mas* alis pallide ochreaceis: anticis su-
pra fusco-nebulosis; posticis subtus macula fusca
Femina alis albis; anticis lituris aliquot nigrican-
tibus.

Habitat in *Tilia*, & pomiferis arboribus.

Mas alis anticis, limbo cervino; antennis simi-
liter coloratis, latioribus; rachi albida.

Femina abdomine crasso, lanato, picta a ROE-
SELIO Papil. Noct. Cl. II. Tab. 3. fig. 5. 7. alis
subfasciatis.

492. PHALÆNA *Rubi*.

— long. — lat. —
LINN. Syst. Nat. p. 498.
Faun. Svec. 2. 1103.
ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. II. Tab.
49. fig. 5. 6.

Diagn. Alæ reversæ, cervinæ, immaculatæ; stri-
gis duabus albidis; subtus nullis LINN. l. c.

Habitat in pratis.

Larva *Æschimene*, rigida, pilosa, fusco-nigricans,
pudibunda, metamorphosis iniqua, caloris impatiens,
omnivora, *Genista sagittalis* foliis facilius educanda,
post primum & secundum fœniscum per prata re-
pens, et si quotannis sedulo enutrita fuerit, nondum
tamen optatam mihi *Phalænam* genuit.

493. PHALÆNA *Chrysoorrhæa*.

— long. lin. 6. lat. 3.
LINN. Syst. Nat. p. 502.
ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 22. fig.

4. 5.

Diagn. Alba; abdominis apice barbato, flavo.

In arboribus pomiferis.

Antennæ ceræ; dentibus villosis binisque pilis divaricatis terminatis. Oculi nigricantes. Alæ antice margo crassior subtus fuliginosus, postice flavescens; eadem supra macula fusca obsoleta, ad angulum ani,

494. PHALÆNA Prælata.

— long. lin. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 4 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Alba; alis politis, abdominis apice barbato; tibiis fuscis, albo annulatis.

Habitat in Salice.

Subelinguis: corpore nigro, sed albis villis undique tecto. Antennæ fæminæ setaceæ, albidae. Huc posui, ut distinguitur a *Chrysorrhœa*, & sequente.

495. PHALÆNA Salicis.

— long. lin. 10. lat. 6.
LINN. Syst. Nat. p. 502.
Faun. Svec. 2. 1129.

FRISCH. Ins. I. Tab. 4. fig. 3. 4.
Diagn. Alba; antennis cervinis: rachi alba; pedibus nigris, albo annulatis.

Habitat in Salice.

Elinguis; alarum politura carens; abdominis apice non barbato. Antennis magnis pectinatis.

496. PHALÆNA Antiqua.

— long. lin. 7. lat. 5 $\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 503.
Faun. Svec. 2. 1120.

ROESEL. Pap. Noct. Cl. II. Tab. 39. 40.
Diagn. Antennæ longitudine est dimidia latitudinis alæ anticæ, quibus macula corticina alba linea terminata ad apicem, nec non lunula alba prope posticum angulum.

In *Crataego spinosa*.
Alæ anticæ supra corticinæ fuscoque variae & nebulosæ; punctis fuscis, marginalibus.
— — subtus fuscæ; limbo cervino, maculaque albida ad apicem.
— posticæ supra fuscæ; fimbria terminali, pallidiore.
— — subtus, ut supra.

An-

Antennæ murinæ, pectinatæ; rachi pallidiore.
Tibiae cervinæ. Corpus nigrum.

Larva uncialis, pilosa, 16-pedibus; linea dorsali nigra; capite pilorum fasciculis binis, longioribus, alioque caudali. Folliculus duplex, ut in *Pudibunda*. Supra nigra, lucida.

497. PHALÆNA *Gonoftigma*.

— long. lin. 6. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Suppl. Tab. 13. fig. 3. 4.
Diagn. Ochreacea; alis anticus macula trigona, alba.

Circa *Labacum* capta.

Ill. LINNÆUS coniunctit cum priore, a qua differt, antennæ rachi ochreacea. Alis subitus concoloribus: primoribus supra fascia antica obsoleta obscuriore, atmosphæra fusca circa maculam albam.

498. PHALÆNA *Pyri*.

— long. lin. 7 $\frac{1}{2}$. lat. 5.

Diagn. Cinnanomæa; dorso tomentoso; alis anticus supra strigis duabus pallidioribus, posticis subitus limbo pallidiore.

In *Fyro* reperta larva, ejusque foliis enutrita, ut & foliis *Populi albae*.

Antennæ alis concolores. Dorsum denso villo tomentosum, nec tamen cristatum. Alæ deflexæ: anticæ striis binis paleaceis, quarum postica margini externo parallela, margo idem lineolis binis albis notatus. Sub his alis strigæ nullæ.

Larva superne nigra; linea dorsali & laterali glaucis, quibus adjacet linea alia fulva; capite glauco; punctis duobus nigris. Folliculus duplex, albus, tenuis, oblongus.

(**) Pupa intra folliculum sepultum.

499. PHALÆNA *Laneftris*.

— long. lin. 7. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 499.

Faun. Svec. 2. 1105.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 42.

fig. 4. 5.

P. FODA. Mus. Græc. pag. 86. 87.

P 4

Diagn.

Diagn. Cariophyllina; alis anticis striga maculisque duabus, altis.

Habuit in *Salice viminali*.

Specimina nostra non ferruginea, nec ano albido. *Mas* antennis pectinatis: rachi alba, minor. *Fæmina* major, antennis fere fetaceis. Uterque fexus, macula alba ad basim alæ anticæ, alia in medio, & striga alba postica; subtus macula albida ad marginem crassiorem, ubi supra initium suum striga dicit. Alæ posticæ marginæ superiore albo, fasciæ obsoleta pallidiore subtus.

Ova copiosa ponit circa ramulum, eaque lana densa cinerea tegit. Hinc *larræ* nigræ, pilosæ; dorso lateribusque albo maculatis, cum penicillis pilorum rufescientium; harum plures habitant in societate sub tentoriis cellulosis, unde migrant pabulaturæ, redeuntque per foramina ramis parallela. Hæ satis enutritæ se se sepelunt, nent folliculos albidos, ovatos, coriaceos, e quibus alio demum anno *Phalæna* prodit.

500. PHALÆNA *Coffus*.

— long. unc. 1. & lin. 5. lat. 9 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 504.

Faun. Svec. 2. 1114.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 18. fig. 6. 7.

FRISCH. Insect. 7. Tab. 1. fig. 2.

Diagn. Thorax antice linea transversa cerea, postice maculis binis nigris lateralibus. Alæ posticæ murinæ: basi albide, obscurioribus anastomofantibus lineis réticulatæ; anticæ basi & medio murinæ, alibi albæ, utrinque lituris strigisque transversis nigris lineolisque murinis ramosisque variegatæ.

In semiputridis hortorum sepiibus.

Thorax antice supra lineam cervinus, alibi murinus; alarum margines murinis maculis variegati, quarum (8) in anticis. Alæ antice subtus murinæ, interius albide, una insigni litura nigra in angulo postico desinente; postice subtus cinerascentes, macula murina in medio, murinisque transversis ramosis lineolis subreticulatæ. Abdomen supra fasciis albidis. Tibiae albide; annulis fuscis.

Ova

Ova obtusa, striata: striis fuscis, tuberculosis.
Larva valida, superne rubens, subtus rufa; capite
fusco; maxillis nigris.

PLINII Cossus, an hæc larva, an pupa Sca-
rabæi Cervi ROESEL. vel Nasicornis FRISCH. in-
certum adhuc?

501. PHALÆNA Eremita.

— long. lin. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 6.

Diagn. Alæ cinereæ: anticæ atomis fasciisque
abruptis fuscis tribus, dorso fasciis tribus nigris.

Inveni 30. Aprilis in fylva Idriensi, insidentem
Ecclæsiæ muro.

Statura Phal. *Disparis* maris. Antennæ (5) li-
neas longæ, fuscæ plumatæ; apice absque denti-
bus. Oculi fuscæ. Dorsum tomentosum, non cri-
statum, cinereum fasciis tribus nigris: antica recta,
posticis binis arcuatæ: convexitate caput spectan-
te. Abdomen murinum ano barbato. Alæ anticæ
subtus fasciis dimidiatis binis obsoletis, posticæ u-
nica pariter obsoleta.

502. PHALÆNA *Anafloensis*?

— long. lin. 6. lat. —

LINN. Faun. Svec. 2. 1125. juxta descri-
ptionem.

Diagn. Thorax cristatus; antice macula brun-
nea. Corpus & alæ cinerascentes; strigis subqua-
ternis albidis, maculaque corticina ad apicem mar-
gini insidente.

In sylvestribus locis.

Alæ antica inter strigam tertiam & quartam po-
sticam subbruneo colore tinctæ, fasciæ adinstar; eæ
ipsæ striæ ad marginem alæ internum coniunguntur.
In limbo series punctorum fuscorum (7); margo
pariter fusco punctatus. Alæ posticæ supra fusce-
scientes immaculatæ, subtus cinerascentes.

B. Spirilingues.

503. PHALÆNA Caja.

— long. unc. 1. lin. 1-3 $\frac{1}{2}$. lat. 6-8.

LINN. Syst. Nat. p. 500.

Faun. Svec. 2. 1131.

P 5

Rox.

ROßEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. I.
fig. 4. 5.

FRISCH. Inf. 2. Tab. 9. fig. 3.

Diagn. Alæ anticæ caffeatæ; rivulis albis. Posticæ rubræ; maculis nigris.

Habitat in *Trifolio*.

Lingua alba, bifeta, palpis vix longior. Antennæ albæ, subitus obscuriores. Dorsum alis anticæ concolor; linea antica, transversa, rubra. Abdomen rubrum; maculis dorsalibus transversis, nigris (3-6).

Alæ anticæ supra caffé colore, per quas abasi ad apicem fere usque rivus albus decurrit, in quem influunt tres alii a margine alæ inferiore nati, & alii duo a superiore, quos inter maculæ duo conicæ marginales.

— — subitus pallidiores, basi rubellæ; fasciis binis, posticis, albis, literam X, fere referentibus, puncto albo versus apicem.

— posticæ supra scarlatinæ quidem, sed flavi coloris parte aliqua immixta; maculis nigris, quarum duæ sphæricæ.

— — subitus pallidiores; maculis cervinis, seu colore apicis alarum superiorum subtus.

Variat 1. Alis primoribus supra puncto albo prope apicem; posticis supra maculis nigris rotundis tribus in limbo, quarum duæ interiores fere contingentes, tertia nigra basi imposita, nec non maculis binis pariter nigris in disco contiguis; una cordiformi.

2. Alis iisdem pallidioribus & fere cervinæ; posticis, maculis limbi tribus sphæricis, sed interioribus remotioribus, aliis in disco ovatis unitis.

3. Alis iisdem cervinæ, curva linea, ad apicem loco puncti, maculaque margi-

marginis antica in rivum mutata;
posticis macula unica disci, tribus
in limbo sed exteriore exigua.

504. PHALÆNA *Villica*.

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7½.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 28. fig. 2. &
Tab. 29. fig. 4.

FRISCH. Infect. 10. Tab. 2. fig. 1.

P. PODA. Mus. Græc. p. 88. Vidua.

Diagn. Alæ anticæ nigræ; maculis octo, isabellatis albisve. Posticæ flavæ ceræ colore; maculis apiceque nigris.

Habitat in *Urtica*.

Variat 1. Statura minore; alis anticis fuscis;
maculis albis; posticis fere paleaceis: maculis (7) apiceque nigris,
sed maculis ochreaceis (4) in
apice nigro, marginalibus.

2. Alis anticis nigris: maculis isabellatis,
posticarum maculis (8) nigris, macula punctoque ceræ flavæ
colore, marginali, in alæ apice
nigro.

Abdomen rubrum, punctorum nigrorum serie
una dorsali, aliaque utrinque laterali.

Larva fusca, verrucosa; verrucis pilosis;
fronte maxillis pedibusque rubris.

505. PHALÆNA *Plantaginis*.

— long. unc. 1. lin. ½. lat. 6¾.

LINN. Syst. Nat. p. 501.

Faun. Svec. 2. 1132.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 28. fig. 3.

P. PODA. Mus. Græc. quadripunctaria.

Diagn. Alæ anticæ fuscæ cum obscuro quodam
translucente virore: margine inferiore, litura, fasciaque bifida (Y) referente, cerei coloris; posticæ scarlatinæ: supra maculis (4) subtus unica,
nigris.

In sylvis nostris faginis non rara, circa dies
caniculares, *Eupatorii cannab.* floribus libenter in-
fidens.

Ex

Ex sola definitione Ill. LINNÆI, apud nos, adgnosci omnino non posset, non enim elinguis est, nec alas anticas atras: rivulis flavis, nec politicas luteas (*Ian. Svec. 2.*) unquam habet: antennæ quoque setaceæ *Noctuam* potius, juxta principia Celeberr. Viri, quam *Bombycep* ostendunt. ROESELII figura magna nimis est, & sine historia.

Lingua simplex, ferruginea. Antennæ setaceæ pilosæ, semiunciales, fuscæ. Oculi brunnei. Frons fasciis alarum concolor: puncto nigricante. Thorax nigricans, lateribus albidis; valvulis nigricantibus: margine albido; inter caput & thoracem sovea, lineolis binis albidis longitudinalibus parallelis marginata. Abdomen rubens, quadruplici ferie punctorum nigrorum, una dorsali, altera subtus in medio, aliis lateralibus.

Alæ anticæ supra, linea ad basim inferiori margini parallela subulata, fascia disci ad marginem inferiorem usque non producta, fasciæ alterius ypsilon referentis pes maculis duabus rotundis nigris variegatus; subtus ad basim macula ovata nigra, cæterum ibidem scarlatinæ, fascia flavicans utraque, inter quas pagina tota fere nigra est, cum interjectis maculis (3) rubris.

Alæ politæ utrinque scarlatinæ, supra maculis (2) subovatis liberis, aliaque magna oblonga ad apicem, cui minor adjacet & marginalis; subtus macula unica nigra.

Pedes supra nigricantes, annulis rubellis. Alæ sedent's planæ, non depresso.

506. PHALÆNA Dominula.

— long. lin. 11 - unc. 1. lat. lin. 6-7.

LINN. Syst. Nat. p. 509.

ROESEL. Suppl. Papil. Noct. Cl. II. Tab.

47. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89.

Diagn. Alæ ut supra, ita subtus coloratæ: anticæ nigræ cum translucente obscuro virore; maculis (10), plerisque albis; politæ scarlatinæ, maculis binis apiceque nigris.

Habitat in Salice.

An.

Antennæ setaceæ, caput, thorax, alis anticis concolor, hic tamen maculis duabus dorsalibus albis aut ochreaceis. Abdomen supra alis posticis concolor; linea dorsali nigra; subtus nigrum; ita vidi semper, nec unquam fasciis nigris LINN.

Alæ antice ad apicem punctis (3) albis, dein maculis (2) magnis albis, mox binis aliis minoribus remotis, denique duabus sese contingentibus anticis; decima macula prope basim in margine inferiore; maculæ duæ anticæ & margini crassiori proximæ, una cum macula baseos marginali variant colore albo & ochreaceo, ut & maculæ thoracis. Alæ postice maculam & punctum scarlatinum in apice nigro gerunt.

Thorax sub alis anticis utrinque maculæ ochreacea.

Larva nigra, verrucis hemisphæricis nitidis pilosis aspera; pilis canescensibus, dorso lateribusque albo-flavoque punctatis. Pupa lucida, fusca.

507. PHALÆNA Alpicola.

— long. lin. 7½. lat. 4.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 24. fig. 8. 9. 10.

Diagn. Fusca; alis anticis macula rivulisque albis; posticis limbo ochreaceo: maculis fuscis.

Inveni in gramineis alpium *Vochinenium*.

Thorax antice punctis duobus rubris. Abdominis latera rubra.

Alæ antice margo, ad basim, ruber; ex hac superne oritur rillus rectus attenuatus, apice bifidus, & in puncto concursus aliorum trium transversorum rivulorum, unitus, ita ut hac unione una cum iis rivulis literam (X) repræsentet; macula alba jacet in medio alæ versus marginem exteriorem; inferne deest rillus princeps, & ad apicem alæ duo tantum rivuli paleacei, numerum (4) suo concursu præferentes.

— postice ochreaceo-rubella fascia undata in limbo utrinque, cum insula nigra ovata, & maculis binis marginalibus nigris supra; subtus vero maculis tribus.

Lactu-

506 Phalæna. ORDO III. Phalæna.
Lactucæ foliis alenda ex ovo genita larva.
ROESEL.

508. PHALÆNA Fuliginea.
— long. lin. $7\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 509.
Faun. Svec. 2. 1159.
ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 43.
fig. 4. 5.

Diagn. Alæ anticæ obscure murinæ; punctis (2) fuscis, mediis, approximatis. Posticæ cinnaberinæ; punctis binis, mediis, maculisque marginalibus nigris.

Habitat in *Lapatho*.
Alas inferiores aliter describit **LINN.** in Fauna Svec. quæ, apud nos, perpetuo utrinque rubræ. & abdomini concolores, in quo triplex ordo punctorum nigrorum. Alæ anticæ subtus margine externo & circa basim pariter cinnaberinæ.

509. PHALÆNA Paæta.
— unc. 1. & lin. 6. lat. $10\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 512.
Faun. Svec. 2. 1166.
ROESEL. Papil. Noct. Cl. II. Tab. 15.
fig. 4. 5.

Diagn. Alæ crenatæ: anticæ cinerascentes; fasciis undatis, fuscis: posticæ cinnaberinæ; fasciis duabus, nigricantibus.

In *Quercu*.
Caput & thorax antice murini coloris; corpus alibi cinereum. Alæ anticæ subtus albidae; fasciis tribus nigris: posticæ margine albo, subtus media exteriore parte alba, alia rubra; fasciis binis nigris.

510. PHALÆNA Fulminea.
— long. lin. $11\frac{1}{2}$. lat. $6\frac{1}{2}$.
ROESEL. Tom. 4. Tab. 18. fig. 1. 2.
bene.

Diagn. Alæ anticæ pallide cervinæ; fascia, macula lunata media, lineaque transversa fulminis ad instar propagata, nigris; posticæ paleaceæ: fasciis duabus fuscis.

In

In Carniola calidiore.

Corpus totum utrinque pallide murinum. Alæ anticæ supra bali obscuriores, punctis fuscis marginalibus (7); subtus fuscæ: fasciis binis paleaceis; posticæ subtus ut supra, sed fascia marginali non abrupta.

511. PHALÆNA Jacobæ.

— long. lin. 8. lat. 4 $\frac{3}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 511.

Faun. Svec. 2. 1155.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89.

Diagn. Alæ anticæ canæ; linea maculisque bilis cinnaberinis. Posticæ cinnaberinæ; fimbria fuscescente, terminali.

Habitat in Senec. Jacobæ.

Statura *Sphingis Phegeæ*. Caput, antennæ, thorax, nigro colore. Abdomen alis anticis concolor. Alæ utrinque concolores: anticæ linea juxta marginem crassiorem posita, lin. 5 $\frac{1}{2}$, longa, maculis subhemisphæricis externo margini impolitis; quem fimbria obscurior terminat. Ill. LINN. alas nigras ponit, quas nondum vidi.

512. PHALÆNA Meticulosa.

— long. lin. 11. lat. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1164.

ROBSEL. Tab. 4. Tab. 9. fig. 4. 5.

Diagn. Alæ subdentatae: anticæ triangulo intra triangulum; utriusque basi crassiori margini impofita.

Circa Labacum capta.

Corpus supra & alæ osseæ; his *anticis punctum* nigrum inter basim & triangulum, & macula nigricans obsoleta ad apicem; margo trianguli interni totus osseus, externi vero majorisque tantum *anticus*; lituræ fuscescentes obsoletæ transversæ in limbo; alæ *posticæ* osseæ; macula media margineque fuscis. Abdomen subtus subochraceum; punctorum fuscorum seriebus tribus.

His (502-512) ova perlata, rotunda.

513. PHALÆNA *Lubricipeda*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 505-506.

Faun. Svec. 2. 1138.

ROES. Papil. noct. Tab. 46. fig. 7. 8.

Diagn. Alba; oculis antennisque nigris; alis deflexis: anticus nigro-punctatis; abdomine supra paleaceo; punctorum nigrorum ordinibus quinque.

Apud nos frequens.

Antennæ subtilis dentatae, basi superne albæ. Lingua substraminea. Alæ antice punctis nigris (7-10). Tibiae nigrae.

514. PHALÆNA *Pulchella*.

— long. lin. 7½. lat. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 534. Tinea. N. 238.

Diagn. Alba; alis anticus nigro-rubroque punctatis; posticis limbo fusco.

Inveni in flore *Scabiosæ arvensis*. Junio M.

Ill. LINNÆUS, vidit forte in Museo specimen explicatum, in quo statu, adeo simile est *Tinea Eronimellæ* pariter expansæ, ut alio ordini adjungi nequeat, quam *Tinearum*. Si vero vivens sedens que animal intuearis, alas minime convolutas sed planissimas observabis.

Puncta duo nigra caput inter & thoracem, valvulae thoracis rubore suffusa punctisque duobus nigris. Abdomen album; punctis nigris lateralibus utrinque (4). Alæ antice punctis marginalibus nigris (7). Alæ postice supra glauco quadam nitore fulgidæ. Antennæ setaceaæ.

515. PHALÆNA *Bucephala*.

— long. lin. 9½. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 508.

Faun. Svec. 2. 1115.

ROESL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 14. fig.

5. 6.

Diagn. Alæ subdentatae: antice linea caffeta, dupli antice, aliaque simili versus limbum fasciatæ: apice macula ovata magna occipiteque stramineo colore tinctis.

Habi-

Habitat in *Salice*.

Absque auxilio figurarum, ex sola definitione *Syst. Nat.* difficilime adnotatur; nostræ enim, nec alas cinereas, nec maculam apicis subocellarem flavamque gerunt, multoque minus magnitudinem *Ph. Ceffi* (*Faun. Svec. l. c.*)

Statura *Ph. Mori*. Lingua brevis. Oculi nigri. Antennæ pectinatae. Alarum primorum dentes caffeo puncto notati, lineæque sublunatae similiiter coloratae (4-5) marginales. Maculae apicis portio marginem dentatum ipectans, macula pallide ochreacea: antice crenata, inquinata, est. Alæ eadem subtus albidae, punctis lineisque ad marginem dentatum, ut supra, fascia que tenui obsoleta fuscescente.

Larva nigra, pilosa, calami crassitie; lineis longitudinalibus transversisque luteis, punctisque albis lateralibus; fronte (Y) flavo signata. Hæc unica, mutanda in pupam, exit ex involucro, non exuit, relinquens illud extensem & æque longum ac erat larva. Pupa fusca; corniculis binis, spinosis, posticis.

516. PHALÆNA Libatrix.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 507.

Faun. Svec 2. 1143.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 20. fig. 3. 4.

Diagn. Alæ antice cervinæ; basi maculis (4) ochreaceis: media longa prismaticæ; fasciis binis linearibus pallidioribus: postica duplice, punctis duobus albis, margine externo denticulato ita ut distantia apicis a primo dente eadem sit, quæ ab eodem dente ad angulum posticum.

Habitat in *Salice*.

Descriptio **LINNÆI** *Faun. Svec.* optima; cui adde alas *anticas* atomis fuscis adspersas, punctum nigrum fere in medio versus marginem crassiorem, lineam repandam lucidiores transversam in limbo ab uno margine ad alium productam, venas alæ in limbo albidas; alas *posticas* fuscescentes, basi pallidiores; margine nigricante. Tibias albas, fusco-annulatas.

517. PHALÆNA Chryfitis.

— long. lin. $6\frac{1}{3}$. lat. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1169.

Diagn. Alæ murinæ : anticæ fasciis binis, orichalceis.Habitat in *Galeopside*.

Alæ supra murinæ, fimbria pallidiore terminata; anticæ supra inter fascias binis circulis obscurioribus, (♂) referentibus; subtus murinæ ; limbo paleaceo : posticæ supra murinæ totæ, subtus paleaceæ; lineola obscuriore, lunata, media.

518. PHALÆNA Pronuba.

— long. lin. 11. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 512.

Faun. Svec. 2. 1167.

ROESEL. Tom. 4. Tab. 32. fig. 4. 5. 6.

FRISCH. Inf. 10. Tab. 15. fig. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 90.

Diagn. Alæ anticæ pallide-cervinæ ; macula rotunda, media, fusca, punctisque binis didymis atris prope apicem ; posticæ paleaceæ, fascia nigra submarginali.Habitat in *Senecione*, *Hieracio pilos*.

Caput & thorax alis anticis concolor ; abdomen posticis, idemque sericeo nitore fulgens.

Alæ posticæ supra margine exteriore perlato. Alæ antice limbo postice fuliginosæ, margine inferiore pariter perlaceo nitore fulgidæ.

519. PHALÆNA Quadra.

— long. lin. $11\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 511.

ROESEL. Suppl. Papil. noct. Cl. II. Tab. 17. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 89. Tab. 2. fig. 8.

Diagn. Alæ unicolores; anticæ lanceolatae, rotundatae; maculis binis, cyaneis.In agro *Labacensi*.

Situs macularum alæ anticæ constans, nempe una incumbens margini crassiori & lineas quatuor cum

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 211

cum dimidia ab apice distans, altera in medio versus marginem inferiorem lineas fex ab apice remota.

- Variat 1. alis stramineis, antennis pedibusque
 cyaneis.
2. — cereis.
3. — albis.

520. PHALÆNA *Sanno*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 506. sic puto.
Diagn. Alæ omnes macula media obscuriore:
anticæ subtus, posticæ supra fascia fusca.

In Carniola calidore.

- Variat 1. alis anticis *supra* paleaceis; macula media rubro-fuscoque varia; margine undique rubro *subitus* disco fuscescente; limbo paleaceo; macula fusca reniformi, paleacea atmosphæra cincta.
— posticis *supra* albidis: fascia obsoleta maculaque fuscis; margine rubro.
— — *subitus* paleaceis, absque macula & fascia.
2. alis iidem, sed posticis subtus macula fusca media obsoleta.
3. alis cereis, absque margine rubro; anticis subtus fascia postica maculaque fuscis; posticis subtus immaculatis.
4. alis albis, absque margine rubro; anticis macula fusca obsoleta; posticis *supra* macula fasciaque fuscis obsoletis; subtus rudi maculæ mediæ vestigio.

521. PHALÆNA *Verbaesi*.

— long. lin. 9. lat. 3 $\frac{1}{4}$.

LINN. Syst. Nat. p. 515.

Faun. Svec. 2. 1186.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 23.
fig. 4. 5.

Q 2

Diagn.

Diagn. Lingua corporis longitudine. Thorax crista duplicita. Alæ subdentatae, albo cervinæ; margine fuscæ.

Habitat in *Scrophularia*.

Abdomen dorso acuminato, fuscæ. Alæ posticæ subtus puncto obsoleto, fuscæ medio. Femora puncto nigro notata. Lineolæ duo transversæ, lunate, pallidæ, parvæ, ad marginem internum alæ anticæ.

522. PHALÆNA *Brafficæ*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 516.

Faun. Svec. 2. 1205.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 29. fig. 4-5.

Diagn. Alæ anticæ murinæ, fuscæ-nebulosæ, alba media linea ita flexa ut subcordatam figuram habeat, cui vicina macula subrotunda pallida.

Circa *Labacum*.

ROESELII figuræ certe hanc repræsentant, quidquid descriptio Linnæana dissentire quodammodo videatur. Huic lineolæ (8) fuscæ curvæ ad marginem alæ anterioris, quæ subtus pallidior, & absque maculis. Alæ posticæ supra murinæ: margine tenissime crenulato & incidiore fimbria terminato; subtus pallidiores; puncto fuscæ medio.

523. PHALÆNA *Gamma*.

— long. lin. 9. lat. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 513.

Faun. Svec. 2. 1171.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 30. fig. 4. 5.

P. PODA. Mus. Græc. p. 91.

Diagn. Alæ anticæ (γ) græco albo inscriptæ.

Habitat in *Origano majorana*, & *Trifolio prat.* sed copiosa in *Braffica oleracea*, quam devastat.

Alæ anticæ supra bruneæ; lineolis vagis pallidis & macula pallida conica exteriori margini postice imposita; margine crenulato pallidiore; gamma græco cruribus etiudem marginem respondentibus, basi iis multo crassiore & obtusa; subtus fuscæ & paleaceo variegata.

Alæ

Alæ posticæ *supra* basi murinæ, postice bruneæ, margine pallidiore; *subtus* anticis concolor, fimbria ciliata fuscoque varia.

Dorsum pone triplici crista, abdomen autem unica: apice bifidum. Volatus rapidus, etiam diurnus.

Larva vires, villosula: lineis (2) dorsalibus pallidioribus. Pedibus pector. (6), abdom. (4), caudal. (2); sub *Geometra*.

524. PHALÆNA *Aceris*.

— long. lin. 7. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 514.

Faun. Svec. 2. 1179.

ROESEL. Papil. noct. Cl. II. Tab. 29.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; lineis transversis, dentatis, annuloque ocellari nigris.

In *Acer*.

Sex circiter tales lineæ numerari possunt; inter quartam & quintam jacet ocellus canus iride pupilla nigra, diametro sua lineam non attingens. Alæ posticæ utrinque pallide-murinæ, subtus macula fusca sublunata media.

525. PHALÆNA *Rubiginosa*.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ supra ferrugineaæ, lunula media nigra.

In *Carniolie* herbidis.

Corpus utrinque ferrugineum. Oculi brunei. Alæ anticæ lunula cornibus suis crassiore marginem respicit. Alæ posticæ supra murino-ferrugineaæ, subtus magis ferrugineaæ: fascia obsoleta maculaque media fuscis.

526. PHALÆNA *Clavipalpis*.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Alae anticæ cervinæ; margine crassiore punctis (4) nigris.

Habitat in agro *Labacensi*.

Alæ anticæ subfuscæ leniter nebulosæ, puncto nigro versus basim; subtus pallidæ: margine inferiore subperlato; postice utrinque albidae, immaculatae.

Q 3 cu-

culatæ: margine obscuriore. Dorūm leve, valvis subtrigonis. Palpi clavati, compressi. Tibiæ supra fuscescentes, albidis annulis variegatæ.

527. PHALÆNA *Deceptoria*.

— long. lin. 5. lat. 3.

Diagn. Alæ anticæ albæ; margine externo fasciaque lata media erosa fuscis.

In sylvestribus circa *Idriam*.

Habitus *Ph. Tortricis*. Abdomen cristulis binis. Intra fasciam alæ anticæ, cuius margines erosi sunt & tortuosi, est annulus albus, eique vicinum punctum album; macula fusca infra apicem margini insidens. Alæ posticæ griseo-fuscæ, immaculatae.

II. Geometræ.

(a) *Alis posticis angulatis*.528. PHALÆNA *Amataria*.

— long. lin. 7. lat. 4.

LINN. Faun. Svec. 2. 1223.

Diagn. Per alas expansas omnes utrinque ab apice primoris unius ad apicem alterius sociæ decurrunt strigæ duo obscuriores; quarum postica tenuior & repanda, extremitates suas adnectit apicibus alarum antistarum, seu extremitatibus strigæ superioris.

In sylvestribus.

Amataria ill. LINNÆI solo colore a nostra differt; illa enim albida, apicibus alarum margine, rufis; nostra vero zinziberis colore, striga superiore fusco-ferruginea, altera fusca, eaque subtus evidenter quam superior. Alarum pagina inferior atomis obscurioribus adpersa. Cæterum

Var. 1. Alis anticis punto fusco, nec non omnibus margine externo fimbriaque rubellis, margine, seu linea marginali eadem, subtus fuscescente.

2. Alis anticis absque punto fusco fimbriaque rubella, antennis pectinatis: apice setaceis.

529. PHALÆNA *Lactearia.*

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 519.

Faun. Svec. 2. 1226.

Diagn. Alba; antennis pectinatis: pectinibus villosis, apice setaceis; alis posticis angulatis: omnibus strigæ transversæ vestigio.

In agro Labacensi.

Lingua paleacea. Oculi fuscescentes. Antennarum pectines pilosi, rachi obscuriores.

530. PHALÆNA *Viridata.*

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 523.

Faun. Svec. 2. 1256.

Diagn. Alæ montano viridi colore tinctæ; striga fimbriaque pallidiore, margine crassiore flavecente.

10. Maji capta in herbido colle circa Idriam
Strigam quoque flavidantem ponit LINNÆUS,
quæ, apud nos, albida. Dorsum alis concolor,
Abdomen pedes & antennæ albo-paleaceæ.

531. PHALÆNA *Repandata.*

— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 524.

Faun. Svec. 2. 1260.

Diagn. Alæ albide utrinque; strigis fuscis, undatis, externo margini parallelis; puncto que fusco utrinque notatis.

In herbidis locis, non rara.

Mihi sane, juxta descriptionem in Faun. Svec.
datam, videtur *Repandata* LINN. mera varietas. A-
lis omnibus punctulis numerosis fuscis adspersis;
lineola fusca, marginem exteriorem alæ utriusque
utrinque circumscribente, puncto que fusco non so-
lum in inferiорibus, sed etiam superioribus.

532. PHALÆNA *Nebulata.*

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ supra albido-cervinoque nebulo-
fæ, subtus pallidiores; poiticæ subangulatæ.

In agro *Locopolitano*.

Fimbria alarum pallidior, cervinis punctis variegata. Alæ subtus obsoletis, subferrugineis fasciis tribus. Antennæ setaceæ, ut in priore.

(b) *Alis posticis dentatis*.

533. PHALÆNA Corticalis.

— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$, lat. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ osseæ; lineolis transversis parvis numerosis ferrugineis; linea crassiore utrinque pariter ferruginea, in singulis alis.

In agro *Labacensi*.

Alæ lineolis illis transversis, *Betulae* corticem quodammodo referunt; posticæ dentibus (5).

534. PHALÆNA Cervinalis.

— long. lin. 10. lat. 6 $\frac{1}{2}$.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. III. Tab. 3. fig. 3?

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ fasciis binis, fuscis, dentatis, lineaque alba undata submarginali; posticæ linea nigra, marginali.

In fylvis nostris, non rara.

Specimina mea majora *Roeseliano*, carent lineis albis transversis, alarum anticarum bases occupantibus. Alæ subtus fascia obsoleta dentata & puncto nigro evidenti. Sexus unus habet fasciam antican magis conspicuam.

535. PHALÆNA Fimbrialis.

— long. lin. 6. lat. 5.

Diagn. Alæ capparinæ: anticæ strigis binis, albis; posticæ una; omnibus fimbria albida, ferrugineo punctata.

In agro *Vipacensi*, & interiori *Carniolia*.

Antennæ pectinatæ; rachi albida: pectinibus pallide ferrugineis. Alarum color supra pallidior designato; harum strigæ subrepandæ, subtus nullæ; dentes alarum posticarum ferruginei. Pedes ferruginei.

536. PHALÆNA *Retialis.*

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ albæ, venis fasciisque (4) murinis reticulatæ.

Apud nos frequens.

Margo alæ anticæ crassior & externus pallide luteolus lineolisque crebris murinis transversis nebulosus; fascia ultima & penultima in medio alæ cohærent, fascia tertia ex apice superiore marginem contingente uncum demittit proximæ fasciæ seu penultimæ se se unientem. Fimbria alarum albo murinoque varia; eadem subtus ut supra coloratæ, sed colore murino pallidiores. Antennæ setaceæ.

537. PHALÆNA *Punctinalis.*— long. lin. 10 $\frac{1}{2}$. lat. 6.*Diagn.* Alæ albæ; serie transversa punctorum fuscorum, fascia obsoleta submarginali atomisque fusca.

In arboribus pomiferis.

Puncta (7). Maculæ duæ obsoletæ margini crassiori impositæ. Ala utraque subtus puncto fuscō. Alæ subdentatae.

(c) *Alis omnibus dentatis.*538. PHALÆNA *Fenestrella.*— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.*Diagn.* Alæ fuscescentes, erectæ, dentatae; punctis rufis albisque.

Floribus involat, non frequens.

Tota subfuscæ est. Puncta alarum utrinque, alia rufa multa & opaca, alia vero argentea dia phana, majora, in qualibet ala duo & tria, medio loco posita. Abdomen annulis duobus albis fasciat. Tibiæ posticæ uno latere barbatæ, basi & apice albo puncto notatae.

(d) *Alis omnibus rotundatis.*539. PHALÆNA *Niveata.*— long. lin. 7. lat. 4 $\frac{1}{4}$.*Diagn.* Alba tota & immaculata.

In pratis.

Oculi nigricantes. Antennæ pedesque pallide cervini. *Mas* antennis pectinatis, alis fimbria manifesta; *Femina* antenn. fetaceis, alis manifesta fimbria destitutis.

540. PHALÆNA Lineata.

— long. lin. 10. lat. 6.

Diagn. Alba tota; linea marginali venisque sub-tus fuscis.

In pomariis.

Margo superior alæ anticæ fuscus, eadem sub-tus fascia obsoleta maculaque fuscis. Antenn. fetaceæ, cervinæ. Abdomen subtus lineis tribus, fu-scis, longitudinalibus. Pedes cervini.

541. PHALÆNA Strigata.

— long. lin. 7. lat. 4½.

Diagn. Alba; alis anticis strigis transversis tri-bus, posticis duabus subferrugineis.

In pratis humilioribus.

Antennæ pectinatae, apice fetaceæ. Macula obsoleta, subferruginea, marginalis; prope apicem alæ anticæ punctum nigrum, sub ala qualibet.

542. PHALÆNA Exanthemata.

— long. lin. 5½. lat. 3½.

Diagn. Alba; strigis ut in priore, sed obsole-tissimis punctulisque copiosis ferrugineis utrinque variegatas alas gerens.

In falicetis.

In specimine, quod coram habeo, antennæ de-sunt; sed etiam si forent pectinatae, diversum vide-retur a priore, copia atomorum, statura &c.

Variat punto sub alis nigro.

543. PHALÆNA Punctata.

— long. lin. 5½. lat. 3¼.

Diagn. Alba; alis omnibus utrinque punto nigro medio; anticis punctis (7) nigris marginem exterum utrinque occupantibus.

In collibus herbidis, non rara.

An-

Antennæ setaceæ. Alæ antice striga una binisve obsoletissimis subferrugineis, minutisque punctulis rarís fuscis variegatæ, subtusque magis ferrugineæ. Puncta nigra marginalia in alæ singulæ inferiore pagina evidentiora quam in superiore.

544. PHALÆNA *Großulariata*.

— long. lin. 9. lat. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 525.

Faun. Svec. 2. 1261.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 2. fig. 4. p. 13. 15.

P. PODA. Mus. Græc. p. 92. 93.

Diagn. Alba; alis fusco-maculatis: anticis supra basi fascia que flavis.

In *Ribejo grossularia*.

Caput nigricans. Corpus flavum. Abdomen serie triplici punctorum nigrorum, nempe una dorsali, duabusque subtus. Alæ antice maculis in margine externo (7), quem numerum ponit etiam LINN. & figura FRISCH, in disco series duæ macularum, quas inter fascia flava; ad marginem crassiorem duo paria similium macularum, invicem, & cum serie antica macularum disci, connexarum; inter basim & seriem dictam maculæ duæ parva liberæ; ad basim itidem maculæ aliæ sepientes fere fasciam aliam flavam ibidem: posticæ maculis marginalibus (7), disci (8), dein tribus aliis, quarum una in medio, alia in margine inferiore, tertia est punctum basim occupans. Alæ subtus eodem modo maculatæ sunt, sed anticæ hic carent fasciis flavis.

545. PHALÆNA *Ornata*.

— long. lin. 6. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; alis omnibus supra fasciis binis limbi: antica undata.

In pratis *Carnioliae* super.

Ornatus limbi singularis huic uni proprius; nempe fascia fusco-cinerea, submarginalis, ex pluribus punctis conjunctis facta; aliaque fascia composita maculis binis convexis, cervinis, linea nigra tectis, nec non maculis aliis duabus fusco-cinereis intermediis, sed inferioribus. Præterea ala quælibet supra fasciam gerit medianam, subcervinam, obsoletam,

tam, cui vicinum, in alis tantum posticis, est punctum nigrum. Alæ anticæ subtus fasciis obsoletis fuscouscentibus binis. Posticæ unica, singulæ puncto nigro notatae. Antennæ setaceæ.

In hac specie alæ posticæ subdentatae sunt; hinc sive ad priorem, sive ad hunc ordinem redundantur, idem erit; margo alarum subtus linea nigra, aut lineolis nigris notatus.

546. PHALÆNA *Sylvata.*

— long. lin. 8 $\frac{1}{2}$. lat. 5.

Diagn. Alba; alis anticis maculis fuscis subelutis, basi tamen & prope angulum posticum macula major obscurore & colore ferrugineo inquinata; abdomine paleaceo: punctorum nigrorum seriebus (?).

Habitat in sylvis faginis, umbrosis.

Graffularia proxima, non tamen eadem. Alæ posticæ margine fuscæ, subtus maculis in disco (6), tribus ad basim. Tibiæ posticæ flavescentes; fascia fusca. Ad basim alæ anticæ supra punctum nigrum.

547. PHALÆNA *Urticata.*

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 529. Hortulata.

Faun. Svec. 2. 1297.

ROESEL. Papil. Noct. Cl. IV. Tab. 14. fig. 7. 8.

Diagn. Alæ albæ; macularum fuscarum ordinibus transversis binis posticis; thorace anoque flavis.

Habitat in *Urtica*, arboribus pomiferis, salicetis.

Macularum series submarginalis alarum superiorum, maculas (7), inferiorum vero (8), continet; alia series variat. Alæ super. ad basim maculis aliis fuscis (4-5); inferiores unica, aut nulla. Variat abdonine toto flavo; cingulis nigris.

Salictariam Doctiss. P. PODÆ, huc referri posse docet habitus, & numerus macularum seriei posticæ. Mus. Græc. Tab. 2. fig. 2.

548. PHALÆNA *Staphylæata*.— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ concolores albæ: anticæ limbo maculisque binis contiguis fuscis crassiori margini impositis.

Habitat in *Fago*, *Staphylea*.

Lingua ferruginea. Antennæ setaceæ. Corpus totum maculis alarum concolor. Tibiæ posticæ pallidæ.

- Var. 1. Alis anticis; fascia abrupta fusca, maculisque marginalibus coalitis.
 2. — — macula parva disci, maculisque marginalibus disjunctis.
 3. — posticis limbo, & disco fusco-fasciato maculato.
 4. — — limbo maculis tribus obfoletis, fascia nulla.

549. PHALÆNA *Glaucata*.— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 4.

Diagn. Alba; alis anticis fascia media subeluta fuscescere, ad marginem inferiorem glauco fuscoque varia.

In sylvis.

Caput fuscum. Antennæ setaceæ eo pallidiores. Abdomen fuscescens. Alæ anticæ binis ordinibus punctorum ad marginem externum supra; subtus margine eodem & crassiore non c non fasciata, fuscescentibus; posticæ supra limbo fuscescente, subtus albæ totæ.

550. PHALÆNA *Fasciata*.— long. lin. 6. lat. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alba; alis anticis supra basi fasciaque dentata fusco ferrugineoque varia.

In sylvestribus, umbrosisque locis.

Habitus & fasciæ figura, ut in *Phal. FRISCH.*
Inf. 7. Tab. 19. fig. 2, sed colores alii. Cæterum

- Var. 1. Basi alarum anticingarum, fasciaque lineolis curvis cæruleofuscis variegata; punctis duobus nigris, duas lineas ab apic-

- apice remotis; limbo fuscescentibus binis fasciolis ad alæ apicem non productis; abdominis incisuris singulis supra pari uno punctorum nigrorum; alis anticis subtus punctis (7) albidis in limbo, posticis lineola nigra media antica transversa, qualis etiam sub anticis prope marginem crassiorem.
2. Fascia magis ferruginea, minusque fusca & absque lineolis cæruleoscentibus, subtus sine punctis albidis. Abdomine fine punctis nigris.
 3. Fascia puncto nigro immerso, basi obiter fasciata. Abdomine punctato, ut in Var. I.
 4. Fascia obsoleta interrupta; abdominis incisuris supra bipunctatis.

551. PHALÆNA Chlorofata.

— long. lin. 7. lat. 5½.

Diagn. Albida, seu colore eodem fere ut vultus in Cachexia virginæ.

In pascuis.

Alæ anticis lineis rectis ferrugineis binis transversis, quibus interjacet punctum fuscum in sola pagina superiore conspicuum.

552. PHALÆNA Mucronata.

— long. lin. 8. lat. 5½.

Diagn. Osseo-cinerea; alis anticis apice acuminate lineaque fusca ibidem.

In salicetis.

Mucrone lineaque apicis a priore imprimis diversa, nec non alis omnibus subtus fuscescentibus atomis adpersis, anticisque ibidem ubi supra puncto fusco notatis. Cæterum lineæ in alis anticis supra, cum interjecto punto, ut in priore.

553. PHALÆNA Variegata.

— long. lin. 6½. lat. 4½.

Conf. Geom. *Immutata* Celeberr. LINNÆI.

Diagn. Albida; atomis fasciisque undatis tenuibus fuscis variegata; alis omnibus puncto medio margineque nigro punctato utrinque.

In

In herbidis.

Alæ *anticæ* supra strigis (4) una aliave obsoleta, punctis nigris marginalibus (8); *posticæ* strigis tribus, punctisque pariter (8). Subtus *anticæ* fuscantes; fascia albida in limbo; *posticæ* albæ striga transversa repanda fuscensente postica.

Variat statura fere duplo minore, alisque *anticis* subtus obscurioribus quam supra.

Sed neque hanc specie divergam arbitror

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Alis *anticis* supra punctis (4) *anticis* nigris, *postice* serie punctorum in limbo nigrorum.
— *posticis*, eadem serie punctorum in limbo utrinque.

Conjungunt enim cum priore, color, habitus, oculi brunei, antennæ albidae, caput inter antennas album, puncta alarum marginalia, & punctum nigrum singulis utrinque in medio.

554. PHALÆNA Verberata.

— long. lin. 7. lat. 5.

Diagn. Albida; alis *anticis* strigis (5) undatis transversis fusco-ferrugineis: duabus *posticis* approximatis.

In sterilioribus pratis.

Antennæ dentatae. Oculi brunei. Tibiae fuscæ, albido annulatae. Margines externi alarum utrinque linea fusca, punctis contiguis facta, notati. Alæ *posticæ* utrinque striga obsoleta, puncto subitus, fuscis.

555. PHALÆNA Undulata.

— long. lin. 7 $\frac{1}{2}$. lat. 5.

Diagn. Alæ cinereæ; *anticæ* fascia lata fusco-cinereoque nebulosa dentata: punctis duobus nigris, undulisque obsoletis crebris obscurioribus transversim strigatae.

In sylvis.

Antennæ cervinæ, pectinatae: apice setacea. Fascia ibi lucidior ubi puncta duo nigra immerita gerit. Alæ *anticæ* limbus rugosus, vallecula qualibet nigro puncto signata; eadem subtus fuscantes: fascia *postica* pallidiore obsoletaque.

Posti-

524 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

Poiticarum margo leniter repandus, nigrisque linneolis notatus; Variat colore grifeo.

556. PHALÆNA Crategata.

— long. lin. 9. lat. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 525. luteolata.

Faun. Svec. 2. 1283.

Diagn. Lutea tota; alis anticis marginē superiore maculis ferrugineis (5); antice minoribus: macula ocellari dentata alba: iride fulca, ferruginea secundā adnata.

Inveni in M. Nanas, supra Frewald in itinere Botanico A. 1761, socio D. Doct. Carolo Krapf, Medico Tergestino.

Antennæ fusco-ferrugineaæ, superne extrorsum albidae. Palpi colore balearum antennarum. Lingua ferruginea. Thoracis latus utrinque linea ferruginea a basi alæ proxime nata. Pedum genicula ferruginea. Tibiæ albidae. Alæ anticæ macula apicis conica major, basi caput spectans. Puncta nonnulla ferruginea in margine alæ anticæ, versus apicem; ordo punctorum fuscorum obsoletorum transversus in aliis anticis supra. Alæ posticæ ordine simili punctorum, puncto alio majore medio. Ex his patebit qualiter specimen nostrum differat a Linnaeano Faun. Svec.

557. PHALÆNA Maculata.

— long. lin. 7. lat. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 521. macularia, juxta descriptionem.

Diagn. Flava; alis omnibus utrinque fusco maculatis.

In pratis nostris non rara.

Antennæ setaceaæ (†). Alarum bases punctis fuscis crebris obsitaæ. Variat colore pallidiori, maculis

(†) Calamitas divisionis *Phal. Geometrum* in pectini- & seticornis, hæc est, 1. quod mas pectinicoris, fæmina seticornis; 2. quod sexus uterque neque in indigenis facile habeatur; 3. quod *Phalæna* ejusmodi antennis mutilatae in Musæis saepius occurant.

culisque poiticis alarum anticarum in fasciam coadunatis.

558. PHALÆNA *Isofcelata*.

— long. lin. 6. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ supra albæ; fasciis (4) lineolisque parvis transversis fuscis; subtus flavefcentes.

In subsylvestribus Carnioliae.

Fascia baseos arcuata, alia huic proxima cum tertia apice in margine inferiore unita in triangulum. Isofcelata, fascia quarta abrupta; flavedo etiam aliqua circa has fascias observatur. Fimbria terminalis albo fuscoque varia. Alæ posticæ tres fascias fuscas obsoletas habent, subtus binas. Antennæ fetaceæ.

559. PHALÆNA *Contaminata*.

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ utrinque fasciis cinereis & ferrugineis alternantibus coloratæ, atomisque fuscis adspersæ.

In herbidis montanis Carnioliae super:

Dubium an prævaleat color cinereus vel ferrugineus. Alæ anticæ fasciis decem; alternis cinereis; posticæ octo: alternis quoque cinereis. Linea nigra marginalis utrinque. Antennæ fetaceæ. Conf. LINN. Atomaria. Faun. Svec. 2. 245.

560. PHALÆNA *Mensurata*.

— long. lin. 6. lat. 5.

Diagn. Alæ cinerascentes, atomis fuscis obsitæ: anticæ fasciis tribus lineaque apicis caffeatiss; margine paleaceo.

In siccis & apricis collibus.

Fascia tertia baseos modo evidens, modo fere nulla. Inter fasciæ primam & secundam punctum fuscum. Alæ omnes supra lineola fasciis concolorē terminali; posticæ sine fasciis; subtus omnes subferrugineæ. Antennæ mari pedinatæ, fæminæ fetaceæ. Ab alæ margine ad fasciam primam, ab hac ad secundam, indeque ad basim distantia eadem, seu-tertia pars longitudinis totius alæ, mensura ducta circa medium.

561. PHALÆNA *Mæniata*.— long. lin. 8 $\frac{1}{2}$. lat. 6.*Diagn.* Alæ anticæ albido-cinerascentes; fascia caffea lata dentata margine paleaceo.

In fylvis.

Fascia vertice propugnaculi in medio alæ posito in limbo, a cuius apice ad oppositum marginem si ducatur linea recta, erit hæc quatuor lineas longa, dum eadem fascia in margine alæ inferiore lineas duas, in superiore vero quatuor pariter lineas lata est, eademque antrosum pallidior. Ad apicem alæ linea fasciæ concolor. Sub alis fasciæ nullæ. Antennæ mari pectinatæ. Corpus alæ anticæ limbo concolor.

562. PHALÆNA *Cruentata*.— long. lin. 6. lat. 4 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Alæ supra offeæ; fascia communi fimbriaque russeis.In agro *Labacensi*.

Antennæ pectinatæ. Alæ anticæ utrinque puncto russo. Alæ posticæ supra fascia magis obsoleta; omnes subtus maxima parte russeæ, alibi paleaceæ.

563. PHALÆNA *Laccata*.— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Alæ supra viridanæ; fasciis binis posticis primorumque margine crassiore laccatis.

In Juniperetis, verno tempore obvia.

Antennæ setaceæ. Fasciæ alarum posticarum minus conspicuæ, omnes subtus obsoletæ, & obscuriores, puncto fusco sub alis anticis.

564. PHALÆNA *Inflammata*.— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.*Diagn.* Alæ anticæ hepaticæ: disco subtus nigrante; utrinque maculis quinis lineaque limbī aureis; posticæ fulcæ: fasciis binis maculaque aureis.

In pratis, tota æstate, frequens.

Aureæ fasciæ & maculæ quoad colorem, non vero nitorem. Fascia antica alarum posticarum alia

alia triplo crassior. Abdomen alis anticus concolor: cingulis aureis. Antennæ setaceæ. Ovum luteum, nitidum, sphæricum. Sedentis alæ non horizontales, ut in prioribus, sed adscendentes.

565. PHALÆNA Aurata.

— long. lin. 4. lat. 2¹.

Diagn. Habitus & colorēs ut in priore, sed alæ antice maculis (4); posticæ unica, utrinque aureis, fasciis nullis.

In montanis Carniolie.

Nisi invenissem in copula utrumque sexum uniformem, cum priore facile conjunxissem. Mas abdomen, canis longisque pilis, terminatum habet. Alarum sedentis situs prioris.

566. PHALÆNA Bilineata.

— long. lin. 5. lat. 4.

LINN. Syst. Nat. p. 525.

Faun. Svec. 2. 1284.

Diagn. Alæ utrinque sulphureo ochreaceæ: anticæ supra lineis binis repando-dentatis fuscis albisque; omnibus subtus limbo fulcescente.

In pratis.

De scriptio *Ph. Bilineatae* LINN. nostræ quoque aptari potest, et si in aliis superioribus supra fasciam latam ponat, quæ in meis exemplaribus non occurrit, elota sine dubio a climate, remanentibus tamen lineis strigis duabus albidis utrinque eandem distinguuntibus, dentatisque potius quam repandis. Præter lineas hasce, duas aliae in nostris adflunt repandæ & albæ, sed obscuriores, una basim alæ ejusdem, altera limbum occupante. Sub aliis lineæ equidem repandæ sed fuscæ, punctumque fuscum sub qualibet ala occurrit. Antennæ setaceæ sunt.

567. PHALÆNA Ochrata.

— long. lin. 5. lat. 3¹.

Diagn. Alæ ochræ colore, subtus obscuriores; utrinque strigis transversis repandis obscurioribus.

In montanis Carniolie.

Antennæ mari leniter pectinatae, fæm. setaceæ. Strigæ incerto numero, nempe (2-4). Sub aliis posticis punctum strigis concolor, basim versus.

568. PHALÆNA *Limitata*.— long. lin. 8 lat. 5 $\frac{1}{4}$.Conf. *Ph. Prosapiarium.* LINN. Faun. Svec. 2. 1252.*Diagn.* Alæ ferrugineæ : anticæ supra fascia lata nigro puncto signata, limboque cervinis.

In pratis nostris, etiam subalpinis.

Mas pectinicornis. Alæ anticæ venis limbi nigris, lineolas (5-6) æque distitas parallelas præferentibus. Occurrit etiam alis iisdem supra cervinis; fasciis binis, ferrugineis. Alæ posticæ strigis repandis limboque obscurioribus. Sub alis anticis fascia nulla, limbus obscurior, punctumque fuscum in disco.

569. PHALÆNA *Pennata*.— long. lin. 6 $\frac{1}{4}$. lat. 4 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Antennæ amplæ, deflexæ, ubique pectinatæ : pectinibus pilosis. Alæ pallide-ferrugineæ ; fasciis obsoletis lineolisque plurimis confluentibus nebuloſæ.Inter *Quercus* & *Corylos*.

Alarum fimbria albida obscurioribus punctis variegata. Anticæ utrinque limbo obscuriore. Antennæ fuscæ : rachi pallidiore. Alæ posticæ utrinque fasciis tribus obscurioribus.

570. PHALÆNA *Spataceata*.

— long. lin. 6. lat. 4.

Diagn. Alæ osseæ ; strigis transversis obscurioribus repandis obsoletis, puncto nigro utrinque notatis.In agro *Labacensi*.

Seticornis, si lente observetur, punctulis raris nigris, hinc inde adspersa videtur, ad margines alarum puncta nigra. Alæ subtus pallidiores : anticæ strigis obsoletis fuscis binis fasciatæ ; posticæ unica.

571. PHALÆNA *Alpinata*.— long. lin. 5 $\frac{1}{4}$. lat. 3 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Fusco-cervina ; thorace capiteque nigrantibus tomentosis.

In

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 229

In summis herbidisque cacuminibus alpium
Vochinenium, *Carnioliae* super. abunde.

Hæc alas non penitus expandit, lente volat,
seticornis.

572. PHALÆNA *Murinata*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Murina tota, absque maculis fasciisque.

Circa *Labacum*.

Seticornis, pulchella, oculis fuscis.

573. PHALÆNA *Rivulata*.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$ lat. 3.

Diagn. Alba; alis anticis rivulis ferrugineis, posticis fascia strigisque duabus transversis fuscis; omnibus striga marginali utrinque ferruginea.

Copiosa apud nos in pratis, post primum fornicatum.

Habitus *Pyralis*, sed alæ sedentis expansæ *Geometram* indicant. Alarum primorum rivuli ita sunt constituti ut tres albas insulas in disco efficiant; harum pagina inferior rivos fuscos gerit, aut si velis, fusca est, maculis 4 in disco niveis, octo in limbo in unam seriem ordinatis. Alæ posticæ fascia limbi plerumque postico latere dentata, hujus lineæ nigricantes repandæ non attingunt marginem alæ oppositum; macula ferruginea imposita lineæ posticæ, in medio alæ. Corpus album, antennis setaceis. Pedes postici aliis longiores.

Variat, alis omnibus etiam subtus albis, roris obscurioribus, alisque posticis absque macula media ferruginea.

574. PHALÆNA *Litterata*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ linea transversa postica, alia antica, hisque interjecta littera (V), albis; posticæ fasciis binis angustis albis.

Habitat cum priore, copiosa pariter.

Linea alarum anticarum ad basim, subtus elongata, ibidemque maculæ duæ albæ contiguæ loco litteræ (V). Constantes sunt in omnibus. Color cervinus, &c. Alba linea transversa postica utrinque

R 3 in

in aliis primoribus. 3. Fasciolæ duæ albæ alarum posticarum utrinque, quarum postica arcuata nascitur e medio marginis externi & definit in margine superiore intervallo lineæ unius ab apice.

575. PHALÆNA *Lævigata.*— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Cinereo-murina; alis subdentatis: denticulis puncto nigro notatis; anticis strigis punctatis duabus, nigris.

In arbustis.

Strigæ dictæ fiunt punctis nigricantibus approximatis. Alæ posticæ binis obscurioribus strigis in medio fasciatæ, quas inter punctulum fuscum. Alæ omnes subtus concolores submuriæ, striga punctata obsoleta, punctoque fusco.

576. PHALÆNA *Inquinata.*— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$ ¹

Diagn. Tota pallide ferruginea; alis omnibus supra fasciis bilineatis fuscescentibus, subtus immaculatis.

In pratis, non frequens.

Seticornis, ut prior. Alis margine externo fusco-punctato: anticis bifasciatis: fasciis bilineatis; harum posticæ linea extima dentata, anticæ vero lineæ, ut serpens in Mercurii baculo, convolutis ita, ut duos annulos efficiant. Alæ posticæ fascia una bilinearis: linea postica dentata; linea alia antica obsoleta loco fasciæ secundæ.

577. PHALÆNA *Tenebrata.*— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Fuscescentes; alis anticis subtus macula flava; posticis utrinque fascia flava.

In montanis *Carniolie.*

Seticornis & semigeometra, seu alis semipatulis, nec tamen *Tortrix*. Alæ anticæ lineola alba prope apicem in margine crassiore, binisque similibus in fimbria terminali. Alæ posticæ albida fimbria terminata, subtus potissimum anticæ flavæ; limbo fusco; superne nigricantes; fascia flava non attingente marginem inferiorem.

Variat

Variat lineolis alarum super. flavescentibus,
aliisque subtus flavo polline adspersis.

578. PHALÆNA *Signata*.

— long. lin. 5. lat. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Albida; alis anticis supra strigis duabus obsoletis fuscescentibus, punctoque nigro utrinque.

In fylvis.

Seticornis; alis posticis subtus puncto fuscō signatis.

579. PHALÆNA *Despicata*.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ aut murinæ: anticæ fascia postica maculisque binis marginalibus, posticæ fasciæ binis ferrugineis.

In incultis, siccis, neglectisque locis.

Diagnosis data colores alarum supernos indicat, fasciis maculisque semper obsoletis. Alæ posticæ subtus ferrugineæ: fascia media punctoque baseos murinis. Margo quoque singulæ alæ externus, præfertim subtus, punctulis obscurioribus variegatus.

580. PHALÆNA *Nigrata*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

Diagn. Fusca; alis omnibus fimbria fasciaque albis: anticis punctis binis albis.

In districtu Idriensi, non frequens.

Fascia sub alis posticis interrupta, puncto in eadem pagina maculaque antica inferiori margini imposita, albis. Posticæ alæ macula ad basim alba subtus notatae. Tibiæ pallidæ.

581. PHALÆNA *Aethiopata*.

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Nigra; alis omnibus utrinque fascia albida.

In herbidis subsylvestribus.

Cum *Albicillata* LINN. Faun Svec. confundi nequit, juxta datam descriptionem. Nostræ enim alæ super. totæ nigræ sunt, ut & posteriores, quæ R 4 puncto

232 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

puncto centrali & arcu fusco carent; fascia quoque in nostris angusta nimis, quam ut latissima diceretur.

582. PHALÆNA *Obfuscata*.

— long. lin. 3. lat. 2.

Diagn. Fusco-nigra; Alis omnibus alba fimbria, maculaque flavæ.

In calidiore *Carniola*.

Alæ anticæ margo inferior subtus albus.

III. Tortrices. (†)

583. PHALÆNA *Podana*.

— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 3.

Diagn. Alæ ochreaceæ: anticæ cinnamomeæ: atomis strigaque media fuscescentibus, apice caudatis.

Habitat in *Rhododendro ferruginin.* cuius dura folia cum torquere non possit, filis unit, metamorphosin subitura.

Alæ posticæ latere abdomen spectante fusco. Corpus supra alis anticis concolor, subtus ochreaceum. Lingua nulla.

Larva albida, capite castaneo lucido. Pupa fusca glabra.

543. PHALÆNA *Bergmanniana*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 531.

Faun. Svec. 2. 1324.

Diagn. Alæ anticæ flavæ: nodulis binis, fasciisque (4) argenteis: margine fusco-ferrugineo.

Habitat in *Rosa hortensi* frequens, sed nunquam in nemoribus.

Rosana

(†) *Tortricum* alæ anticæ margo exterior totus curvus. eademque semper & insigniter deflexæ. Palpi clavati, breves, obtusissimi: articulo ultimo tenui, pilis alterius, cui insidet vix longiore.

Rofana. Cel. LINN. non est. *Bergmanniana* descriptio huic etiam convenit. Alæ anticæ supra flavæ; nodulis binis parvis in medio, quorum unus nigricans. In singulis alis hisce fasciæ argenteæ: margine fusco-ferrugineo, quatuor: tertia bifida. Palpi, caput, thorax colore alarum superiorum. Oculi nigri. Antennæ supra flavæ, subtus obscuriores. Alæ anticæ subtus flavicantes: fasciis fuscis; posticæ utrinque pallide fuscæ.

Larva albida, agilis, capite nigro, linea proprie caput transversa nigra, pedibus pectoralibus fuscis, postice pallidior.

585. PHALÆNA *Rubiana.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{4}$. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ fuscescentes: anticæ supra cinerascentes: macula communi postica subovata brunea, macula apicis punctisque tribus posticis crassiori margini impositis bruneis.

Habitat in *Rubo fruticoso*.

T *Uddmanniana*, & *Afströmiana* LINN. quasdam notulas cum nostra communes habent, an vero alterutra vere nostra, valde dubito. Metamorphosim subitura, summa folia complicat in nodum, indeque prodiit mihi 19. Iunii, antennis corpore duplo brevioribus, palpis clavatis, alis posticis fimbria pallidiore, anticis basi & apice obscurioribus, macula communi margine albido cincta.

586. PHALÆNA *Fasciana.*

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1304.

Diagn. Alæ anticæ supra fusco glaucoque variæ: fascia lata albida postica.

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Alas cinerascentes habet LINN. quæ tamen revera glauco-cæruleæ sunt punctisque fuscis aut nigris nebulosæ, margo alæ posticus fuscescens, fascia alba summa latitudine, quæ est in margine alæ crassiore, æquat latitudinem paginæ proximæ glauco-fuscæ, eodemque in margine punctis fuscis (4) notata. Alæ posticæ utrinque subcinereæ. Tibiæ fasciæ concolores, fusco-annulatae.

587. PHALÆNA *Solandriana*.

— long. lin. 5. lat. 2 $\frac{1}{2}$.
LINN. Syst. Nat. p. 532.
Faun. Svec. 2. 1327.

Diagn. Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alæ anticæ margo crassior apicem versus fusco-punctatus.

Cum sim in multiplicandis, absque summa necessitate, speciebus, certe non facilis, ita ex situ maculae communis, *Phalæna* huic uni propriæ, *Solandriana* LINNÆI facio, quidquid alas pallidas & maculam ferrugineam suæ tribuat Ill. Eques. Et nihil novi est variare colores in eadem specie; nostra enim 1. alæ anticis nigro-cinereoque nebulosis; basi ferrugineis & fusco punctatis, macula cinerascente; 2. ferrugineo-fuscoque nebulosis, macula pallide straminea; 3. murinis atomisque fuscis, macula media albida.

588. PHALÆNA *Cervana*.

— long. lin. 5. lat. 2 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Alæ anticæ cervinæ; limbo ferrugineo- & fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In Ericetis.

Ala eadem inter fasciam & basim pallidior. Lineolæ duæ fuscae in limbo parallelæ longitudinales, punctaque tria fusca in margine exteriore versum apicem collocata.

589. PHALÆNA *Lambergiana*.

— long. lin. 4. lat. 2 $\frac{1}{2}$.
Diagn. Alæ anticæ corticinæ; strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa Idriam non rara.

Ala antica basi linea media longitudinali parva, aliaque ibidem marginali, e cuius apice brevior alia transversa nascitur, his succedit striga transversa prima, a qua intervallo lin. 1 $\frac{1}{2}$ distat secunda interrupta, angulum alæ posticum una extremitate respiciens sed non attingens; strigæ cætera binæ posticæ sunt, una in limbo, altera in apice. Inter strigam primam & interruptam secundam est macula ob-

oblonga parva nigra tria puncta plumbea fovea; prope hanc maculam est lineola ablida alæ medium occupans, longitudinalis, postice bifida. Alæ fimbria fusco plumbea. Confer. *Phal. Arcuana* LINN. *Faun. Svec.* 2. 1317. huic similem.

Nomen imposui in honorem Ill. & Remi. D. D. Caroli S. R. J. Comitis à LAMBERG, p. m. Insectorum olim amantissimi, cuius benevolentia collecțio nostra sua debet incrementa.

590. PHALÆNA Wulfeniana.

— long. lin. 3. lat. 1½.

Diagn. Nigricans, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticæ utrinque notatae.

In sylvestribus, circa Idriam.

Alæ anticæ margo inferior, basim versus, albidus, puncto albo subtus prope marginem crassiore, distans lineæ unius ab apice. Tibiae anticæ albo annulatae.

A. R. P. Franc. Xav. WULFEN è S. J. ut omnium rerum naturalium, ita & Insectorum amantissimus, horum quoque specimina quædam & icones nonnullas, una cum optimis descriptionibus, comunicavit.

591. PHALÆNA Rufana.

— long. lin. 4½. lat. 2½.

Diagn. Alæ anticæ ferrugineæ, glauco-punctatae. In Salicetis, Majo M.

Puncta glauca numerosa, eaque postice quasi in strigas transversas ordinata.

592. PHALÆNA Plumbana.

— long. lin. 3. lat. 1½.

Diagn. Alæ anticæ basi fuscescentes; posticæ ferrugineæ, lituris transversis hamatis plumbeis, punctisque (2-3) nigris marginalibus ad angulum posticum.

In herbidis.

Palpi potissimum, lamella obtusa clavati, separant a *Tineis*, a quibus alias ægerime distinguuntur. Alæ superiores antice fuscescentes, punctisque ferrugineis nebulosæ; fimbria ejusdem alæ plumbea

bea pariter, sed paulo obscurior, quam strigæ, quærum hami oppositi.

593. PHALÆNA *Ruficana*.

— long. 4. lin. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; maculis obsoletis fasciaque pallide caffeatæ.

Circa tuguria & possessiones Rusticorum.

Ad basim alæ maculæ dictæ duæ, fascia in medio, maculæ tres posticæ, puncta (4) postica crassiori margini imposita. Pectus argenteum. Tibiæ pallide fusco-annulatæ.

594. PHALÆNA *Miscellana*.

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ cervinæ fusco-punctatæ; striis transversis interruptis plumbeis, fascia media fuscescente: plumbeo punto notata.

In nemoribus, hortis, pomariis, Majo M.

Miscella colorum fere indistinguibilem. Strigæ plumbeæ sæpius abruptæ (5-6). Color alæ cervinus equidem sed leniter etiam ferrugineus. Puncta fusca (4), postica, in margine crassiore. Caput inter antennas cervino — ferrugineis villis tomentosum. Tibiæ fusco-annulatæ.

595. PHALÆNA *Montana*.

— long. lin. 3. lat. $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ fuscae, macula communis media marginaque crassiore postice ferrugineis; strigis binis posticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In montanis Carniolie.

Margo alæ ubi ferrugineus, ibi & fusco-punctatus. Abdomen nigrum.

596. PHALÆNA *Cana*.

— long. lin. 6. lat. 3.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; fronte atomisque cervinis.

Inter Corylos.

Alæ super. punctis cervinis vagis variegatae. Pectoris latera & femora antica subtus subargentea.

597. PHALÆNA *Pedana.*— long. lin. 5. lat. lin. 2 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Alæ anticæ cinereo-fuscoque nebulosæ: apice striis obliquis ferrugineis.

Inter frutices.

Striæ posticæ subquaternæ, una cum fimbria, ferrugineaæ. Puncta (5) castanea in margine crassiore versus apicem. Pedes subargentei: postici longi & crassi. Pectoris latera argentea. Tibiæ annulis nigricantibus,

598. PHALÆNA *Umbriana.*

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Umbrina; alis anticis cinereis fascia punctisque marginalibus fuscescentibus.

In pratis.

Margo crassior, alæ superioris, posticæ albo-fuscoque punctatus. Fimbriæ margo albidus.

599. PHALÆNA *Formosana.*

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticae nigro-corticinoque variæ: strigis tribus submarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus (8).

Circa Idriam reperta, in pomariis.

Color prævalens niger, corticino variegatus. Strigæ non attingunt marginem alæ crassiores, cui proximæ; harum postica oritur e quinta puncto albo (ab apice sursum numerando) & definit in margine alæ fimbriato lineaæ fere distantia ab apice. In limbo ejusdem alæ puncta tria plumbea: binis submarginalibus. Inter bina puncta ex hisce sunt duæ parvæ parallelæ corticinæ lineolæ. Fimbria nigra, punctis tribus corticinis variegata.

600. PHALÆNA *Rivulana.*

— long. lin. 4 lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ murinæ; fascia rivulisque posticis, albidis.

In sylvis.

, Fascia

Fascia antica & rivuli fiunt lineis binis. Rivi ita siti, ut duas insulas murinas faciant, nempe unam subovatam inferiorique margini alæ ejusdem imposita, alteram subconicam obliquam duplo longiorem: convergente apice angulo postico proximo. In margine crassiore puncta murina (4) versus apicem posita. Alæ posticæ utrinque pallidæ; anticæ subtus fuscæ.

601. PHALÆNA *Gramineana*.— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Alæ anticæ atomis fasciisque binis obsoletis fuscescensibus.

In herbidis collibus.

Fasciæ undulatae, non attingunt marginem alæ oppositum. Pectus & femora argenteis squamulis adspersa.

602. PHALÆNA *Capillitiana*.

— long. lin. 4. lat. 2.

Diagn. Alæ anticæ subferrugineaæ; punctis marginalibus capite palpisque albidi.

In fylvestribus locis.

Ratio nominis ex denso pilorum capillitio capiti imposito. Oculi nigri. Alæ subtus fuscæ; posticæ utrinque pallide fuscæ. Pectus argenteum.

603. PHALÆNA *Ossaana*.— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$. lat. 1 $\frac{1}{2}$

Diagn. Alæ anticæ ossæ; atomis fuscis, puncto apicis fuscescente.

In herbidis.

Palpi, caput, colore alarum superiorum, ut & thorax tibiæque. In medio ejusdem alæ, puncta duo obsoleta fusca. Oculi nigri.

604. PHALÆNA *Pyraliana*.— long. lin. 3. lat. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ ferrugineaæ; limbo obscuriore, fasciisque binis fuscis.

In fylvis.

Pyrali proxima ob alas obliquius postice truncatas ac in omnibus aliis enumeratis. Palpi etiam

etiam articulus ultimus, alterius pilis paulo longior est.

IV. Pyrales (†).

(a) *Palpis recurvata*.

605. PHALÆNA *Barbalis*.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1345.

Diagn. Alæ omnes utrinque cinerascentes; atomis strigisque tribus. Antennæ subpectinatæ. Femora antica barbata.

Circa *Labacum*.

Palpi lin. 2. longi. Oculi fusti. Margo alæ anticæ fusco-punctatus. Alæ posticæ striga limbi unica, subtus pallidiores.

606. PHALÆNA *Proboscidalis*.

— long. lin. 6.

LINN. Syst. Nat. p. 533.

Faun. Svec. 2. 1346.

Diagn. Alæ anticæ supra cinereæ; fasciis tribus fuscis: margine utrinque ferrugineo; postica in alæ apice desinente. Antennæ subpectinatæ.

In *Carniola* non rara.

Palpi subrecurvati, fusti, lineam longi. Alæ super fimbria ferruginea. Alæ posticæ fuscescentes: limbo obscuriore; subtus striga obsoleta fuscescente.

607. PHALÆNA *Anthracinalis*.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennæ mari pectinatæ.

Circa

(†) Alæ leniter deflexæ, quarum latitudo summa est dimidia longitudinis; ab hoc autem punto ducatur linea recta ad angulum posticum, aliaque opposita ab angulo postico ad apicem, sic triangulum rectum aut quasi rectum exsurget.

140 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

Circa torrentes, hinc forte in *Salicibus*.

Mas. Antennæ pectinatæ, (4) lin. longæ; rachi alba nigro-annulata; pectinibus capillaceis fuscis pilosis sub antennis pili flavi, post antennas fasciculus pilorum flavorum utrinque. Palpi barbati, articulo ultimo recurvato, nec barbato, tenui. Alæ anticæ maculis niveis (10), punctisque niveis posticis (4); fimbria anticarum nigricante: punctis binis albis, posticarum albida. Alæ posticæ subtus macula alba media. Pedes nigri, tibiis albo-annulatis.

Fæmina. Antennæ setaceæ. Caput totum nigrum; cæterum alia omnia, ut in mare.

608. PHALÆNA *Farinalis.*

— long. lin. 5½.

LINN. Syst. Nat. p. 533.

Faun. Svec. 2. 1348.

P. PODA. Mus. Græc. p. 94.

Diagn. Alæ anticæ basi & limbo caryophyl- linis, media parte pallide cervina; marginibus re- pandis albidis.

Habitat in farina.

Talis certe nostra, qualem descripsi, parte media nunquam glauca; quandoque tamen loco coloris caryophyllini est fusco-ferrugineus, qualis etiam in alæ apice subtus. Vidi & in uno sexu antennas subpectinatas. Alæ posticæ, subtus fal- tem albidae, punctis fuscis marginalibus.

609. PHALÆNA *Citrinalis.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ citrinæ: posticæ pallidiores imma- culatæ; anticæ fascia submarginali & crateræ san- guineo reticulatæ.

Inveni circa *Idriam*, in *Rosenberg*. 4. Junii.

Palpi lin. 1½. longi. Oculi nigri. Antennæ setaceæ. Nullæ maculæ sub alis anticis. Alæ anti- cæ lineolis depresso striatae.

610. PHALÆNA *Trabealis.*

— long. lin. 4½.

Diagn. Alæ anticæ paleaceæ; fasciis binis, trabe longitudinali maculisque (5) nigris.

Labaco

Labaco mortuam & expansam accepi, incertus ideo an vere *Pyralis*, quod suadent palpi, & alarum figura.

Margo alæ super. niger, fasciæ in limbo posse subundulatae, trabs margini inferiori parallela, maculae tres superiori margini adnatæ, palpi breves, alæ anticæ subtus fuscæcentes: margine paleaceo; posticæ supra fuscæcentes; subtus pallidiores: litura transversa punctoque medio fuscis.

611. PHALÆNA *Cristalis*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ fuscæ: anticæ supra ferrugineo-fuscoque nebulosæ, cristula nigricante in medio notatæ.

Circa *Idriam*.

Palpi lin. 1 $\frac{1}{2}$ longi. Fimbria alis posticis concolor. Alæ subtus politæ.

Larva nuda, de cauda pendens, fulva cum partui proxima.

612. PHALÆNA *Lunalis*.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ strigis tribus obfoletis lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Palpi lin. 2 longi. Antennæ setaceæ. Alæ omnes utrinque lineola lunulata fulca, plus minusve conspicua in medio notatæ.

613. PHALÆNA *Viminalis*.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ murinæ; fascia obscuriore utrinque.

Habitat in, aut circa *Salicem viminalem*.

Palpi vix lineam longi. Alæ anticæ limbo obscuriore: posticæ subtus fascia punctoque fuscis.

(b) *Palpis porrectis*.

614. PHALÆNA *Extimalis*.

— long. lin. 5.

Diagn. Alba; alis anticis apice ferrugineis.

S In

242 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

In agro Labacensi.

Oculi brunei. Alæ anticæ subtus etiam apicæ maculisque binis marginalibus ferrugineis; posticæ margine utrinque punctis ferrugineis.

615. PHALÆNA Sericealis.

— long. lin. 4.

Diagn. Tota subossea sed ferici in modum nitens; alis anticis macula obsoleta fuscescente.

Habitat cum priore.

Oculi fuscii.

616. PHALÆNA Ruralis.

— long. lin. 7.

Diagn. Alæ paleaceæ; strigis transversis, undulatis, obsoletis, fuscis.

Ruri degit, non rara.

Alæ anticæ supra strigis tribus, subtus limbo fuscescente; posticæ utrinque striga una & fascia limbi obsoletis fuscis. Oculi brunei. Corpus alis concolor. Pedes albidi. Variat strigis manifestis dentatisque.

617. PHALÆNA Trivialis.

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ paleaceæ: anticæ supra fascia lineis tribus obscurioribus composita, ab alæ margine inferiore nata & in apicem desinente.

Vulgaris apud nos, in hortis, & pratis.

Supra hanc fasciam sunt etiam strigulæ duæ eidem parallelæ & concolores, alæ medium occupantes, neutrum vero marginem attingentes. Linea fusca in margine alarum omnium externo utrinque. Alæ posticæ utrinque punctorum obsoletorum & fuscocentium ferie transversa prope limbum; punctoque alio simili subtus prope basim.

618. PHALÆNA Nemoralis.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ anticæ basi osseæ; vena is paleaceis reticulata; limbo paleaceo; parte intermedia vinaceæ; margine externo repando

In nemoribus frigidis, umbrosis.

Alæ.

Alarum media pars obcuriore repandaque linea utrinque dividitur a coloribus baseos & limbi, ut in *Ph. Farinali*, & maculam obsoletam limbo concolorem in medio, versus marginem crassiforem habet, ejusdem color dictus postice dilutior est. Margo externus repandus, & quasi dentate in medio instructus, huic uni proprius; idem terminatus fimbria albo & paleo varia. Eadem ala subtus subpaleacea, striga fuscescente undulata abrupta. Posticæ a'æ utrinque colore paginae inferioris alarum superiorum, frigique undulata postica fusca fasciatæ.

619. PHALÆNA *Majalis*.

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ supra albæ; fasciis tribus, interruptis, —fuscescentibus. Pedesque argentei; tibiis fusco-annulatis.

In pratis Mayo M.

Hæstavi an *Tineis* adnumerarem, sed palpi & alæ removent a confortio *Tincarum* & *Tetriciæ*. Huic, ut aliis non paucis hujus ordinis, palporum paria duo: antico albo & nino, inferiore vero nigricante & longiore. Alæ anticæ subtus fuscescentes; posticæ utrinque albidæ: limbo obcuriore, subtus striga fuscescente fasciato.

V. *Tineæ* (†).(a) *Alis convolutis*.620. PHALÆNA *Perlælla*.

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ supra eodem prorsus, quo perlæ, colore fulgidæ; subtus fuscescentes.

S 2

In

(†) Alæ reversæ: margine interno longius fimbriato, praesertim ad angulum posticum, latitudine minus dimidia longitudinis parte. *Tinearum* copia, parvitas, pulcritudo stupenda, ut in his potissimum Natura thesauros suos effundit videatur, tantaque in minimis hicce max-

In pratis, Majo M., non rara.
Palpi porrecti, leniter deflexi, lin. 1½ longi.
Femora antica, subtus fusca.

621. PHALÆNA *Pascuella*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 535.
Faun. Svec. 2. 1367. sic mihi videtur.

Diagn. Alæ anticæ pallide aurantiæ; linea alba longitudinali, a basi fere ad limbum usque producta, utrinque acuminata, inferiore latere dente in medio instructa; linea limbi transversa, aliaque marginali argenteis: area his interjecta cinerea; apice introrsum plicato.

In pratis.

Aurantius alæ color prope lineam argenteam limbi evidentior. Maculæ duæ albæ oblongæ inter limbum & apicem lineæ longitudinalis, quibus maculis interjacet lineola argentea. Inter marginem inferiorem & maculam albam lineolæ parallelæ tres argenteæ jacent. Margo alæ finu excavatus, ad apicem inflexum; ad marginem eundem puncta (5) nigra; fimbria argentea inflexa. Pagina plicati apicis binis maculis albis lateralibus praedita. Ala antica subtus fusca, margine pallidiore punctisque (5) nigris notato. Alæ posticæ utrinque fuscescentes: fimbria lucidior. Palpi porrecti, fuscescentes, lineam longi.

622. PHALÆNA *Pinetella*.

— long. lin. 5.

LINN. Syst. Nat. p. 539. Pinella.
Faun. Svec. 2. 1368.

Diagn. Alæ anticæ ut in priore; sed alba pyramide longitudinali fasciis binis colore alæ interrupta.

In gramineis.

Dor-

majestas, ut admirari potius eam liceat, quam aptis verbis indicare.

Dorsum, caput, palpi supra, albi coloris, ut & corpus subtus femoraque. Tibiæ alis concolores. Puncta marginalia nigra plicis interjecta, in alis anticis.

623. PHALÆNA *Semirubella.*

— long. lin. 6.

Diagn. Alæ anticæ vinaceæ, semipaleaceæ.

Habitat cum priore.

Alæ superiores dimidia interna parte longitudinaliter paleaceæ. Palpi surrecti. Thorax paleatus: latere vinosus.

624. PHALÆNA *Rosella.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ albæ, semiroseæ. Occiput aureum.

In herbidis collibus, rarer.

Palpi surrecti. Alarum margo utrinque nigricante linea signatus. Alæ fuscæ: anticæ dimidia interna pagina longitudinaliter alba, altera rosea.

625. PHALÆNA *Viduella.*

— long. lin. 4½.

Diagn. Alæ anticæ albæ; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiore decurrente.

In sylvis, rarer & solitaria.

Oculi nigri. Antennæ supra albæ, subtus fuscæ. Caput cum thorace album. Alæ anticæ punctis binis nigris prope lineam fuscam, senisque minoribus in margine externo. Alæ posticæ utrinque fuscescentes.

626. PHALÆNA *Fuscella.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ canescentes, fusco-punctatae.

In montanis nostris, paucim.

Tota unicolor, subcanescens, punctulis copiosis fuscis nebulosa.

627. PHALÆNA *Craterella*.— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Alæ anticæ albidae; lineis longitudina-

libus octo binisque transversis ferrugineis.

In Gramine.

Palpi porrecti lin. 1 $\frac{1}{2}$ longi; fimbria alæ su-

per. argentea.

628. PHALÆNA *Chrysonuhella*.— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.*Diagn.* Alæ albida; margine crassiore, pun-

ctulis sparsis,

strigisque binis transversis fusce-

scentibus.

In pratis.

Differt a priore, occipite fulvo, alis fusco-

punctatis exterius ad marginem crassorem fusce-

scentibus, striga postica arcuata, antica obsoleta.

Caterum & huic palpi lin. 1 $\frac{1}{2}$ longi, alarumque

superiorum fimbria argentea.

629. PHALÆNA *Virginella*.

— long. lin. 5.

Diagn. Pal'ida tota & albicans; alis anticis

maculis duabus albissimis: anteriore conica, poste-

riore quadrata.

In nemoribus.

. Maculæ albæ ut in *Ph. Finetella*, sed colores

alii, & linea nulla alba marginalis sub macula te-

tragona.

630. PHALÆNA *Culmella*.— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1370.

Diagn. Albida tota & immaculata; alis posti-

cis fimbria argentea; oculis nigris.

In agro Labacensi.

Subtus paulo obscurior, quam supra. Alæ

anticæ margo exterior punctis nigris notatus.

631. PHALÆNA *Evonymella*.— long. lin. 5 $\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 534.

Faun. Svec. 2. 1363.

Roe-

Phalæna. LEPIDOPTERA. Phalæna. 247

ROESEL. Papil. Noct. Cl. IV. Tab. 8.

fig. 4. 5.

Diagn. Alæ anticæ supra albæ; punctis nigris ad (27).

Habitat in *Erythronium vulgari*.

Antennæ albæ, subtus nigro-punctatæ. Palpi, pedes, caput, thorax, pariter alba. Thorax punctis binis nigris, valvulis puncto nigro notatis. Functa nigra in singulis alis anticus (23-27): marginalibus minoribus magisque contiguis. Alæ eadem subtus fimbria marginaque toto albæ, alibi fuscæ; posticæ utrinque fuscæ, fimbria alba.

Larva pallide lutea, puncto nigro laterali in quolibet annulo, capite nigro: pedibus pectoralibus feminigris. Harum plures habitant in sociate sub communī tentorio, e quo, consumptis vicinis foliis emigrant & in superioribus ramis, aliud nent. Folliculos sèpius parallelos conlînuunt intra tentorium.

632. PHALÆNA *Padella*.

— long. lin. 4½.

LINN. Syst. Nat. p. 535.

Faun. Svec. 2. 1364.

Diagn. Similis priori, sed diversa 1. punctis paucioribus, nec ultra (20); 2. alis anticus minus albæ, subtus ubique fuscis; 3. alis posticis utrinque fuscis totis.

Habitat in pomiferis arboribus.

633. PHALÆNA *Cornutella*.

— long. lin. 5½.

Diagn. Tota ossea & polita; palpis erectis.

In pratis.

Oculi fuscæ. Palpi lineam longi, erecti, duo cornua referunt.

634. PHALÆNA *Nifella*.

— long. lin. 4¾.

LINN. Faun. Svec. 2. 1377.

Diagn. Alæ anticæ canescentes; macula communi, ovata, nigricante.

In fylvis.

248. Phalæna. **ORDO III.** **Phalæna.**

Puncta (4) fusca in margine crassiore postice sita, quinto majore apicem occupante. Macula communis nigricans: margine eroso.

635. PHALÆNA Marginella.

— long. lin. $3\frac{1}{2}$,

Diagn. Pallide caryophyllina; alis anticis margine crassiore pallidiore punctisque (6-7) caryophyllinis variegato, fimbria subargentea.

In pomariis, circa *Idriam*, Majo M.

Palpi pallidi, articulo ultimo alis concolore,

(**) *Alis planiusculis.*

636. PHALÆNA Paliatella.

— long. lin. 7.

Diagn. Offea tota; alis impositis; oculis nigris.

In nemoribus nostris, non rara.

Alæ anticæ una, in hac specie, supra alteram posita, quo situ alarum convexa fit pars superior animalis. Alæ posticæ plicis duabus. Lingua ferruginea. Abdomen alis brevius.

637. PHALÆNA Cervinella.

— long. lin. $5\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ cervinæ: anticæ punctis posticis nigris (4) in margine crassiore, (7) in exteriore. Corpus subtus subargenteum.

In pratis, Junio M.

Oculi fuscæ.

638. PHALÆNA Forficella.

— long. lin. 5.

Diagn. Alæ anticæ fusco-ferrugineæ; capite, striga a basi ad angulum posticum extensa, maculaque obliqua postica marginis crassioris, subaurei coloris.

In sylvis.

Alarum situs ut in *Pyrali*, sed character *Tinea*. Oculi nigri. Alæ posticæ totæ, anticæ subtus, fuscæ. Corpus subauratum.

639. PHALÆNA *Flavella.*

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Caput, dorsum, alæ anticæ supra flavæ ferrugineo-subfasciatæ.

In nemoribus umbrosis.

Fasciarum trium, in singulis alis, rudera ferruginea. Palpi flavi, porrecti, lineam longi. Alæ omnes subtus fuscescentes.

640. PHALÆNA *Gemmella.*

— long. lin. 3 $\frac{3}{4}$.

Diagn. Alæ anticæ flavescentes; fasciis ferrugineis punctisque argenteis variegatæ.

In collibus nostris, non semel visa.

Fasciæ duo: postica subabrupta. Alæ basis fimbriaque fasciis concolor. Puncta lineaque argenteæ sparsæ, præsertim super paginam flavescensem. Alæ anticæ subtus fuscæ, albido-punctulatæ; posticæ supra pallide fuscæ, lineis obscurioribus longitudinalibus striatæ, subtus albo-fuscoque nebulosæ. Abdomen nigrum; cingulis pallidis. Tibiæ pallidæ, fusco-annulatæ; posticæ crassiores & pilosiores.

641. PHALÆNA *Eclipsella.*

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Obscure cana; alis anticis margine crassiore nigro-punctatis.

In pratis.

Alæ anticæ *Tortricum*, posticæ *Tinearum*; cum vero planæ penitus non sint, ita *Tineis* adnumera vi. Huic alæ anticæ obsoletissima obscuriore fascia, punctisque fuscis sparsis exiguis variegatæ. Pagina interiorum earumdem alarum obscurior, quam eadem pagina posticarum.

642. PHALÆNA *Bicostella.*

— long. lin. 5.

LINN. Faun. Svec. 2. 1438.

Diagn. Caput, dorsum, alæ anticæ, alba; linea longitudinali ferruginea a basi ad apicem excurren-

S 5 ren.

150 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

rente prope marginem crassorem; disco punctis subternis atris.

Circa *Idriam* capta.

Palpi immella lineam longa, pilosa, supra albicans, subtus fusca, articulo tenui fusco parvo, tanquam arista, terminata. Oculi nigri. Alæ anticæ margo posticus punctis (7) fuscescentibus; posticæ colore pedum posticorum. Abdomen superne nigris lineis transversis fasciatum.

643. PHALÆNA *Mucronella*.

— long. lin. 6 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ omnes lanceolatæ, mucronatæ, nitidæ, concolores, pallidæ: anticæ longitudinaliter fusco-fublineatae.

Unicam collegi A. 1759. circa *Idriam*.

Palpi porrecti. Lipgua ferruginea.

644. PHALÆNA *Scabiosella*.

— long. lin. 4.

P. PODA. Mus. Græc. p. 94. Metallica.

Diagn. Alæ anticæ auratæ, margine subtusque una cum posticis utrinque hæmatiticæ lucidæ. Antennæ alis longiores, albæ, basi nigricantes.

Insidet perpetuo floribus *Scabiosæ officinæ*.

Pigrum, præter ingenium gentis suæ, animal. Sexus unus occipite aurato, antennisque semiuncialibus; alter occipite fusco, antennis lin. (10-11) longis. Femora aurata. Tibiæ alis posticis concolores.

645. PHALÆNA *Viridella*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ viridi-auratæ. Femora postica barbata.

Habitat in Sylvis *Idriensibus* Majo M.

Sexus unus antennis, lin. 4 $\frac{1}{2}$ longis obscure violaceis: apice albis. Alæ posticæ subtus antennis concolores; posticæ supra obscure violaceæ, subtus limbo aurato-viridi. Sexus alter antennis fere uncialibus, albidis; pectore barbato; alis subtus obscurioribus.

646. PHALÆNA *Barbatella.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ glaucæ, aurato-punctatae. Palpi barbati. Antennæ alis longiores; apice albidæ.

In collibus gramineis *Carniolia super.*

Difflert a *Reaumurella* Ill. LINNÆI, corpore viridi-æneo, fronte nigra, alis antrosum magis auratis. Huic non pectus, non femora ulla barbata; alæ etiam subtus nulla tinctura rubro-violacea fulgidæ, ut in priore.

647. PHALÆNA *Degeerella.*

— long. lin. 2.

LINN. Syst. Nat. p. 540.

Faun. Svec. 2. 1393.

Diagn. Alæ nigræ; fascia argenteo-aurea. Antennæ longæ.

Labaco misit Amicissimus & R. P. WULFEN.

Ill. LINN. in Syst. Nat. fasciam argenteam, in Faun. Svec. 2. flavam, ponit; ego inter utrumque colorem medianum video.

648. PHALÆNA *Cræsella.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ fature violaceæ: anticæ fascia, basi & apice, lineisque longitudinalibus (5-7) aureis. Antennæ longissimæ, albidæ.

In *Erythronio vulg.* capta circa *Idriam*.

Pulcherrima; alis ita coloratis, ac si argento lœvigate fature violaceus color superinductus fuisset. Fascia alæ medium occupat, lineæ limbum: quarum mediæ longiores, ut fistulæ in organo. Ad basim alæ lineæ aliæ quinque longitudinales, pariter aureæ. Alæ eadem subtus fascia aurea, sed absque lineis. Dorsum aureum, præfertim anticæ. Caput rufis pilis pubescens. Antennæ lin. 6 $\frac{1}{2}$ longæ. Cræseas ostentat opes, vanumque nitorem.

649. PHALÆNA *Rufimitrella.*

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Caput lana rufa vestitum. Corpus nigrum. Alæ fuscae: anticæ supra fusco-viridi æneæ.

In

252 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

In sylvestribus, non rara, in floribus Majo M.
Femora postica barbata & crassiora. Alæ posticæ fimbria alis anticis concolor. *Ph. Capitella* LINN. Faun. Svec. maculas tres albido-flavescentes in singulis alis superioribus habet, caput vero lana helvola vestitum, ergo non nostra, quæ *Cathellæ* LINN. proxima.

650. PHALÆNA Hemerobiella.

FRISCH. Inf. I. Tab. II, fig. 4. 6.

Diagn. Alæ anticæ canæ, fusco-punctulatæ. Tibiæ posticæ plumosæ.

Larva degit intra tubulum rufescens, apice trigonum, qui foliis perpendiculariter inpositus paßim appetet, & circumfertur a larva de loco in locum.

651. PHALÆNA Vorticella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

LINN. Faun. Svec. 2. 1381. cinctella.

Diagn. Nigra; alis anticis fascia alba, linearis.
In foliis fruticum, frequens.

Vorticellam dixi, quia sedens, circa idem punctum, se se in circulum sœpe gyrat. Huic præterea alæ sedentis planæ. Antennæ tibiæque posticæ albo-annulatæ.

652. PHALÆNA Obscurella.

— long. lin. 4 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; alis anticis supra fusco-auratis,
apice subhæmatiticis.

In Carniola interiore.

Caput, thorax, pedes, colore alarum superiorum.

653. PHALÆNA Feneſtrella.

— long. lin. 3.

Diagn. Alæ anticæ albidæ; maculis punctisque nigris, postice nebula subaurata.

Circa fenestras occurrit, primo vere.

Hæc, cum sequentibus aliis quatuor, caput album habet. Puncta & maculæ pleræque insident margini crassiori.

654.

654. PHALÆNA *Scalælla.*

— long. lin. 2.

Diagn. Alæ anticæ albæ; tribus paribus punctorum nigrorum, contiguorum, totidem obliquas & que dissitas veluti fascias præferentium.

Majo M. reperitur, ruri.

Fasciolæ illæ scalam repræsentant, licet quandoque unicum punctum sit, cum aliis in unam longitudinaliæ quasi lineam coalescens. Palpi albi: articulo ultimo punctis binis atris.

655. PHALÆNA *Punctella.*— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ niveæ; punctis fuscescentibus, in apice confluentibus, variegatæ.

Ruri degit, inter *Corylos*.

Antennæ albæ, fusco-annulatæ. Oculi nigri. Caput cum thorace niveum. Alæ anticæ obsoleta fascia punctisque fuscescentibus: pluribus in apice. Tibiæ albæ, nigro-annulatæ.

656. PHALÆNA *Comella.*— long. lin. 2 $\frac{1}{4}$.

Diagn. Capillitium album, alba coma per marginem alæ internum decurrente auctum. Alæ anticæ ferrugineæ; fascia obscuriore, obsoleta, obliqua.

Circa domos & hortos volitat, Junio M.

Ubi desinit coma, ibi incipit fascia, sub qua idem alæ margo denuo albicans est. Antennæ albæ, fusco-annulatæ.

657. PHALÆNA *Pufiella.*— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ cauda repanda terminata, posticæ lineares.

In pratis.

Hæc & tres sequentes, alas anticas caudatas habent.

Alæ osseæ, puncto fusco, caudæ imposito.

658. PHALÆNA *Thrafonella.*— long. lin. 2 $\frac{2}{3}$.

Diagn.

254 Phalæna. ORDO III. Phalæna.

Diagn. Alæ anticæ fusco-auratæ, lineis strigis transversis argenteis, macula nigra ad angulum posticum, in qua puncta tria argentea.

Habitat in herbidis paludofis.

Fascia una integra, tres abruptæ, strigæ duæ. Thorax antice argenteus. Punctum nigrum in cauda, seu lobo, alæ apicem terminante.

659. PHALÆNA Equitella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ caudula e margine exteriore nata, loboque terminata; lituris in margine eodem quinis, in opposito vero binis argenteis.

Habitat cum priore.

Intra lobum alæ macula subovata nigra. Lineolæ duæ anticæ obliquæ in formam literæ (V), sed disjunctæ; in alæ limbo puncta tria argentea.

660. PHALÆNA Aruncella.

— long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ auratæ, cum intermixto violaceo-rubro colore; fronte aureis pilis pubescente.

Copiosa in paniculis *Actææ*, *Arunci*.

Antennæ nigricantes. *Mas* fascia pallida linearis; *Femina* absque alarum fascia.

661. PHALÆNA Alchimiella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ aureæ; strigæ transversæ, antica, maculaque lanceolata apicis, laccæ colore.

Circa *Idriam* reperta.

Oculi nigri. Palpi aurei: apice fusco-rubri. Antennæ subæquales. Frons & alæ auri colorem nitoremque æmulantes. Femora fusco-rubra. Tibiae argenteæ: annulis fuscis. Felices Alchemistæ si tinctura hac solari sua saturare metalla possent!

662. PHALÆNA Aureatella.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ anticæ rubro-auratæ; fascia maculisque aureis.

In sylvestribus locis:

Ma.

Macula aurea in limbo & alia ad basim, fascia intermedia. Caput rufis pilis pubescentes. Oculi fuscæ.

663. PHALÆNA *Aeneella*.

— long. lin. 3.

Diagn. Fusca tota; alis anticis æneo-fuscis.

In sylvis.

Statura, habitu, & defectu ruboris alarum superiorum, differt ab *Obscurella*.

664. PHALÆNA *Leucocerella*.

— long. lin. 2.

Diagn. Alæ anticæ aurato-rubræ; punctis binis, obsoletis, albis.

In sylvis.

Tota nigricans; antennis corpore longioribus: apice albis. Non debet confundi cum *Ph. Scarbella*, ut ex dictis clare patet.

665. PHALÆNA *Luridella*.

— long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ argenteæ, anticæ atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album. Circa *Labacum*.

Fimbria alarum posticarum iis latior pallideque rufa. Oculi nigri. Palpi-argentei; articulo ultimo basi & apice fusco.

666. PHALÆNA *Zoolegella*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Pallide cervina; alis anticis puncto postico nigro.

Habitat in Avium exuviis, & Insectis adfervatis, præsertim *Cancris*.

Huic proxima, & forte eadem, *Phal. Pelliola*. Ill. LINNÆI. Sed nostra non est cana.

667. PHALÆNA *Rufella*.

— long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

Diagn. Alæ griseo-cinereæ, corpore pedibusque rufis.

Cir-

Circa *Lævacum*.

Alæ posticæ angustissimæ.

668. PHALÆNA *Murinella*.

— long. lin. 3:

Diagn. Alæ pallide murinæ.

In *Carniola* inferiore.

Caput, thorax, corpusque alis concolor.

669. PHALÆNA *Vestianella*.

— long. lin. 3½.

Diagn. Alæ cinerascentes; costa alba.

Habitat in *Vestimentis*, quæ destruit, ut invido dente rodunt malevoli aliena scripta.

Alæ atomis nigris adspersæ. Antennæ annulis albis. Ingenii ejusdem, quo impudens compilator.

670. PHALÆNA *Arbystella*.

— long. lin. 1½.

Diagn. Alæ anticæ subargenteæ; puncto nigro.

Inter arbusta, frequens.

Vestianella duplo minor, subargentea, punctulisque obscurioribus irrorata.

671. PHALÆNA *Domeſticella*.

— long. lin. 3.

Diagn. Albida nitens; alis omnibus apice untrinque nigro nebulosis.

In *cubilibus*, non rara.

Alæ anticæ supra punctis sparsis fuscis.

VI. *Alucitæ*.

672. PHALÆNA *Didactyla*.

— long. lin. 5:

LINN. Syst. Nat. p. 542.

Faun. Svec. 2. 1453.

Diagn. Alæ fuscae: anticæ semibifidæ: segmento inferiore falcato; omnibus rachi albida.

In pratis nostris frequens.

Dor-

Dorsum, abdomen, pedesque albidi. Alæ posticæ trifidæ.

673. PHALÆNA *Bipuncti dactyla.*

— long. lin. 4.

Diagn. Alæ anticæ cinereæ; punctis tribus, nigris, lineaque fusca longitudinali in limbo.

In sylvestribus.

Alæ super. bifidæ: incisura lin. $1\frac{1}{2}$ longa, segmentis parallelis, supra pari uno punctorum nigrorum, intervallo lin. $1\frac{1}{2}$ ab alæ apice distantium, puncto que alio minore eodem intervallo, a basi aliquo punctis remoto. Alæ posticæ trifidæ, fusco-ferrugineaæ nitidæ. Abdomen alis posticis concolor, lineis argenteis dorsalibus binis, lateralibus denuo binis sed ad medium usque non productis, infra iterum binis; præter has, est lineola nigra lateralis ad basim abdominis.

674. PHALÆNA *Ptero-dactyla.*

— long. lin. 4.

LINN. Faun. Svec. 2. 1456.

Diagn. Alæ anticæ bifidæ; divisura linearis, puncto nigro medio notatae.

In pratis sterilioribus.

Alæ apud nos albidae, sed posticæ obscuriores. Punctum anticarum parvum valde utrinque conspicuum; sed & punctula alia nigra adhuc minora, lenite admota, observantur.

675. PHALÆNA *Tri-dactyla.*

— long. lin. 6.

Diagn. Nivea tota; alis anticis ultra medium bifidis; posticis trifidis.

In pratis non rara.

Segmenta alarum superiorum deflexa & falcata. Segmentum infimum alæ posticæ subdistinctum. Oculi nigri. Hanc exprimit Icon P. PODA. Mus. Græc. Tab. 2. fig. 14.

676. PHALÆNA *Hexa-dactyla*.

— long. lin. 3½.

LINN. Syst. Nat. p. 542.

Faun. Svec. 2. 1458.

FRISCH. Inf. 3. Tab. 7. fig. 2. 5. p. 19.

Diagn. Alæ singulæ sexpartitæ fuscæ, albis transversis lineolis fasciatæ.Circa *Labacum*.

Ala antica profunde trifida, segmento extimo paulo magis quam semibifido segmento infimo solitario, hinc intermedio trifido: segmento inferiore duobus aliis longiore. Rachis horum digitorum albis punctis notata, quorum (5) in digito intimo.



OR-