

**CHENILLES D'EUPISTA RECUEILLIES  
DANS DES LOCALITÉS NON INDIQUÉES  
PAR LE CATALOGUE DES LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE**

par JEAN SUIRE

Dans les derniers fascicules du Catalogue des Lépidoptères de France, l'énumération des espèces françaises d'*Eupista* a été achevée.

Nous intéressant plus particulièrement à ce groupe nous nous permettons de citer ici quelques points de captures faites par nous dans diverses régions non citées dans cet ouvrage.

**E. gryphipennella** Bouché. — Chemin de l'École d'agriculture à la Paillade, sur *Rosa canina* L. (oct. 1923 et 25).

En Costière du Gard, à Saint-Gilles au bois d'Espeyran (1).

**Nigricella** Stph. — T. C. à Montpellier, au printemps, sur l'aubépine, le prunellier et diverses Rosacées cultivées.

Dans le Gard, à Espeyran (mai-juin 1948), minant les feuilles de *Sorbus domestica* L. (1).

**Fuscedinella** Z. — C. à Montpellier, dans les mêmes conditions que l'espèce précédente, sur divers arbres fruitiers, notamment le cerisier, où elle attaque parfois les fruits (Mauguio (H.) mai 1954). Capturée à Prades-le-Lez (H.) vivant sur *Morus nigra* L. (dit J. DE JOANNIS). Espèce polyphage fréquente en Costière (1).

**Lutipennella** Z. — En Costière (1) et aux environs de Montpellier, près de Juvignac (2) sur *Quercus pedunculata* Ehrh.

**Hemerobiella** Scop. — Montpellier et en Costière (1,2). Même biotope que ceux de *fuscedinella* et *nigricella*. Rencontré par nous minant de jeunes poires.

**Helianthemella** Mill. — Montpellier, à la Paillade. Mine en mai-juin le feuillage de divers *Helianthemum*.

**Flavipennella** Dup. — Lattes (H.), minant en juin les feuilles de poirier (2).

**Anatipennella** Hb. — Sur divers arbres fruitiers et sur prunellier à Montpellier et en Costière (1,2).

**Palliatella** ZK. — Environ de Montpellier (Celleneuve, Lavalette au bords du Lez) sur *Acer* et *Alnus* (2).

**Currucipennella** Z. — Fréquente certaines années à Montpellier, au Jardin des plantes sur *Quercus pedunculata* Ehrh.

**Trigeminella** Fuchs. — A Saint-Georges d'Orques (H.) sur cerisier. Rare (2).

**Picardella** Suire. — Sur *Atriplex halimus* L. à Sète et Palavas (H.) (cf. *B. Soc. ent. Fr.* 1934, p. 202).

**Spumosella** Stgr. — T. C. autour de Montpellier, mais uniquement sur le *Dorycnium suffruticosum* Vill. Fréquente aussi en Costière (1).

(1) J. SUIRE. — Micro. des plantes caractérisant les zones naturelles de la Costière. (*Mém. soc. sc. nat. Nîmes* 1951, fasc. 8, 150 pp. VI pl.).

(2) J. SUIRE. — Contre étude Coléophores des arbres fruitiers (*Ann. Epiph.* T. V, 1939. 309-338).

- Ononidella** Mill. — Sur divers *Ononis* autour de Montpellier et en Costière, à Espeyran près du château (1). Espèce très différente de la précédente.
- Giraudi** Rag. — 1 exemplaire près de Montpellier à la Gardiole (5 janv. 1928).
- Pyrhulipennella** Z. — C. à Montpellier, Grabels (H.), Clapiers (H.) et aussi en Costière, à Espeyran sur *Calluna vulgaris* Salisb. et *Erica arborea* L.
- Vicinella** B. — Localisée mais abondante sur certains points aux environs de Montpellier, notamment au bord de la Mosson, à Font Caude. En Costière, à Bellegarde et à Caissargues (I et *B. soc. ent. Fr.* 1927, p. 47), sur divers *Medicago*.
- Congeriella** Stgr. — T. C. Montpellier mais uniquement sur *Dorycnium suffruticosum* Vill. Fréquente aussi en Costière. (*Biol. B. soc. ent. Fr.* 1928, pp. 135-139).  
Espèce présentant malgré son qualificatif de « méridionale » une grande résistance au froid. Nous avons en effet trouvé près de Montpellier, à la Paillade, le 12 mars 1956, des chenilles actives et à taille qui avaient donc supporté quelques jours avant des températures de — 20 à — 22°.
- Siliquella** Cst. — C. près de Montpellier à Celleneuve, Villeneuve-les-Maguelone au bord de la Mosson et dans les marais de Mauguio (H.) Rencontrée uniquement par nous sur *Bonjeania recta* Rchb.
- Arenariella** B. — En Costière, à Caissargues sur *Astragalus hamosus* L. (mai 1948) (1).
- Trifariella** B. — A Espeyran, en Costière, sur *Spartium junceum* L. (1).
- Saponariella** Heeger. — Villeneuve-Loubet (A. M.). T. C. au printemps sur la saponaire.
- Mongetella** Chrét. — Autour de Montpellier, à Celleneuve, Lavalette, Palavas. Fréquente aussi à Biot (A. M.) toujours sur le *Dorycnium suffruticosum* Vill. (cf. *B. soc. ent. Fr.* 1927, p. 45).
- Virgatella** L. — En Costière, à Jonquièrre-Saint-Vincent sur *Thymus vulgaris* L. (mai 1949).
- Onosmella** Brhm. — Environ de Montpellier et en Costière (cf. *B. soc. ent. Fr.* 1928, p. 139) (1).
- Dianthi** H. S. — T. C. aux environs de Montpellier à la fin du printemps et en été dans les capsules de divers *Dianthus* sauvages. L'an dernier nous avons pu observer de sérieux dégâts de cette espèce dans des cultures d'œillets à Meynes (Gard).
- Calcariella** Chrét. — Indiquée de Montpellier par le Cat. des Lép. de France. Précisons que c'est plus exactement à Carnon, dans les dunes, au bord de la mer que nous avons rencontré cette rare espèce minant les feuilles de *Silene italica* L.
- Macrobiella** Cst. — C. à Antibes (A. M.) sur les rochers de la région littorale attaquant *Camphorosma monspeliaca* L.
- Camphorosmella** Cst. Sur les mêmes points et les mêmes plantes que l'espèce précédente.

---

(1) Il y aurait intérêt à examiner les génitalia de nombreux exemplaires de cette espèce. Peut être découvrirait-on ainsi en France *F. gallurella*, espèce si proche d'*onosmella* et décrite par AMSEL (*Frag. ent.* 1951, p. 134).